



5.3.386

5.3.386

177.9

177.9



OSSERVAZIONI CHIRURGICHE

D I

ANTONIO ROMITI

DELLA CITTA DI PRATO

MAESTRO DI CHIRURGIA

NEL REGIO ARCISPEDALE

DI SANTA MARIA NUOVA.



IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXXIX.

Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducaie.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AL NOBIL UOMO
 IL SIGNOR ABATE
 FRANCESCO M^A NICCOLINI
 PATRIZIO FIORENTINO
 COMMISSARIO PER S. A. R.
 NEL REGIO ARCISPEDALE
 DI S MARIA NUOVA DI FIRENZE.

N On poteva io, Illustriss. Signore,
 non volendo incorrere nella tac-
 cia d'ingrato, esporre al pubblico queste
 mie, qualunque sieno Osservazioni Chirur-
 giche, senza fregarle del nome Vostro.

Era ben di dovere, che a Voi le pre-
 sentassi, come Quello, che vi siete degnato
 di propormi per uno de' Maestri di Chirur-

4
già in codesto Regio Spedale ; e come a
Quello che destinato al governo di un In-
stituto così importante all' umanità, secon-
date le pie intenzioni di S. A. R. nostro Be-
neficentissimo Sovrano con quel singolare
zelo, e premura, di cui fa piena testimo-
nianza lo splendore , nel quale presente-
mente si trova.

La Vostra modestia mi vieta l' esten-
dermi di soverchio nelle laudi Vostre , o si
risguardi la Nobiltà del sangue , o i cospi-
cui impieghi da Voi in varie circostanze
decorosamente esercitati .

Degnatevi pertanto, Illustriss. Sig., di
gradire questo pubblico attestato della mia
gratitudine , della giusta stima, e del pro-
fondo rispetto , che nutrisco per la degnis-
sima Persona Vostra, e col quale mi do
l' onore di dichiararmi .

Di V. S. Illustriss.

Firenze Primo Luglio 1779.

Umiliss. Devotiss. e Obbligatiss. Servitore

ANTONIO ROMITI.

PRE-

PREFAZIONE.

Tutto l'umano sapere, che rispetto agli studiosi sembra sterile e di leggier conto ne' suoi principj, egli è poi quello che fecondo, e di gran pregio si fa, allorquando col massimo impegno coltivato venga da' Professori, e viepiù ognigiorno di nuove scoperte e d'osservazioni arricchito.

Un sì fatto costante progresso, come di tutto il rimanente delle Scienze e delle Arti, così della Professione Chirurgica meritamente può dirsi: poichè questa, esercitata da valentissimi nomini, e di riflessioni opportune, e di semplici metodi, e di non tanto luminose, quanto utili operazioni arricchita in vantaggio dell'umanità, merita pertanto a buona equità, che le sia resa quella estimazione ed onore, che l'imperizia di alcuni Chirurghi, o la precipitosa maniera di giudicare del volgo poteano averle o tolta, o richiamata in dubbio.

E' cosa superflua il far parola della necessità di quest'Arte, che tanto prontamente può riparare a molti, e diversi incomodi, gravissimi e mortali, a cui sono soggetti i viventi. In fatti a qual altro scopo mira la Chirurgia, se non che a restituire al corpo umano la sanità già perduta con risarcire l'integrità delle membra da cagioni per lo più estrinseche diminuita, riattandole a' proprj loro uffizj meccanici, a' quali l'infinita sapienza del Creatore aveale con leggi armoniche destinate?

Conoscendo questa insigne Arte per opera delle sue quotidiane indagini, ed esperienze dei mali tutti le cagioni
esier-

eslerne, ed ancora le più segrete e rimote, esistenti sovente nel meccanismo più minuto, e recondito del corpo nostro; ed intendendosi dai Professori suoi di quali e quanti prezj ricca si mostri, mercè di cui si giugne a rintracciare la vera origine di moltissimi sintomi, e tanto fra loro diversi, che fanno spesso fiate cambiare aspetto, e natura ad un medesimo male, che maraviglia sia perciò, se felice niente da questa nobile, e cotanto profittevole facoltà, quasi da maniera preziosa, scaturir debbano e la sicurezza dei Prognostici, e la preferizione degli acconci rimedj, e la serie dei metodi, relativi in specie alla Dieta del corpo infermo; cose tutte da Cornelio Celso giudicate al sommo necessarie al oggetto di conseguire il fine desiderato.

Sono poi i suoi uffizi, e le sue cure in tal guisa estese, che a raccoglierte tutte farebbe d'uopo tutta scorrere minutamente l'ampia e funesta provincia de' mali, che sono atti per se medesimi a guastare, o sconvolgere in qualunque modo l'economia della macchina nostra animale. Potremo soltanto accennare in questo luogo per un saggio quelle, le quali c' hanno obbligato secondo l'incontro della Professione a formare con maggior serietà le cure, e la considerazione accurata sopra le medesime, per darle poi alla pubblica luce. Per lo che Fratture di ossa le più minute, ed intrigate, Lussazioni le più oscure, e malagevoli, Tumori pertinaci, Ferite d'ogni genere complicatissime, Ulceri sordide, e depascenti, grosse Moli petrificate dentro una delle più nobili, e necessarie parti alla vita, com'è la vescica orinaria, Flussioni, ed Infiammazioni generate fra le delicatissime membrane dell'occhio; e quelle specialmente, che cateratte si appellano, perchè chiudono la bella luce del giorno, e ci tolgono il prezioso tesoro della vista; Sloggiamenti d'intestini, e di quelli sopra gli altri pericolosissimi, e quasi disperati, quali co' vocaboli nostri Ernie incarcerate si chiamano, le strane, ed intralciate posture dei Feti negli uteri femminili, che orribilmente la morte alle madri afflitte minacciano; sono questi tanti casi, con infiniti più, nei quali la Cbi-

tur-

7
rurgia opera con addestrata mano, e libera i miserabili infermi dai nominati sinistri accidenti; ora richiamando a vita ed agli usati naturali usizj le loro membra, rotte, o slogate, o in altra qualunque guisa malcondotte, ora il senso rendendo agli organi offesi, ed ora finalmente togliendo ad una morte imminente un immenso numero di viventi, i quali senza gli ajuti di quest' arte ne sarebbero rimasti vittima troppo immatura. Nè qui solamente si restringe la stimabile Chirurgia: poichè senza il soccorso di questa la stessa Medica Facoltà, tanto e tanto benefica all' uman genere, resterebbe priva del suo più valido braccio per dar compimento alle operazioni in ordine alla perfetta guarigione del corpo umano; nè tantopoco sarebbe stata tanto avvalorata la Medicina, se la Professione Chirurgica non le avesse somministrato una gran parte di quei lumi teoretici che l' Anatomia risguardano della macchina umana; in difetto dei quali, come l' attestò l' immortal Galeno, quella ora inerme sarebbe, e quasi morta.

Non è pertanto cosa da stupirsi, ogni qualvolta s' incontrino lodi, ed encomj, fino dai secoli più remoti da eccellentissimi Scrittori fatti a questa insigne Facoltà; e da quelli singolarmente, che hanno travagliato a raccomandare alla posterità, quasi a forma d' Efemeridi le giornaliere osservazioni loro sopra la cura de' più difficili casi di Chirurgia. Imperciocchè segnando accuratamente questi cò, che di nuovo nella loro Arte è avvenuto, osservando esattamente tutte le parti dei molteplici metodi delle loro cure, e tentando prudentemente d' aggiungerne dei nuovi, e de' più sicuri, hanno finalmente condotta la Professione a' progressi tanto avanzati unitamente ad una lodevolissima semplicità non mai conosciuta dai nostri antichi, che ora mai sembra che nulla possa aggiungerfi alla di lei perfezione.

In conformità di tante nobili sollecitudini, che c' hanno dimostrate, e negli andati secoli ed in questa età nostra molti e molti illustri Scrittori, a me pure è caduto in pensiero di secondare gl' insegnamenti di questi saggi Maestri
dell'

dell' *Arte*, col registrare fedelmente le più difficili malattie, che mi sono venute alle mani, la cura da me esattamente tenuta, e tutto ciò che m'è sembrato degno di considerazione, e d'esser colla maggior diligenza notato. Sono stato perciò d'avviso, che, col dare accuratamente le storie di questi casi, la studiosa gioventù potesse ricavarne qualche vantaggio. Almeno una tale lusinga conserva in me la premura di continuare queste mie Osservazioni.

Molti invero sono stati i funesti eventi, ai quali per ragione della mia Professione sono accorso, durante un lungo tratto di anni; ma non di tutti pensai tosto pubblicarne la storia, e così alcuni solamente fra quei tanti furono da me trascelti, e determinati fino al numero di ventiquattro: ai quali però avrei agevolmente potuto aggiungerne altrettanti, già da molto tempo preparati, se un ozio più libero dalle diurne mie occupazioni m'avesse permesso di secondare l'ardente desiderio di essere utile ai miei simili.

A queste bensì dentro il prefato numero invariabilmente fissate per la presente pubblicazione, siccome faceva di mestieri accuratezza, fedeltà, e precisione di storia, così non meno sembrami, che fossero a tali caratteri proporzionate le Figure disegnate in Tavole, per opera e luce delle quali si scorgesse in assai miglior veduta che che mai avessi potuto raccomandare al pubblico per mezzo della semplice scrittura; nella guisa che da ciascheduno potranno essere riscontrate al fine di questo Libro, in corrispondenza dei particolari richiami al suo luogo segnati.

Tanto è creduto bene di dover premettere prima di passare alle seguenti Osservazioni, alle quali altro ora non mi rimane, che augurarle dal Pubblico imparziale, e discreto una giusta insieme e benigna approvazione.



PRIMA OSSERVAZIONE

*Sopra una Ferita di Testa guarita senza suppurazione nella
persona di Maria Caterina Angela Verniani, accaduta
il dì 4. Gennaio 1762. in Firenze.*

Maria Caterina Angela Verniani vedova in età
d'anni 67., di abito di corpo molto pletorico,
cadde da una scala di legno della lunghezza di
braccia sedici; dalla qual caduta riportò una
estesa ferita lacerata, e contusa con scopertu-
ra del pericranio, e di porzione del muscolo
temporale destro. Vedi la Tavola prima figura pri-
ma A A.

Chiamato a visitarla subito v' accorsi, e veddi uno spetta-
colo, che recava orrore, sì per la funesta situazione della povera
paziente, sì per la quantità del sangue sparso, che in gran copia
sgorgava dalla ferita. Questa era di figura irregolare, ed estende-
vasi dal sopracciglio destro segnato e lungo l'Ossofrontale, e pa-
rietale, sino all'Osso dell'occipite. (Vedi nella stessa fig. D D.)

Erano rovesciati gl'integumenti, e pendevano sull'orecchia
destra, che in gran parte la cuoprivano. (Vedi la detta fig. B B.)

Fu intanto per mio consiglio trasportata colla possibile dili-
genza in un letto, e quindi m' accinsi, come insegna l'Arte, a pur-
gare

gare, con il-lonea lavanda il capo imbrattato di sangue, per potere osservare minutamente la terribil ferita. Impiegai per tale effetto il vino tiepido, come avverte il celebre Eustero (a), ed ottenni il fine desiderato.

Osservata a-lunque la già notata dimensione della ferita, non tralasciai di esaminare, se nelle Ossà del Cranio fosse accaduto alcun vizio in tale circostanza; ma ritrovai, che queste erano sanissime (b). Dopo le quali necessarie osservazioni, e cautele, passai a servirmi dei ripari più pronti, e più convenevoli col ricondurre a livello degli altri integumenti superiormente feriti, quelli che sull' orecchia destra già rovesciati posavano, col procurare colla maggiore attenzione, e destrezza la riunione di tutte le parti disunte in questa lunga, ed estesa ferita (c). Per ottenere una tale perfetta riunione, e per mantenere a mutuo contatto ambedue i labbri della ferita, posi in uso alcuni piccoli pezzetti di cerotto glutinoso, in vigore dei quali situati in una uguale distanza l'uno dall' altro, feci quella specie di cucitura, che si chiama sceea, come ce la dimostra il celebre Lorenzo Eustero nel Tom. primo Tav. IV. pag. 109. fig. 3. e 4. a preferenza della cucitura cruenta raccomandata dalla maggior parte de' celebri autori.

Riunita pertanto in vigore della descritta cucitura sceea, come si vede alla Fig. 11 MM, la ferita, posi sopra d' essa varj stucchi di finissime fila immerse nello spirito di vino, e sopra esse diversi piumaccioli di panno fine (d); e quindi passai a fare una discreta fasciatura unitiva, ed insieme retentiva chiamata dal suo Autore Berretto d' Ippocrate: sopra a questa, e principalmente lungo il tratto della ferita feci alcune docciature coll' istesso spirito di vino sufficientemente caldo, e finalmente con adattati guanciali procurai di situare il capo della Malata in una molto comoda positura, insinuando alla medesima, che procurasse di tenere fermo più che fosse possibile non tanto il capo, quanto an-

co-

(a) *Purgandum ante omnia vulnus est a sanguine, sordibus, aliisque, si quas forte alijunt, rebus praeter naturam.* Heist. de vuln. Cur. §. XXX. pag. 76.

(b) *Morbus disquirendus soletur est promptius.* Heist. Introd. in Chirg. §. IV. pag. 54.

(c) *Solutio continuarum corporis partium sunt praecipuus curationis scopus*

in eo potissimum consistit, ut disjunctae uniantur, ac probe glutinentur. Heist. loc. cit.

(d) *Igitur ipsum vulnus spiritu vini calefacto, linamentisque eodem liquore madentibus accurate prius implendum; deinde superimpositis splenis, probe deligandum.* Heist. de vul. Cur. XV. pag. 98. loc. cit.

cora tutto il di lei corpo (e) colla massima quiete. Dopo finalmente avere io ciò fatto ritrovai il polso della Malata molto frequente, e turgido, nonostante la precedente emorragia già sofferta. Per la qual cosa premessi una discreta emissione di sangue dal braccio in dose d' once sette. Questo era non solamente scarso dei necessari fieri, ma molto resistente al taglio, e con una superficizie, che dava l'idea di Diatesi infiammatoria.

Ingiunsi in oltre alle assistenti, che procurassero di avere pronta qualche bevanda ristorativa per mantenere l' Inferma, ed avvertissero ancora di tenerla ben difesa dall' aria esterna allora molto rigida, e però nociva a quasi tutte le ferite (f); ed in tal guisa lasciai la Malata in sua quiete per rivederla la seguente mattina.

La mattina dunque del di cinque del suddetto Mese la ritrovai con polsi assai frequenti; e quindi osservai tutta la di Lei faccia, ed in specie la parte sopra cui era la ferita, divenuta molto gonfia, e di un colore giallo, livido, in parte tendente al nero; contrassegni certi di sangue travasato, e portato sopra la cute per la contusione sofferta, per il quale travasamento erasi formata quella qualità di male, che appellasi ecchimosi (g).

Ella però disse di non avere alcun dolore nelle dette parti, che erano divenute così tumide, nè tampoco nella ferita; ma bensì parevale di sentire il capo molto grave, confuso, e rumoreggiante; per lochè ordinai ai di lei assistenti di farle localmente alla parte tumida della faccia contusa con adattate pezzette una posca composta d'acqua comune con porzione di spirito di vino ordinario (h), più spesso che fosse possibile; coll' uso delle quali cose, dopo il corso di giorni quattro s' osservò, che oltre all' essersi dileguata l' accennata gonfiezza, cessò anche quel peso, e quel rumore insieme del capo, dei quali incomodi ella s' era lamentata, e restò ancora quieta nei polsi.

B 2

Non

(e) *Positissimum observandum est, ut parti vulneratae, postquam medicamentis vulnerariis ipsi prospectum est, ille sius, & positura concilietur, in quo partes divisae se invicem quam proxime semper attingant ec. Heist. loc. cit.*

(f) *Aer autem praesertim nimis frigidus cum vulneribus inimicissimus fit, solertissime semper ab iisdem arcendus est ec. Heist. de Vuln. univer. spott. Tom. I pag. 84.*

(g) *Ecchymosis, seu ecchymomate, id est sanguis subter cutem effusus, & coitus solutae continuitatis genus quoddam est, quod plurimum una cum contusione ruptioneque incidit ec. Gale. lib. 4. Meth. Med.*

(h) *Topica primum adstringentia paulo super partem contusam apponi debebunt, ut constringantur venae, & Arteriae; sicque fluxus intercipiatur; tum etiam ut pars ipsa rarebatur. Pareus de Cont. Cap. V.*

Non tralasciai però d'usare mattina e sera sopra la fasciatura l'uso dello spirito di vino; e così continuai la cura fino al decimo giorno; nel quale volli toccare e moderatamente comprimere tutto lo spazio della ferita con avvertire l'Inferma Donna a volermi dire se ne provava dolorosa sensazione; ed ella m'asserì di non sentire doglia alcuna nel tempo d'un tale atto. Quindi è che pensai di non dover cangiar metodo ulteriormente, usando per altro attenzione somma nell'osservare tutti i sintomi, che mai comparir potessero. Ma vedendo, che nulla più accadeva da richiedere soccorso, io la ritenni in questo stato, nel quale ogni di dava speranza di maggiore miglioramento, fino al giorno decimo ottavo, nel quale mi determinai di sfasciarla. Per lo che levata con somma diligenza la fasciatura, ritrovai sotto ad essa il da me fatto apparecchio; vale a dire piumaccioli, e fila; il tutto tenacemente attaccato alla parte affetta: laonde con frequenti docciature di semplice acqua comune calda procurai d'ammolliare, e lentamente staccare affatto ed i piumaccioli, e le fila, e quei pezzetti di cerotto glutinoso, dei quali m'era servito la prima volta per fare quella specie di cucitura secca di sopra accennata, come si vede alla *Figura II. NN MM*. In questo scuoprimento osservai con molto piacere tutta quella gran ferita riunita talmente, che appena scorgevasi il vestigio della medesima; onde nel corso di giorni 18. lasciai la Malata perfettamente guarita;

R I F L E S S I O N I.

In primo luogo è da riflettere intorno alla cucitura secca, che questa si trova scritta in Parco al Lib. IX. Cap. XXV., a differenza della cucitura cruenta, la quale è riportata dal medesimo al Lib. IX. Cap. XV., il quale ufolia in un Soldato caduto da un luogo dirupato che ebbe una ferita con lacerazione d'integumenti del capo dall'occipite fino alla fronte, che gli pendevano sopra alla faccia: doppio di avergli purgati dalla terra, e dai grumi di sangue gli lavò con vino caldo, gli riapplicò sulla Calvaria, e gli trattenne con alcuni punti di cucitura non troppo stretti; e facendo uso dei convenevoli unguenti cataplasmi in poco tempo il Malato guarì.

Qualora adunque debbasi porre in uso la cucitura cruenta in qualche parte del nostro corpo, massime per cagione di simili o quasi simili ferite di Testa bisogna avere una somma cautela di non interessare le parti adiacenti, per non produrre delle più funeste conseguenze, dovendo l'ago passare unicamente per i foli integumenti.

In secondo luogo non può negarsi, che da questa Osservazione non si rilevi quanto sieno necessarie, e quanta utilità apportino agl' Infermi feriti le ripetute emissioni di sangue, mentre queste immediatamente allontanano qualunque infiammazione, ed ancora la suppurazione; le quali cose però praticate giudiziosamente in simili casi di ferite di Testa, altro non ponno certamente a mio credere arrecare, che un massimo profitto agl' Infermi.

L' uso parimente dello spirito di vino applicato localmente alla parte ferita certamente coopera per mezzo della sua evaporazione alla costrizione di quei vasi arteriosi, e venosi rimasti offesi, e facilita ancora la riunione delle parti molli, come sono portato a credere che seguisse nel caso, del quale ho dato la Storia più esatta, e sincera.

SECONDA OSSERVAZIONE

Sopra un' Ernia Incarcerata Inguinale, e molto complicita accaduta nella persona di Maria Teresa Dugini il dì 23. Gennajo 1762. in Firenze.

Maria Teresa di Bartolommeo Dugini Fanciulla in età d'anni 56., di temperamento di corpo molto adusto, e bilioso nel giorno 23. di Gennajo dell' anno 1762., fu sorpresa da violenti acerbissimi dolori nel basso ventre con nausea continue, e vomiti fierissimi. In questo terribile stato s' accorse d' un dolore alla destra parte degli Inguini, e con questo esser nato un tumore assai doloroso della grossezza di un uovo di tacchina, toccandosi il quale non solamente risvegliavasi un orribil vomito, ma risentiva l' inferma in quella regione un insopportabile dolore (a). Fui pertanto chiamato il martedì mattina giorno 24. del mese suddetto per visitare questa fanciulla, alla quale, doppo avermi fatta l' istoria della sua malattia, convenne che le visitassi la parte malata, e vi riscontrai quel

Tu-

(a) *Itaque quaedam Herniae sunt indolentes, sive sine dolore, aliae vero cum dolore acerbissimo, nausea, vomitu aliisque vehementibus malis, ut cum primis sunt incarceratae.* Heist. Cap. CXIV. pag. 783. De hernijs.

Tumore duro alquanto infiammato, di mole simigliante appunto ad un uovo ben grosso di gallina, e quindi accortomi del suo male, procurai di fare alcune pigiature, e tentativi per vedere, se fosse stato possibile di sprigionare l'Intestino strozzato e di ricondurlo diligentemente nella sua cavità naturale. Ma! nell'atto medesimo di queste praticate cautele, la Donna fu costretta a nuovamente vomitare, e nel vomito stesso osservai materie sottili stercoracee, sciolte, e fetenti di più colori, accompagnate di più da dolori spasmodici di tutto il di lei corpo.

A tali fenomeni di dolore, di tensione di tutto il basso ventre, di febbre con freddo con frequente, e ripetuto singhiozzo e vomito, pensai di fare noto ai parenti dell' Ammalata, che il carattere di una tale malattia consisteva in una Ernia incarcerata molto pericolosa, e che sempre più fatale sarebbe divenuta, se non si fosse tentata la strada dell' operazione del taglio (b).

Si convenne intanto, prima di venire al taglio, di sentire il parere d'altro Professore. Ma siccome in questi casi ogni indugio può essere fatale, io non tralasciai in questo tempo di farle una necessaria emissione di sangue d'onze otto: quindi passai alle fomentate emollienti, ed all'uso dei Clisteri di fumo di Nicotiana tanto celebrati, e da me praticati altre volte con felice successo (c). Venuto intanto il Professore sopraccennato, si consultò sopra il caso urgentissimo; ed esaminato ciò, che fino allora da me si era praticato, fu risoluto di continuare l'uso delle fomentate predette per vedere, se ammolita la parte fosse poi riuscito di ricondurre nella cavità dell'Addome lo strozzato intestino.

Ma doppo il corso di ore trenta, e più di ripetute fomentate non fu mai possibile ad ambedue con tutti gli sforzi possibili di ricondurlo nella sua cavità naturale.

Ed

(b) *Herniae reductionem respuentibus, periculum subitaneum imminatur. Symptomata quasi passionis Iliacae superveniunt, dolores gravissimi, vomitus enormes, singultus, & demum pulsus languidus, & sudores frigidi; diagnosi indubitata instans gangraena, & mortis appropinquans. Anulentes interdum sectionem moliantur cum successu valde auspiti ex. Ettmull. apud Allen in Synop. Cap. XII. Att. 131. v. Hernia.*

(c) *Adhibenda igitur frequenter hic sunt, praeter sanguinis per venas detractionem quae maxime saepe hic usus est; eoque, si opus repetita, loco dolenti autem mollementia, & cataplasmata ducenda &c.*

Per clisterem ex Tabaci melioris, sive fortioris fumo in Anum ope peculiariis machinae dici satis injecta curationem tentaverit: Heist. Chirg. P. II. Sect. V. Cap. CXVII. pag. 846. e 807. de Bubon. sive Hern. Inguin. Incaac.

Ed in vero i tentativi suddetti furono già praticati, e descritti in simili casi da valenti Professori di Chirurgia; i quali per meglio riuscire convengono, che per fare ciò le natiche dell' ammalato sieno situate più alte della sua testa, colle ginocchia piegate, affinchè il ventre essendo così inclinato gl' Intestini possano rientrare con più facilità (d).

Le Dran alla pag. 116. vuole, che in tali operazioni il petto sia un poco piegato in avanti per ottenere un maggiore rilassamento dei muscoli; oppure, come dice il medesimo alla pag. 117., tentare la riduzione, situando l' ammalato sulla parte opposta dell' Ernia; ma nulla ottenendo con tali mezzi, è qualche volta riuscito d' avere l' intento sospendendo il malato con la testa in basso, e le ginocchia piegate sopra le spalle di un Uomo forte, e robusto; poichè in tale positura è più facile, che l' intestino ritorni al suo luogo.

Sharp (Recherches sur la Chirurgie pag. 28.) Il est tres probable que le poids de tous les viscères contenus dans l'abdomen tirant perpendiculairement en bas ceux qui sont contenus dans le sac Herniaire peut beaucoup contribuer a les en deloger.

Ma per quanta diligenza fosse impiegata nel caso nostro, crescevano sempre più gli accidenti morbosì; per lo che mi feci coraggio di dire al Medico, che se più si tardava la necessaria operazione, la povera paziente sarebbe assolutamente morta (e). In fatti alle mie istanze condescendendo, egli mi lasciò nella libertà d' operare.

Quindi senza frapporre dimora io m' accinsi subito ad eseguire la necessaria operazione, dopo avere preparato quanto occorrere potea di pezze, di fila, e di fasce.

Situata per tanto l' Ammalata secondo il metodo prescritto dal Eistero, e scuoperta la parte inguinale, nella quale esisteva il Tumore Erniario, e sollevati con due dita della mano d' uno degli assistenti gli integumenti del medesimo, sopra d' essi feci diligentemente un taglio rettilineo, col quale vennero recisi tutti i descritti integumenti elevati, e componenti detto Tu-

re

(d) Tum oportet reddito prius urina hominem resupinatum, & Coxis elastioribus esse ec. Platner. apud Heist. p. 289. & 232.

(e) Sed ubicumque hoc modo reposita prolapsa Intestina non possent, quemadmodum fieri solet, nisi scilicet aeger

nimis debilis evadat, aut Intestinum corruptatur, & dubia v. tae spes per eumstantem, in praesensissimum mortis periculum convertatur; tunc ad operationem veniendum est ec. Heist. loc. cit.

re (f). Quindi alla meglio che possibile mi fu questo, separato da me dalla cellulare, andai con destrezza a trovare il sacco erniario, nel quale contenevasi quella porzione d'intestino imprigionato; e strozzato: aperto il detto sacco diligentemente colle cesoie, si vidde featurire da esso una qualche porzione d'acqua in esso contenuta, e solita trovarsi in tale operazione (g); perlochè si presentò subito alla vista una porzione d'omento, di tre buone dita traverso attortigliato insieme, unitamente coll' intestino stesso in varie circonvoluzioni colà dentro imprigionato, che più difficile rendeva questa operazione.

Ma poi finalmente separato, e disimpegnato 'che ebbi dall' intestino l' omento, il quale di nera superficie comparve (segno manifesto di gangrena), si scuoprì ancora chiaramente fuori dell' anulo inguinale quella porzione di intestino colà dentro strozzato per tre buone dita trasverse, ch' era di un colore lividognolo, e nericcio anzichèno; sebbene osservato fu, che la minacciante gangrena non interessava sostanzialmente le tuniche, o membrane, delle quali è formato l' intestino medesimo, ma era superficiale e non molto interessante. Dopo ciò procurai col Gam-maut, introdotto per la parte superiore dell' Anulo colla tenta scannellata, di dilatare in parte l' Anulo stesso, affine di diimpegnare affatto l' imprigionato intestino, e di ricondurlo nella sua cavità; lo che mi riesci con avere lasciato fuori della ferita quella porzione d' omento già gangregato, serbandolo così per la futura suppurazione (b).

Compiuta pertanto l' operazione, medical l' indotta ferita lacerata, e cruenta con riempirla di varj, e diversi stucchi di fila sottili, morbide, ed asciutte, sopra le quali posai alcuni validi piumaccioli di panno fine, e quindi passai a fare una disereta competente fasciatura retentiva; dopo la quale feci mettere nel suo

(f) *Super Mensa idem resupinetur, & si inguinem incidendum, patet ium contigitur, depressoque deinde capite, coxis vero in altum abductis, firmiter a ministris robustioribus contineatur, deinde eutem postea complicatam ubi alteru Tumoris parte, unu cum pinguedine omni Mediens seu Minister aliquis ab alteru prehendat; sursumque quantum feri potest abducatum linea recta super medio Tumoris seuspello incidat. Hæst. loc. cit.*

(g) *Dum vero hæc fit, Chirurgus*

terreri non debet, quando uliquid ferri, vel aquæ quædam profilis, quæ fere semper hæc liquor quidam aqunt deprehenditur cc. Apud Hæst. loc. cit.

(b) *Specillum sulentum inter divisam eutem & Tumorem immittitur, plague tum sursum, quam deorsum, aut seuspello, aut forfice amplietur, quo equidem rite confecto, blandu digitorum compressione intestinu repelluntur &c. Apud Hæst. loc. cit.*

suo letto l'Inferma donna, lasciandola quindi in sua libertà, e quiete. Ma nel corso di ventiquattro ore però, dopo la fatta operazione, si fece ella non solo più febricitante, ma fu altresì stimolata spesse fiate al singhiozzo, ed al vomito: le quali cose continuarono interrottamente per tre consecutivi giorni. Il basso ventre però mantenevasi sufficientemente trattabile senza molto dolore; perlochè nii determinai a mettere ad una discreta dieta la mia Malata, esortandola a praticare di tempo in tempo per sua bevanda lunghe limonate, proseguendo in tal guisa con essa in tali circostanze senza farle altro, a riserva d'una semplice vilita mattina e sera pe' l corso di giorni cinque.

Passato finalmente detto tempo sfasciai, ma non del tutto, la parte viziata, levando soltanto alcune pezzette e fila le più facili ad estrarsi fuori, e quindi posi sopra a quelle, che già lasciai altre fila asciutte ed in cotal forma rifasciai la parte coll' idea di tornare nuovamente a sfasciarla, ed a levare ancora tutto il damente fatto apparecchiato dopo tre o quattro altri giorni.

Passati adunque che questi furono, detti di mano a sfasciare la detta parte, e tolsi via tutte quelle robe, vale a dire pezzette, fila, delle quali, come io dissi, m'era servito per medicarla; dal quale staccamento, si scuoprì una piaga cavernosa con molta suppurazione. Questa durò parecchi giorni in tale stato, ma a misura che andava scemando, più mite ancora si faceva alla Malata la febbre, e tutti gli altri sintomi, dai quali fino allora stata accompagnata. Per tanto con questi favorevoli augurj seguitai a medicare la piaga colla maggiore semplicità, vale a dire colle frequenti lavande di pura acqua; dopo le quali poneva sopra ad essa sole fila asciutte; e con questo mezzo progressivamente praticato, viddi poi staccarsi affatto corrotta quella porzione d' omento già gangrenato, come accennai di sopra; e quindi la piaga restò più pulita, e scoperta, e scaturì dal fondo di essa un' fluido settile, di fosco colore, ed assai fetido: ciò che mi fece sospettare, che in quella parte dell' intestino, stato per l' addietro strozzato, fosse rimasto qualche piccolo pertugio derivato dallo staccamento di qualche particella membranacea già corrotta, e che da questo uscisse il suddetto fluido: cosa che durò per lo spazio di giorni venti, nei quali ella restò del tutto abolita. Ma nel progresso della cura mi occorse l'osservare un certo riempimento, che andava fabbricandosi di giorno in giorno nella descritta piaga, in conseguenza di una nuova, dirò così, appotizione, o vegetazione di carne: ma allorchè questa talora comparve di lustreggiante superficie, e di sostanza fungosa, procurai digerirla, e consumarla, ora col mezzo del precipitato, ora col contatto della pietra infernale, dal

C

cui

cui mezzo più volte repte tutto ottenni finalmente la totale diminuzione della medesima; talmente che si ridusse detta piaga semplice e piana, di piccola circonferenza, promettendo con ciò pronta cicatrice; la quale per vero dire si produsse così stabilmente, che nel tempo e termine di giorni quarantasei la suddetta Donna restò perfettamente guarita.

R I F L E S S I O N E.

Da questa pratica Osservazione ben si rileva quanto necessario sia, e quanto importi l'essere sempre cauti, e solleciti in fare simili operazioni, mentre queste tardamente poste in uso sono assolutamente la cagione immediata, perchè la maggior parte di questi Infermi cadino indispensabilmente vittime della morte.

Una tale cosa per vero dire non seguirebbe certamente, qualora più cauti, e circospetti fossimo in simili casi, nei quali s'è veduto chiaramente, che l'esperienze malamente praticate, e la speranza ancora di credere costantemente che un giorno possa da se naturalmente tornare o ricondursi nella sua cavità l'intestino strozzato nell'anulo inguinale, hanno ingannato certamente più d'uno; onde quest'infelici malati hanno dovuto alla fine per tentare la loro sorte di vivere, ricorrere allo Spedale di S. Maria Nuova per ritrovare quei mezzi da chi è colà destinato: sebbene sieno poi finalmente riuscite inutili tutte le premure di tenere in vita tali infermi non per altra ragione, perchè la trascuratezza, e la procrastinazione di coloro, che sul principio ne intraprefero la cura, lasciò passare il tempo più opportuno, e più prezioso per salvargli.

TERZA OSSERVAZIONE

Sopra una relazione di una Donna morta in Firenze, in conseguenza di un Idrope Ascite di quelle, che diconsi saccate, la di cui cura fu cominciata il dì 6. Febbraio dell' anno 1763.

Maria Anna Cecchi di età di anni 56. di temperamento ca-
chettico, era già da gran tempo affalita di tanto in
tanto da affanno; e molto più, quanto era maggiore l' esercizio
del suo corpo; ed a ciò s' aggiungeva la gonfiezza, che compariva
nelle gambe, accompagnata da scarfezza di orine. Sperò per qual-
che tempo di liberarsi da un tale incomodo cogli opportuni rime-
di, che le venivano prescritti; ma tutto fu vano. Poichè ai sin-
tomi accennati s' aggiunse una lenta febbre, e dolori nel basso
ventre; cominciò a farsi tumida tutta questa cavità in maniera,
che fu facile al Medico curante il giudizio del passaggio di que-
sta malattia alla più sollecita, e pericolosa Ascite (a); come tale
si vede alla Tav. prima fig. III. A A.

L' accrescimento dei sintomi pericolosi, e principalmente del-
la respirazione impedita dall' azione dell' acque, in specie verso
il Diaframma dovette fare risolvere il Fisco curante ad abbrac-
ciare il prontissimo soccorso della Paracentesi (b).

Questa fu da me sollecitamente eseguita (dopo d' avere messo
in una comoda situazione la malata) coll' introduzione nella parte
del destro Ipocondrio del Troacar, come si vede nella mede-
ma Figura B B; dalla quale apertura viddefi subito scaturire un flui-
do non di natura aquea, segnato Q Q; perchè di diversi colori;
e sul termine s' osservò anche più denso oleaginoso, di colori più
vivi, del qual fluido pesata la quantità arrivò alla somma di libbre 52.

C 2

Da

(a) *Hydrops est tumor contra na-
turam ex aquosi humoris, flatuum,
alias in toto corpore ambitu, alias in
parte aliqua, eaque praesertim alvi
capacitate, quae peritonaeo, & inter-
stinis interjacet collecta. Patens do-
Tum. cont. nat. cap. XI. de Hydrope.*

(b) *Operatio paracenteseos cum
Historia ipsius medicinae est coacta-
na, ab Hippocrate memorata, & ab
Albucasi acque descripta hac in nostra
aetate. Apud Alien. in Synop. Cap.
VIII. art. 818. V. Hydrops Peritonaei.*

Da questa estrazione di fluido pertanto il basso ventre non tornò del tutto nel suo stato naturale: si rese bensì a sufficienza trattabile; e a riserva di alcuni luoghi o punti di esso, nei quali riscontravansi chiaramente col tatto alcune picciole, e varie durezze, ed anche circonscritte, affatto indolenti. Passati finalmente giorni quindici, da che venne fatta la prima operazione, nei quali fu diligentemente assistita dal Curante Medico, tornò il basso ventre nuovamente a farsi tumido più della prima volta; per lo che s'accrebbero alla Malata funesti sintomi; cioè mancanza di respiro, il quale si rendeva affannoso, sudori freddi, polsi assai frequenti, ma piccoli e disuguali, azione indicibile colla totale soppressione delle urine; per le quali cose erasi condotta l'inferma nello stato più pericoloso di sua vita.

Dalla complicità dei divinati accidenti fu risoluto di tentare anche per la seconda volta la prefata operazione della Paracentesi (c), e questa da farsi dalla parte opposta alla prima, cioè verso il sinistro ipocondrio; lo che fu da me con prontezza eseguito, notandosi in quest' estrazione dell' acqua essere ella più crassa, e più colorita di quella, che fu estratta nella prima operazione; essendo stata però di minore quantità di peso della prima; quantunque non avesse questa oltrepassato il peso di libbre 18. Ma da quell' secondo tentativo non tornò certamente il basso ventre a sgonfiarsi quanto bastava, anzi nel progresso d'altri sei giorni fecesi in breve d'un esorbitante volume, e crebbero allora a gran passi all' inferma anche i mortali sintomi, in guisa che in brevissimo tempo, senza, che dal curante Medico potesse esserle apprestato verun altro soccorso, dovette porre il termine al suo penoso vivere.

Noi frattanto per appagare la nostra curiosità ci determinammo di fare l'apertura del cadavere solamente per osservare la cavità del ventre, e non più oltre. Fattane pertanto da me la sezione, si ritrovò il sacco del peritoneo convertito in un grosso tumore di figura sferoidale di considerabile estensione. Questo era teso in maniera, che tutto si rendea sonante come un timpano. Il suo esterno colore era pallido, e lividastro tendente al nero. Era sciolto quasi affatto dalle sue interne attaccature, e particolarmente dalle parti
late-

(c) *Memorab. Ez est historia apud D. Chesell. Anst. pag. 187 cuiusdam Ascite laborantis, qui novies vicefisque in uno anno paracentesim subivit.* Apud Allen loc. cit.

Io poi posso asserire d' avere veduto

un altro Idropico nel tempo che era studente nel Regio Arcispedale di S.M. Nuova, il quale disse d' essersi sottoposto a detta operazione trentacinque volte, e poi guarito.

lateralì della cavità del ventre, nelle quali si ritrovò soltanto adeso alle quattro ultime vertebre lombari, talmente che convenne usar molta diligenza, affine di staccarlo da esse, per trarlo fuori affatto intiero.

Staccato adunque che esso fu coll' istessa diligenza dalle predette coesioni, fu levato saldo dalla cavità addominale, e quindi scoperti subito comparvero alla nostra veduta tutti gl' intestini, sopra de' quali posava eliò tumore; osservando essi ancora che non aveano sofferta veruna morbosa mutazione, a riserva soltanto d' essere molto flaccidi, e rilassati, e privi affatto dell' omento. Tolto via finalmente che fu dalla cavità del ventre il surriferito voluminoso tumore, si trasportò in altro luogo comodo, ad oggetto di poter noi quivi esaminarlo in tutte le sue parti, considerandolo prima nella parte esterna, nella quale ci parve tutto piano e liscio per ogni intorno teso a forma d' un rimpano, ed al tatto nostro molto risonante. Laonde fatta nel corpo di esso andantemente un' apertura, viddesi immanentemente scaturire confusamente una molto abbondante materia fluida, ed assai densa, di più e diversi colori; come gialli, rossi, neri, cenerini. ed altri simili ancora: uscita la quale detto corpo s' osservò subito sgonfiare, ed aggrinzarsi, rimanendoci soltanto nelle mani nostre tutta la parte continente membranacea, molto grossa, e dura, la quale per nostra maggiore osservazione rovesciammo, e per la di lei interna superficie furono ritrovate, e numerate trentatre cavità formate a guisa di borse, o sacchetti distinti, e separati gli uni dagli altri, (come si osserva nella medesima Tav. alla Fig. IV. S S S S e e e e) prodotti dal complicato rilassamento dell' accennata membrana del peritoneo, in ciascheduna delle quali cavità, o sacchetti osservammo una materia in alcuni molto solida, in altri oleaginosa. in altri sottile; e ciò che fu degno di particolar veduta, furono certamente i diversi, e più colori, de' quali erano tinte le dette materie contenute nelle poc' anzi accennate cavità, le quali riempirono noi, ed i circostanti ancora di somma ammirazione, ed in sì fatta guisa restò compita la nostra sezione.

QUARTA OSSERVAZIONE

Sopra una ferita di Testa molto considerabile seguita nella persona di Francesco Gaspero Ubertini il dì 18.

Marzo 1763. in Firenze.

Gaspero Ubertini in età d'anni 77. d'abito di corpo pletorico, e robusto, incamminandosi il giorno del dì 18. Marzo 1763. verso la bottega per ivi attendere ai meccanici suoi lavori, gli convenne passare dalla Casa Pia, così chiamata, sul canto della quale si ritrovavano alcuni muratori in atto di mettere una foglia di pietra ad una finestra, larga due fessi di braccio, e lunga braccia due: cadde questa improvvisamente dall'altezza di braccia quattordici nel tempo appunto che il nominato Gaspero passava sotto, e venendo giù colpì sulla testa il medesimo.

Oppresso da un colpo sì inaspettato e violento, fu costretto subitamente a cadere in terra quasi morto, anzi creduto fu tale da tutti i circostanti per il corso di un ora e più, mentre non dava segni il suo corpo di veruna funzione vitale: una sì fatta credenza pareva al certo ben fondata, sì per la violenza del colpo medesimo, sì per la copiosa emorragia, tramandata dal capo; cosa che faceva sommo orrore a chi per ogni intorno lo rimirava.

In questo intervallo di tempo, o poco dopo incominciò a dare alcuni contrassegni di piccolo respiro, ma non già di cognizione: perlochè accorsero i Fratelli della Venerabile Compagnia detta della Misericordia, e postolo alla meglio che fu possibile nel loro cataletto, lo condussero in sua casa, e quivi con somma diligenza fu dai medesimi posto in letto, e lasciato.

Per la qual cosa dopo essere stato sollecitamente chiamato, arrivai alla casa dell'infermo; visitai la parte del capo in cui avviluppati, e lordi di sangue vedevansi i di lui capelli, i quali con somma diligenza rasai, per fare per quanto possibile fosse, pulito il capo di esso. Dalla qual cosa ebbi luogo di poter vedere, e riscontrare con chiarezza che esso malato dalla forza così impetuosa dell'accennata pietra, aveva riportata una lunga, ed estesa ferita lacerata, contusa, e cruenta, di figura semicir-
co-

colare, d' estensione di dieci dita traverse, con scopertura del pericranio, e con offesa delle ossa sottoposte, vale a dire del vertice, e dell'incipite destro, ed allora si formò in parte quella specie di frattura chiamata dal nostro divin Maestro la *Depressione*; mentre tali ossa specialmente nel fncipite, come ci avverte il medesimo, e con esso Aristotile, e Reaido Colombo, sono molto delicate, e fragili (a)

Lavai dunque meglio che per me si potette tutta la già descritta ferita con vino caldo abbastanza, come ci viene insegnato da Galeno, (b) e procurai inoltre di sodisfare alla prima indicazione curativa, qual fu di riunire per quanto mi fu possibile tutta quella parte divisa, e disunita, ed ottenni questo a forza di quel metodo chiamato la cucitura secca chiaramente dimostrata dal celebre Lorenzo Eistero, nella spiegazione della Tav. IV. pag. 10 g. fig. 8. 9. 10., ad un contatto immediato ambe le pareti della accennata ferita, sopra la quale posi sottilissime e morbide fila, e piumaccioli inzuppati in acquavite, secondo l' insegnamento di Arnaldo, (c) quindi applicai una competente fasciatura retentiva, che dal suo Autore, e nostro gran Maestro *Berretto d' Ippocrate* appellasi; dopo di che rinnovai sopra tutto questo apparecchio la leggiera doccatura della accennata acquavite, dipoi accomodai il capo del sonnolento ammalato con adattati guanciali in una supina situazione molto comoda, e adattata.

Fatto pertanto ciò, volli passare ad una discreta emissione di sangue dal braccio, con idea d' evitare per quanto era possibile quegli accidenti, che sogliono portare simili ferite di testa complicate, come ancora quelle non complicate, chiamate semplici, come a nostro proposito l' avverte il gran Maestro (d).

Ed in vero poco dopo di aver io estratto dal destro braccio once sette di sangue molto acceso, osservai l' ammalato appoco appoco riprendere vigore, e svegliarsi da quel sonno in cui era sommerso, e così vedeva presentarsi ancora quella cognizione, che

(a) *Totius capitis tenuissimum, atque infirmissimum est os bregmaticum.* Hip. de vul. capitis l' ex 4. *Super Cerebrum tenuissimum, os atque infirmissimum est, quod vocatur bregma.* Aristoteles Lib. 1. hist. Anim. cap. 16. *Reaidus Columbus de Anat. Ossium in locum cit.*

(b) *Vinum vulneribus optimum est medicamentum.* Gal. lib. 3. Meth. Med.

(c) *Arnaldus dicere solebat, quod cruenta, & recentia vulnera, aqua ardente quam aquam vitae nuncupant abluta creberrime ad sanitatem perducuntur, quippe quae infanter defecet.* Apud Io. Tagaul. Inst. Chirg. Lib. 11. de pla. seu. cru. vul.

(d) *Nullum capitis vulnus leviter contemni debet: Aegroti pericula inferri possunt.* Hip. lib. de vul. cap. &c.

che bastava a rispondere alle mie interrogazioni; benchè dimostravasi molto maravigliato, perchè si trovasse così in letto, ricercando cosa fosse a lui fino allora accaduto, assicurandomi di non essere ricordevole del caso seguito, ma soltanto d'essere egli passato dalla Casa Pia, e niente di più.

Lo feci pertanto ristorare subito con porzione di brodo; e nell'istesso tempo insinuai con caldezza ai di lui parenti di procurargli la massima quiete, l'assistenza, e la dieta, come ci avverte il dotto Celso, ed il celebre Lorenzo Eissero. (e) Passai in fine a fare a' medesimi il prognostico intorno alla malattia, dicendo loro che era in gran pericolo di vita; manifestando di più le funeste conseguenze, che secondo le quotidiane osservazioni sogliono portar seco simili ferite complicate di testa; come abbastanza lo spiega il citato gran Maestro con quelle brevi parole, *Aegroti pericula inferri possunt*.

L'istessa sera verso le ore undici secondo l'orologio oltramontano tornai a rivedere l'ammalato, ritrovandolo molto più in cognizione dello scorso giorno, ed oltre a ciò non molto febricitante, dicendomi, che per tutto il suo capo sentivasi molta confusione, ma non dolore, nè punture; e soltanto lamentavasi più di ogni altro di grande arsione. Laonde insinuai ai di lui assistenti il dargli di quando in quando a bere lunga limonata; e passando a rinfrescare colla solita acquavite tutta la parte fasciata, lasciai in quella sera l'ammalato in sua quiete.

La mattina del dì 19. seguente feci ad esso la mia visita, e lo ritrovai con pronta e perfetta cognizione, con polso non molto frequente: solo nella parte tutta del sopracciglio, ed occhio destro osservavasi una gonfiatura lividastra, e nera; la quale costituisce quel grado di malattia, chiamata dai Greci Ecchymoma, che è l'istesso, che dire travasamento di sangue sparso sotto alla cute, come accennai nella prima Osservazione (f); la qual livida tumefazione nel periodo di cinque, o sei giorni restò del tutto naturalmente abolita.

Dopo ciò interrogatolo, se la scorsa notte aveva riposato, e se la parte offesa aveagli apportato veruno incomodo; mi rispose d'aver passata la notte in molta quiete, e senza dolore
da

(e) Optimum enim illis medicamentum quies est. Moveri autem, & ambulare alienum est. Celus apud Io. Targui. Inst. Chirurg. loc. cit. & apud Heist. Chirurg. P. I. lib. I. cap. I. de vul. univ. spec.

(f) Ecchymoma, idest sanguinis subter cutem effusio, & coitus solutae continuitatis genus quoddam est, quod plurimum una cum contusione, ruptioneque incitat. Gal. lib. 4. meth. med.

da incomodo, nè da veruno dolore. A tali favorevoli risposte presi a fargli sempre più coraggio, animando insieme gli altri di sua casa a sempre assisterlo, ed a procurare di non allontanarsi dal sistema prescritto; rispetto al cibarlo; vale a dire che non uscissero d' una semplice brodosa pappa, e di un' uovo fresco a bere mattina, e sera; e così proseguirono fino al settimo giorno (g). Io poi mantenni il solito divisato metodo di semplici docciature d' acquavite fatte sopra la fasciatura mattina e sera.

Ed in veio continuò sempre più l' ammalato in sì piacevoli circostanze fino al giorno decimo secondo, nel qual tempo dicevami d' essergli cresciuto l' appetito, ed oltre a ciò sentivasi nella parte ferita molto prudere, pregandomi in questo stesso giorno a sfasciarlo. Ciò però non stimai bene di fare, persuadendolo a stare così fino al decimo ottavo giorno, nel quale mi sarei allora determinato assolutamente di sfasciarlo. Bensì, per soddisfare in parte al suo riacquisito appetito, accrebbi un' uovo fresco cotto col butirro aggiuntavi discreta porzione di pane, ed il giorno ancora parimente due crostini di pane aspersovi sopra una moderata dose di Vino Moscado, e niente di più.

Arrivato finalmente il giorno decimo ottavo, da che egli restò offeso, mi determinai di sfasciarlo per la prima volta, ciò facendo con somma diligenza, ed in vigore di ripetute docciature di pura acqua calda levai adagio adagio tutto quello apparato fatto sul bel principio del male, consistente in piumacciuoli, e fila, le quali erano tenacemente risecche, ed attaccate alla parte, e così finalmente staccate, ebbi la consolazione di vedere perfettamente riunita la sopra mentovata ferita, talchè non trovai neppure una quantosivoglia menoma particella di suppurazione. Quindi toccando la crostosa cicatrice in diverse maniere; l' Ammalato non dava segni di sentire veruno incomodo, nè dolore.

Dopo ciò lavai con vino generoso tutta quella parte, che fino allora era stata il soggetto d' un male pieno di pericolo, e per assicurare sempre più nella sua perfetta salute l' infermo giudicai cosa opportuna di nuovamente fasciarlo, per indi lasciarlo stare così discosto dall' aria per altri tre, o quattro giorni, passati i quali sfasciai per la seconda volta la parte, lascian-

D

dola

(g) In *assumendis cibis, ac potu cavendum ante omnia vulneratis est, ne qua forte subsit intemperantia.* Heist. de vul. univ. spec. P. LVIII. pag. 85. *Vulneratis primis septem diebus, in-*

tra quos ut plurimum securi esse solent a febre, & inflammatione, viduum tenuem, & porcum instituito. Apud Io. Tagli. de ratione victus in vuln. lib. II. cap. 160.

26
dola in libertà, e dopo il periodò di giorni ventidue perfettamente guarita.

R I F L E S S I O N E.

Nulla vi è di più rimarcabile di quello che s'è detto nella prima Osservazione, cioè intorno alla opportuna emissione di sangue, all' uso dello spirito divino, e alla pazienza che conviene avere in lasciare stare la parte ben fasciata, e difesa dall' azione dell' aria per lungo tempo. Cose tutte, che debbonfi avvertire dai Giovani studiosi dell' Arte Chirurgica, se vogliono essere utili alla languente umanità.

QUINTA OSSERVAZIONE

*Sopra un vasto Ascesso della Mammella destra accaduto
nella Persona di Maria Anna di Ranieri Conti
adì 24. Aprile 1763. in Firenze.*

Maria Anna di Ranieri Conti in età d'Anni 26., di temperamento pletorico cominciò a dolersi di un' incomoda sensazione nella destra Mammella dopo otto giorni appunto, da che ella felicemente per la seconda volta avea dato alla luce un figlio maschio.

Tale dolorosa sensazione andò sempre crescendo in maniera, che fu poi costretta a non proseguire ad allattare il figlio; sicchè fui chiamato dalla medesima il dì 24. Aprile 1763 per visitarla.

Arrivato alla casa della malata mi feci fare la narrazione del male fino da che ella n'era restata incomodata; passai indi a visitare la parte offesa, e ritrovai, oltre alla febbre, la destra Mammella divenuta di una mole maggiore dell'altra sinistra, costituendo in genere un Tumore infiammatorio, ed in specie una elevata infiammazione flemmonosa, la quale accompagnata era da gran colore, da diverse durezza, le quali estendevansi specialmente per tutta quanta la base della Mammella; dove più che altrove toccandola ne risentiva dolori acutissimi oltremodo, e pungenti, massime dentro ed intorno all' Arcola della medesima:
fin-

Intomi tutti, che sogliono riunirsi in tali divise malattie infiammatorie delle mammelle (a).

A tali diagnostici segni giudicai la natura di questa malattia, quale è detta pocanzi, cagionata infallibilmente dal coagulo, o stagnamento del latte nei tubi lattiferi, e nelle ghiandole ancora componenti essa Mammella (b);

Si fatti fenomeni, dai quali era accompagnata tale malattia infiammatoria, mi fecero prima d'ogni altra cosa risolvere a fare una cistifera emissione di sangue dal braccio dell' Inferma in dose d'onze otto, avendolo ritrovato molto acceso nel colore, resistentissimo al taglio, e scarso di siero.

Questa cautela, non solo è insegnata dal dotto Eistero, e dal Pareo, ma eziandio da altri celeberrimi Professori di Chirurgia, e di Medicina (c).

Doppo ciò mi posi ad applicare localmente alla parte malata una fomenta o posca anodina composta d'acqua di fiori di zambuco mescolatovi dentro una porzione discreta d'aceto comune, da doverli praticare, e ripetere più spesso che fosse stato possibile (d); e proseguendo in questo curativo sistema per lo spazio di tre continovati giorni non s'apportò all' Inferma donna verun vantaggio; anzi ogni giorno più crescer vedevansi a momenti gl' accidenti morbosì, che in tutto e per tutto aumentavano la malattia, e tendevano certamente a una vasta imminente suppurazione (e).

In vista pertanto di tale aumento stimai bene cangiar indicazione curativa, con applicare localmente alla parte l'empia-

D 2

stro

(a) *Intumescit enim, cumque calore, sive ardore, dolore, duritie, rubore pulsibus, atque paucis continuis agetur.* H. ult. Cap. II. pagina 224. de Phlegmone.

(b) *Tumor itaque Mammillarum est ipsorum magnitudo aucta, & inaequalis assignatione tumorum in glandulis proprijs, aut a tunc ubi acido concreto ut plurimum productus.* Docteur. Chirurg. Ration. Cap. IX. §. I. De Mamm. Tum. & Itiam.

(c) *In similibus morbis sanguinem avertunt per venae sectionem in cubiti lateris affecti celebrandam.* Dol. p. 15. loc. cit.

Quoties inflammatio gravior sit utilissimum est, incisio in brachio aut pede venae, sanguinem pro ipsius viribus atque bibi tu larga copia detrabere. H. ult. loc. cit.

(d) *Prima est intentio fluxionem avertere, ac eam omnino intercepte.* Gal. lib. 13. Meth. Med. Theorap.

(e) *Atque illa ipsa membrorum afflictorum phaenomena curare, cum conspicimus illis fuit, qui de inflammationum basisuodi ventitus, accurate praefragiensis solliciti sunt.* H. ult. d. Mamm. tum. atq. inflam. Cap. IV. pag. 234.

stro fatto di pane, latte, e malva passata per staccio, aggiungendovi di più una discreta porzione di croco orientale, ed in questo stesso tempo stimai proprio svelare ai di lei parenti il prognostico di tale malattia, ponendo in chiara veduta a medesimi, se non sul certo, almeno con molta probabilità quelle conseguenze, tal volta funeste, che portan seco tali malattie infiammatorie delle mammelle, come tale era certamente questa (f).

Infatti coll' uso del detto empiastro praticato, due volte il giorno per un corso di giorni quattro s' osservò crescere all' inferna il dolore per tutta la Mammella, e s' esacerbò anche la febbre (g); ma diminuì quella gran razzatura esterna infiammatoria e comparve in un tratto al nostro sguardo un colore pagliato lucido, ed in alcuni punti cedenti al tatto (h).

Per la qual cosa dopo il corso di giorni cinque di repetuto empiastro comparvero inaspettatamente due piccolissime aperture cutanee situate intorno all' Areola della Mammella, dalle quali scaturì si vidde piccola quantità di materia sottile purulenta: ma ciò non dimeno non aveva essa parte perduta quella solita turgescenza, anzichè più voluminosa appariva dei giorni indietro: e nonostante proseguì il solito locale rimedio per altri tre seguenti giorni, ne quali l' Ammalata accusava di non poter più soffrire il pungente dolore; e sostenere il grave peso di tutto il volume affetto della malattia.

Sentendo finalmente dalla parte inferiore, oltre alla maggior turgescenza, anche al tatto un certo ondeggiamento, mi risolli di fare ivi un taglio affine di dare esito alle materie in essa contenute (i).

In

(f) *Ubi autem vel gravior inflammatio subest. quam quae quatuor. vel quingus dierum spatio resolvatur, vel prout fieri plerumque solet. paulo serius Chirurgus accersit, tutius profecto est, suppurationem quam maxime fieri potest accelerare. quam Scirrhus, aut Carcinomati cunctando Mammam exponere.* Apud H. lib. Cap. VIII. loc. cit.

(g) *Quod dum pus coquitur dolores. & Febris magis accendunt. quam iam confilio pure.* Hipp. Aph. 47. lib. 2.

(h) *Satis autem maturum iam Abscessum esse hinc potissimum cognos-*

scitur. Tumor autem durus mollescit, atque albescit, si digitus admotus liquorem intus delitescentem percipiat, dolores cum rubore, calore ac pulsu valde minuantur vel omnino evanescent. Heist. de supp. & abs. Cap. III. pag. 231.

(i) *Tutius ferro, quam medicamentibus erodentibus suppuratus Tumor aperitur.* Gal. Thera. 13. loco citat.

Tumor aperiatur vel incidi etiam scalpelli adjuvamento satis apte queat esse. Heist. de Mam. Inflamm. Cap. IV. C. 136. loc. cit.

In fatti uscirono in abbondante copia le marce assai consistenti di colore giallo, che pesate arrivarono al peso di libbre quattro.

Allora riempi la risultante cavità con varj stucchi di fortissime, e morbide fila, e soprapposti altri validi piumaccioli, passai a fare una necessaria fasciatura allattata, esortando l'Inferma donna a praticare una esatta regola nel cibarsi coranto necessaria in simili casi, e lasciai la medesima nella sua quiete (m).

Con questo sistema per tanto condussi la cura pel corso di giorni diciotto, e con tanto maggior coraggio, quanto più vedeva ogni giorno con questa semplicità riprodursi, dirò così, nuova ottima carne a riempire questo gran vuoto (n); distrussi coll'uso del precipitato rosso di Venezia la carne, che fungosa lussureggiava d'attorno, ed in virtù di tal metodo mi riuscì facile nei giorni consecutivi di ridurre a cicatrice la medesima dopo un corso di giorni 35.

Così lasciai la Malata dentro detto termine a perfezione guarita, e così sinantenne prospera in decorso di tempo. Nell'anno 1765. rimase di nuovo gravida, e partorì felicemente nel mese d'Aprile 1766. una bambina: volle allattarla da se medesima, e non le sopravvenne verun' altro incomodo. Mi disse però, avere ella osservato, che nella destra Mammella in cui tanto avea sofferto, come s'è osservato, non separavasi il latte in quella quantità, e facilità, che nell'altra sinistra; onde da questa più che dall'altra era per conseguenza obbligata ad allattare la sua figlia. Una tale difficoltosa separazione di latte però non apportavale veruno incomodo; sebbene dopo il corso di mesi tre vidde finalmente separarsi anche in essa Mammella destra quella quantità di latte, che separavasi nell'altra sinistra.

In tanto le riescì proseguire con prosperità il materno ufficio senza mai più esserle sopraggiunto verun altro incomodo del descritto carattere.

R I F L E S S I O N E.

Da questa osservazione risulta quanto sia plausibile, ed utile la semplicità del medicare anche nella Chirurgia, e quanto la

(m) *Dieta in bisce Mammarum afflicta vite observanda est &c.* Do-laeus P. 12. loc. cit.

(n) *Succrescente iam in fundo, nova carne, magis subinde minuta, ac brevior immitti debet turundula & simul ac fieri id tuto possit penitus removeri &c.* Agud Heist. loc. cit.

la scuola Toscana sia però superiore alle altre, potendo essa vantare d'essere stata la maestra di tutte, e d'aver avuto la sorte di vedere col semplice metodo condotti perfettamente ad un' esito felicissimo quei casi, che sarebbonsi creduti impossibili, a potere risanare. In fatti, e che servono eglino mai tanti tumi, e composti rimedj, se non se a dispendiare i poveri Ammalati inutilmente, e rendere eterne le cure? Questa è una verità, che continuamente si può osservare da chiunque nei nostri ospitali, dove trionfa la più luminosa, e più utile semplicità di medicare, e dove conseguentemente si vedono le più belle guarigioni dei più complicati, e difficili casi.

SESTA OSSERVAZIONE

Sopra la Cura fatta insieme coll' Eccellentissimo Sig. Dottore Michelangiolo Targioni di una malattia infiammatoria molto complicata nella persona del Padre Simone di S. Lino della nobile Famiglia Riccobaldi del Bava di Volterrana Carmelitano Scalzo, nel Convento di S. Paolino di Firenze il dì 5. Agosto 1764. (a)

IL Rev. Padre Simone di S. Lino della Nobile Famiglia Riccobaldi del Bava di Volterra nel dì 5. Agosto 1764. cominciò a delirare, ma non furiosamente, con un continuo vaniloquio, che si raggirava sopra materie scientifiche, nelle quali s'era per l'avanti occupato.

Dopo tre giorni di tale delirio comparve una febbre molto violenta con ardente calore alla carne, con rossore nella faccia, con smania universale, ed altri sintomi, che caratterizzavano una infiammazione al Cervello. Sù tali vedute il Professore di Medicina prescrisse una emissione di sangue dal destro braccio, in dose d'onze 10. Ma dopo questa il malato non dette segno alcuno di sollievo; e solamente poté contarsi qualche alleggerimento del suddetto delirio.

S'au-

(a) *Signa futuri morbi praeantur sanctionum corporis qualiumcumque. ex animadversa mutatione insueta* Boer. In Rit. Med. deliquis Morb. 298.

S'auumento quindi la febbre; e perchè il di lui sangue era stato riconosciuto con vera diatesi infiammatoria, si passò alla seconda emissione di sangue, tanto più che il paziente accusava un eccelsivo calore urente, e sempre più dava segni di cognizione.

Ma nonostante la seconda cavata di sangue la febbre non cedette, anzi vieppiù esacerbandosi con sintomi più funesti dei primi volle il prenotato Professore procedere alla terza emissione di sangue da farsi dal piede di altre once dieci, quale operazione fu prontamente eseguita, con più l'applicazione di quattro vesicanti, due alle braccia, e gli altri due alle sure.

Con tutto questo non diede l'Infermo segni di miglioramento alcuno; nè tampoco dall'azione dei vesicatori, mostrò segno di sensazione, se non se alcun poco nel medicargli. Di più il giorno dopo incominciaronsi a vedere sparse per tutto il di lui corpo minutissime macchie rubiconde, le quali di giorno in giorno crescevano, e rendevansi sempre più manifeste, larghe, elevate, e sparse senza numero per le braccia, dorso, cosce, e gambe; le quali macchie o esantemi durarono ad essere sempre sfiorate sugl'esterni integumenti fino al giorno venticimo dal principio del male; in cui allora incominciarono a vedersi in parte annerite, ed in parte diminuite.

Dalla riunione per tanto di tutti i fin qui descritti fenomeni, fu dichiarata questa malattia col carattere d'infiammatoria maligna putrida, come in effetto fu tale. Poichè nelì undecimo giorno fu ritrovato il Malato con febbre maggiore, con nuova minaccia d'infiammazione al capo, con qualche attacco ancora all'altre due cavità, petto e addome. Quindi è che mantenendosi il polso dell'Infermo bastantemente forte, e resistente, fu risoluto dal prefato Professore di procedere alla quarta emissione di sangue da farsi dalla vena iugulare sinistra; lo che fu tosto eseguito, e così furono estratte once otto di sangue. Infatti dopo tale operazione, nella veggente notte il nostro Malato riposò più quieto delle antecedenti, e nella mattina del duodecimo giorno si trovò in circostanze assai migliori delle passate. Ma seguì tutto in un tempo, che s'avanzò a gran passi il male accompagnato da sintomi assai pericolosi, talmente che fu pensato di fare premunire l'Infermo dei Santissimi Sacramenti, lochè fu eseguito sollecitamente il giorno decimoterzo della malattia, nella sera del quale ritrovammo esso Malato più quieto, e molto più svegliato con diminuzione di febbre; onde si vide ancora nella medicatura dei sopraccennati vesicatori principiare a comparire materie molto copiose, e concotte, le quali negli scorsi giorni erano state molto scarse. Così

an-

andammo avanti ogni giorno fino al trentesimo quarto in uno stato di malattia da potersene contentare.

Dopo un tal tempo d'interrotta febbre parve allora che esso male incominciasse a dare segni manifesti di crife coll'apparire alcuni sgravi naturali del corpo; come di sudore, di copiose deiezioni, urine, e simili. La febbre poi andò sempre più diminuendosi, ma non lasciò mai libero l'Infermo; quantunque si procurasse sempre d'insinuare al medesimo fino dall'incominciamento del male, e ai di lui assistenti di farlo abbondantemente bere, quando lunga limonata; e quando acqua nitrata, e simili.

Ma allorchè si credette, che il nostro infermo fosse ridotto in stato non più pericoloso di sua vita, comparvero dopo detto tempo altre nuove suneite conseguenze, tutte svantaggiose per il medesimo. E per dir vero dalla parte posteriore del di lui corpo, vale a dire per la circonferenza tutta dell'Ossa sacra videsi una ampla mortificazione gangrenosa, nera, dura, e secca di figura irregolare, la quale fabbricata erasi per il lungo decubito, essendo state inutili le molte diligenze, che si erano fin d'allora praticate per allontanare un male simile, che apportò all'Infermo, dolore, agitazione, incomodo da non potere egli più stare giacente supino per un corso di moltissimi giorni.

Nel progresso di tempo però seguì la totale separazione della parte mortificata gangrenosa, staccandosi naturalmente dalle parti sottoposte sane, e lasciando in tal guisa una piaga assai profonda ineguale da cui osservavansi manifestamente alcune attaccature di più tendini dei muscoli dorsali sparsi, ed attaccati per lo stesso osso sacro con varie loro porzioni aponeurotiche biancheggianti. In questo stato di cose medicavamo la profonda piaga con semplici fila asciutte, durando in sì fatta guisa fino a tanto che naturalmente non si riempisse quel gran vuoto di nuova carne; lo che seguì dopo il corso di mesi tre: ma non s'ottenne però mai d'essa piaga la cicatrice perfetta. I vescicanti delle braccia dopo lungo tempo furono i primi a saldarli: ma quanto poi a quelli delle sure, sino dal terzo giorno, dappoichè si staccarono videsi lentamente sulla superficie di queste piaghe promuoversi una corruttela, che ridusse le medesime assai profonde infiammate, e dolenti; nel qual periodo di tempo accennato non avemmo la sorte di vederle del tutto ferrate; mentre per un corso di sette e più volte interpolatamente facevasi una piccola cicatrice, che poi subito riaprivasi. Finalmente dopo un corso di varie ripetute morbose mutazioni ci riuscì per soli giorni tre di vederle affatto ferrate; ma dopo questi subito nuovamente tornarono a riaprirsi con

con nuova suppurazione, e sempre in tal guisa si mantennero fino all'ultimo della vita dell'infermo. Anzi la piaga della sinistra gamba tanto s' estese, e si mortificò, che arrivò a scuoprire tutta la superficie esterna spinosa dell'osso della tibia. Non mancavamo però d'usare ogni attenzione, e diligenza in medicare fino due volte il giorno queste piaghe, e massime quella dell'osso sacro, dalla quale separavasi copiosa, e fetente marcia. Non potendo il malato, come si disse di sopra, stare giacente in letto supino, ma necessitato egli a dovere ora riposare sul fianco destro, ed ora sul fianco sinistro, ne avvenne che per tale interrotto decubito, singolarmente sulla sinistra parte del medesimo, videsi dopo alcuni giorni comparire in tutta la circonferenza del gran trancantere del femore una larga macchia nera. Questa al certo crebbe in maniera, e s' allargò quanto una moneta di paoli dieci; la quale pigliando una figura quasi sferica, arrecò insieme all'infermo un incomodo considerabile, ed un acerbo dolore.

Frattanto nel corso di non pochi giorni, ne' quali alla semplice medicavasi, s'aspettava lo staccamento della parte gangrenata dalla sana, ed il nostro infermo sempre febricitante, ora più ed ora meno, andava avanti con appetenza, e con quella vivacità di spirito, che poteangli permettere le sue circostanze: per lo che fu pensato dal prefato Sig. Dottore Targioni di passare ad un decotto di china china, da pigliarsi ripartitamente fra giorno; lo che fu con pronta attenzione eseguito, ed effettuato per un corso di qualche mese, non senza un profitto notabile dell'ammalato.

Non potendo esso starsene pertanto più giacente, nè supino, nè tampoco sul fianco sinistro, sì per la recente gangrena, come per l'antica vasta piaga dell'osso sacro, lo consigliamo a riposare sopra l'altro destro fianco, fino a tanto che le medesime non fossero ridotte in migliore stato da potere allucare l'infermo sopra di esse col nuovo decubito. Dopo il corso finalmente di mesi quattro d'una sì penosa positura in letto, si vidde una volta cicatrizzata l'espressa piaga dell'osso sacro.

Ma quando si sperava d'aver ridotto il nostro infermo in un grado di notabile miglioramento, videsi dalla prefata piaga del fianco sinistro un copioso flusso di materia sciolta, sanguigna, nera, e molto fetente con gran dolore, con febbre maggiore, accompagnata di tempo in tempo da qualche violento insulto convulsivo; contraffegni questi di nuova infiammazione, e suppurazione. La materia sanguigna, e purulenta scendeva giù giù trasversalmente dall'inguine sinistro, e vicino all'articolazione del femore, e scaturiva fuori a fonte dalla descritta piaga esterna del fianco sinistro a forza di varie pigiature, e compressioni diligentemente fatte

E

con

con la mano. In quell'atto allora sentivasi un manifesto rigurgitante moto d'aria unita a dette materie, cosa che fece credere esservi un ampio vuoto sì dall'esterna, come dall'interna parte della coscia continovato. Proseguirono a separarsi le dette materie marciose, o per meglio dire icorose in sì fatta guisa per giorni diciotto, dentro i quali, ora più ed ora meno, vedevansi scemare e diminuire la febbre, ed abolirsi ancora naturalmente quell'ampio vuoto del fianco e della coscia tutta, creato dalla copiosissima suppurazione, e ridursi finalmente la piaga esterna al diametro di una moneta di soldo; il che ci prometteva pronta la cicatrice. Ma fu vana certamente questa speranza, poichè quanto credevamo di avere liberato dal male descritto il malato, ecco ad un tempo viddimo a gran passi dilatarsi questa stessa piaga, dalla quale tornarono nuovamente a scaturire le solite materie marciose, nere, e più fetenti di prima, riaprendosi di nuovo la strada a quel vasto vuoto della coscia, che sembrava del tutto abolito. Quattro dita traverse poi sopra essa piaga si produsse in questo tempo altra nuova gangrena di nero colore, dura, e secca, al di cui staccamento ne venne in seguito abbondevole suppurazione, che dette luogo a scuoprirsi liberamente il gran tracantere del femore tutto, o quasi tutto cariato.

Per tutta la circonferenza poi di questa gran piaga con scoperta dell'osso, ed in particolare per quella parte d'essa che volgeva verso la natica sinistra, erano affatto staccati tutti gli esterni integumenti e muscoli, fra quali entravano liberamente quattro dita traverse, colle quali sentivansi internamente fra gli spazi dei muscoli glutei vari, e tortuosi vuoti, grandi e piccoli senza sapere ove andassero a terminare.

Mediante adunque un simile devastamento delle accennate parti cagionato dalla terribile soluzione de' solidi, congetturar si poteva, che il nostro Infermo dovesse condursi presto alla morte.

Ed in vero, accresciuta la febbre colle convulsioni, e con altrettanti sintomi tutti mortali, mal fondata non era la nostra opinione. Intanto affine di occorrere ai pessimi effetti andavamo medicando l'Infermo col solito semplice metodo chirurgico, usando le diligenze maggiori quanto al più noi potevamo.

Alla fine in tutto il tempo di tale descritta lunga, e penosa malattia, e delle piaghe suppuratorie cavernose obbligato fu a starcene giacente sulla parte del fianco destro: ed ancor qui parimente non bastarono le diligenze, e cautele usate per conservare sana, ed illesa questa parte. Poichè in essa comparve altra gangrena di nero colore dura, e secca uguale appunto alla

di

di sopra notata, venuta nel fianco sinistro; la quale crebbe sì tant' ³⁵oltre, che dopo lo staccamento del cuojo gangrenoso, si manifestò un' ampia piaga profonda, inuguale con suppurazione tanto copiosa, che arrivò a disfare tutte quelle parti membranose, e tendinose adiacenti al gran trocantere del destro femore, dando luogo allo scuoprimento immediato del medesimo, che s' osservava quali tutto cariato.

In questa circonferenza piagata, particolarmente per quella parte, che si piega verso la natica destra, ben vedevasi un ampio, e tortuoso vuoto, da cui scoperti comparivano alcuni dei muscoli glutei componenti l' istessa natica.

Ridotto dunque il nostro malato in tal circostanze, non solo per le presenti malattie, ma per cagione ancora delle quotidiane ricorrenti febbri, accompagnate d' tempo in tempo da' soliti deliri, e convulsioni, con le fetenti e copiose suppurazioni tramandate da tutte le piaghe, si ridusse tutto il di lui corpo emaciato affatto, e consunto.

Al detto fin qui aggiunger debbesi la tumefazione delle gambe, ed in modo particolare dei piedi, come ancora delle mani, e massime della sinistra diventata oltremodo edematosa.

E pure chi lo crederebbe? Con tutte queste diverse complicitanze di mali il nostro Infermo così paziente passava i suoi giorni, nei quali procurava di cibarsi sempre di cose tutte conservative, e leggiere. Ma siccome egli doveva giacere disagiatamente, e con grave suo incomodo, attese le di sopra notate piaghe d' ambedue i fianchi, non potendo più riposare sulle medesime, pensammo alla meglio di farlo nuovamente giacere supino, affine di liberarlo, per quanto possibil fosse, da altre nuove mortificazioni alla regione dei fianchi.

Ma appena, che s' era fatto collocare supino con somma diligenza e cautela, per soli due giorni sostenendolo, e gentilmente incalzandolo con morbidi guanciali, suscitaronsi contro l' Infermo altri funesti mali, mentre si notò ad un tratto nella parte, su cui posato s' era; vale a dire sull' osso sacro dove tempo fa eravi stata la vasta, e profonda piaga accennata di sopra, e parimente cicatrizzata; distatta del tutto la cicatrice descritta e riformata nuovo male gangrenoso, senza dubbio peggior del primo, apportando all' Infermo indicibile disagio e dolore; il quale, oltre ad essere accompagnato da tutti gli altri fino ad ora narrati sintomi, fu costretto a soffrirne dei più crudeli, e funesti.

Questi per vero dire consistevano nell' essersi formate in varj luoghi del di lui corpo altre gangrene, alcune di piccola, altre

di grand' estensione; e ciò ch'è degno di considerabile osservazione fra queste una assai larga di figura irregolare erasi frattanto formata nella parte esterna, ed interna del ginocchio sinistro alla di cui separazione si riscontrò avere ella per fondo un vasto ascesso, quale comunicava per tutto il tratto della coscia fra gl'inserti dei muscoli scorrenti per la medesima, e andava a terminare liberamente fuori della di sopra descritta piaga esterna, colla scoperta dell'osso del fianco sinistro.

Da questo lungo, e vasto ascesso per tanto fluivano quasi ogni mattina libbre due di materie purulenti, di diversi colori; cioè a dire, nere, gialle, sanguigne, ed oltre modo ferenti. Laonde colla loro continuazione copiosa giunsero internamente a vuotare tutta, o quasi tutta la coscia, e nella parte inferiore della medesima tanto s'internarono in tutta l'articolazione del sinistro ginocchio, che arrivarono a distruggere tutti i ligamenti, e tendini, che concorrono a tenere insieme unita questa articolazione, ed a sciogliere affatto la medesima, di maniera che i capi degl'Osso di quest'articolo vedevansi chiaramente, e pulitamente scoperti, e molto cariati (a).

Con tutto questo il nostro Infermo mantenevasi sempre ilare con polli piccoli, ma resistenti colla diurna solita febbre, accompagnata spesse volte dai già mentovati fenomeni. Per la qual cosa noi di giorno in giorno, di sera in sera lo medicavamo col solito metodo semplice e sistematico; a riserva di alcune piaghe in particolare, le quali cuoprivamo con fila inzuppate nel vino, per mantenere in un vigore quelle fibre muscolari scoperte; e ciò con profitto dell'Ammalato.

Ma noi intanto eramo viepiù sorpresi da alta ammirazione rimirando il nostro Infermo, ed il di lui corpo così del tutto sconciamente corrotto, confunto, piagato, e gangrenato con osi scoperti a tal segno, che sembrava all'aspetto un vero cadavere fetente, senza dare ancora un manifesto segno di poter terminare al suo vivere sì travagliato e penoso.

Il dì 24. del mese di Dicembre 1764. parve allora che al nostro Infermo andassero scemando lentamente e la consueta vivacità e collanza, e le forze vitali eziandio. In sequela di tale diminuzione comparvero all'Infermo impetuose convulsioni all'etofago, rimanendo il pazientissimo Religioso afo-

(a) L'articolazione del sinistro ginocchio s'era talmente sciolta, che appena spirato l'Infermo, si sciolse gentilmente che fu la gamba, si sciolse con somma facilità dall'articolazione suddetta.

afonico e balbuziente da non poter sperar più oltre la vita. In fatti prostrato, e rifinito affatto, assalito finalmente dalle solite violenti convulsioni, la sera appunto del dì 5. Gennaio 1755. dopo un corso di mesi cinque. e giorni uno di tanta penosa, e complicata malattia *placide obdormivit in Domino*; e dette così il termine ad una serie così funesta, e crudele d'orribili mali, che facevano a gara a tormentarlo, e cimentare la di lui inalterabile pazienza, che non seppe mai cedere a tanti e così replicati insulti.

SETTIMA OSSERVAZIONE

Sopra una Flemmonosa malattia accaduta, nella Persona del Molto Rev. Padre Gio. Carlo di S. Lorenzo Carmelitano Scalzo nel Convento di S. Paolino in Firenze il dì 8. Settembre 1764.

IL M. Rev. Padre Gio. Carlo di S. Lorenzo della Città di Trento in età di anni 65. d'abito di corpo pletorico, era solito ogni anno di ricorrere ad una emissione di sangue. Questa fu da me eseguita coll'approvazione del suo Medico Fifico nel dì 8. Settembre dell'anno 1764. in dose d'onze dieci. Fu indi ritrovato il di lui sangue tanto infiammato, con poco fiero, ed anche glutinoso, ed al taglio resistente, che nulla più. Parve certamente essere diminuita al suddetto Religioso quella universale agitazione, che andava per l'avanti provando, e che fosse scemato altresì quel peso al capo, che non poco lo rendeva offuscato, e confuso; laonde con indicibile contento rimase appieno soddisfatto.

Decorati giorni sei dalla fatta emissione di sangue, ed essendo il quattordicesimo giorno del citato mese, il Rev. Padre principiò a sentire un certo dolore per tutta la circonferenza della parte superiore dell'Umero, e posteriormente sopra alla scapola, che oltre all'incomodo grande, e dolore insieme sofferto in essa rimanevagli quasi impedito il moto della elevazione del braccio.

Fui pertanto avvisato per visitarlo, ed esponendomi egli i suoi incomodi, passai a visitare la parte malata ed ivi chiaramente riscontrai, che in essa, ma in spezial modo nella parte posteriore, vale a dire sopra appunto alla scapola, e per tutta l'articolazione ancora dell'Umero colla medesima una elevatissima infiammatoria flemmonosa, ed erisipelatosa, accompagnata

da

da un grado di colore affai pungente, da rossore, e durezza, da dolore assiduo, ed associato ancora da risentita febbre (a).

Tale infiammazione estendevasi non tanto per tutta la circonferenza dell' articolazione dell' Umero suddetto, quant' ancora scendeva giù giù serpeggiante per quasi tutta l' estensione del braccio, arrivando fino all' articolazione del cubito.

La febbre poi era del carattere delle acute infiammatorie solite destarsi in queste malattie con quel norabile aumento, che nel caso nostro ridusse l' Infermo in una massima agitazione, e smania; onde fu costretto a doversi posare in letto.

Con tali sintomi pertanto che s' affacciavano, io giudicai la malattia affai pericolosa; ma non ne volli però azzardare il pronostico, insegnandomi *Ippocrate*, che *morborem acutorum incertae sunt praedictiones, tum mortis tam salutis*; onde pensai convenevole cosa avvisare il di lui Medico, quale fu l' eccellentissimo Sig. Dottore Antonio Durazzini, che giudicò subito cosa necessaria di ricorrere nuovamente alla seconda emissione di sangue in dose di once dieci da farsi dal braccio opposto (b). Ma siccome qui per la copiosa pinguedine oscura, ed onninamente cuoperte da essa rimanevano le brachiali diramazioni venose, che vanno scorrendo per questa parte, si pensò di eseguire detto salasso dalla destra mano, ove in altre occasioni fu parimente praticato; poichè qui più che altrove scuoperte le vene apparivano, e in specie quella che chiamasi salvatella, dalla quale si estraesse la quantità di sangue dall' istesso Medico ordinata in dose di once 10.

Alla parte infiammata poi praticai l' applicazione di una frequente fomenta anodina, da usarsi più spesso, che fosse stato possibile; cosa che in effetto dai di lui allievi fu con diligenza eseguita.

Il giorno decimoquinto dell' enunciato mese, riveduto l' Infermo, lo ritrovammo affai più aggravato, e di febbre, e d' universale calore alle carni, con dolore di capo eccelsivo, con accrescimento d' infiammazione alla spalla, che scendeva al braccio, ed alla mano; perlocchè tutta la dimensione dell' Umero, cubito, e mano era divenuta di una esorbitante tumefazione, e gon-

(a) *Huiusce mali genus arguitur, maximo calore, sive ardore, dolore, duritie, rubore, febris, pulsibus, atque puncturis continuis. H.ist. Cap. II. P. I. pag. 224. de Phlegmone.*

(b) *Inflammationes graviores ab*

internis causis enatae sunt, utilissimum est incisio in brachijs, aut pedibus venae sanguinem pro ipsius hominis viribus larga copia detrabere. H.ist. de Phlegm. loc. cit.

e gonfiezza infiammatoria, contrassegni caratteristici di conseguente funelle (c).

Per tali minaccianti fenomeni esattamente osservati da noi nella persona del divisato Infermo, fu saviamente pensato dal prefato Medico di fare ripetere per la terza volta altra emissione di sangue d'once otto, da estrarsi dal destro piede: cosa che fu subito con ogni prontezza eseguita. Con tutto questo però tale malattia orgogliosa proseguiva sempre più nel grado stesso: anzi per cagione dell'etorbitante gonfiezza di tutta la parte del braccio comparve naturalmente una apertura piccola, appunto nella piegatura del cubito in quel luogo, in cui la prima volta fu fatta la prima emissione di sangue; indi la cicatrice si ruppe, e si dilatò talmente, che da questa stessa apertura comparve una copiosa suppurazione derivante dalle superiori vicinanze all'articolazione dell'Umero colla scapola, e che scendeva a forza di varie pigiature, e compressioni, che praticavansi per tutta l'estensione del braccio, e veniva a scaturire fuori a fonte dalla medesima.

In questo tempo però non tralasciavamo di usare colla massima diligenza, più spello che fosse possibile, le consuete fomentate, o posche da praticarsi alla parte inferma, per mezzo delle quali riscontravasi ogni giorno più qualche sorte di cedenza, e diminuzione d'infiammazione nel braccio non tanto, quant'ancora nel cubito; e mano a mano che ciò fu proseguito in sì fatta guisa fino al giorno ventesimo del suddetto mese. In questa dilazione di tempo procuravamo onninamente di fare usare all'Infermo spesso e replicate bevande consistenti in lunga limonata, ed acqua nitrata.

Ma con tutte le premurose nostre diligenze fino ad ora usate, si videro comparire al nostro Infermo maggiori sintomi, accresciuti in un tratto e molto svantaggiosi, ad assolutamente da riferirsi ad una metastasi, o sia trasporto di materie da un luogo ad uno altro nel corpo umano (d); e questa dimostrava infallibilmente esser seguita appunto nel nostro Infermo ai polmoni. Poichè la suppurazione, che in abbondanza scaturiva dalla piegatura del braccio, come accennai di

(c) *In inflammationibus semper fitur tumor, rubor, calor, etque dolor, immo etiam pleurique pulsus, ac duritiam subnasci.* Heist. de Phlegm. loc. cit.

(d) *Si localis inflammatio com-*

mutata in pus dimittit materiam purulentam ad quancunque aliam partem corporis, abscessus per metastasim vocatur. Io. De Gart. lib. III. Cap. IV. pag. 103. de Supp. & Abscessu.

di sopra, la ritrovammo quasi del tutto abolita, e l'Infermo in sì fatta guisa comparve assai affannoso, con difficoltosa respirazione, con tosse impetuosa e secca, accompagnata da un non so che di rumore risuonante, e sibilo all' aspera arteria, con nuovo accesso febrile più ardito, e con altri pessimi segni, che rendevano il nostro malato molto pericoloso di sua vita.

A vista di tali circostanze funeste fu di nuovo dal suddetto Medico prudentemente pensato di procedere alla quarta emissione di sangue, da farsi dalla sopraccennata vena salvetella della mano destra, da cui n' estraissi once dieci. Ed inverso al nostro Infermo dopo poco l'emissione di sangue, che ritrovammo assai migliore di tutto l'altro fino allora estratto, parve di rimanere bastantemente sgravato. In fatti calmò ad esso l'affanno, fecesi la respirazione più libera, svanì per fine quel rumore, e sibilo; ed in quell'istante nella piegatura del cubito si riaprì di nuovo la strada alle solite materie purulente di sopra accennate, le quali come io dissi, s'erano del tutto sopresse; durando poi a scaturire così copiose per un corso di giorni venti. In questo progresso di tempo osservammo di quando in quando al nostro Infermo riaffacciarsi la febbre folita, quando maggiore e quando minore, accompagnata talvolta dai mentovati accidenti morbofi; poichè quantunque fossero state fatte fin qui larghe emissioni di sangue, e date all' infermo copiose bevande, osservando l'istesso una regolata dieta a norma di ciò che eragli stato prescritto, con tutto ciò di giorno in giorno, e di notte in notte era incomodato, nè di leggieri, da impetuosa tosse convulsiva, e secca, che l'obbligava dopo varie repetute scosse, ad espeller fuori dal petto con massima difficoltà materie gialle grosse, colloso, e bastantemente concotte, simili, o quasi simili a quelle che scaturivano dall'apertura del braccio. Tutto questo al certo cagion fu, onde restasse acerbamente vessato l'Infermo nostro.

Ridotta la parte adunque del braccio e cubito in questo progresso di tempo, di gonfia che ella era, per la copiosa suppurazione, allo stato naturale per mezzo soltanto di semplice medicatura, e di repetute lavande e foment, abolita restò altresì detta abbondante suppurazione, e ripieno osservammo di buona carne quel gran voto del braccio, che per cagione d'essa fra tutti gl'interstizii dei muscoli s'era ampiamente creato, e rimase altresì cicatrizzata la piccolissima esterna piaga, situata nella piegatura del cubito.

Ma appena abbiamo ridotto il nostro Infermo in stato di sua guarigione, ecco ad un tratto assalito da nuovo rigore di fred-

freddo universale per tutto il di lui corpo, ed in conseguenza comparvegli nuova febbre, assicurandoci, che per tutta l'estensione dell'articolazione del cubito polso, e mano dell' altro braccio destro sentivasi gran dolore, unito ad un calore fuori del naturale: quindi è che visitata la parte malata, viddeasi quivi ancora promosso un principio d' infiammazione resipelatosa serpeggiante per tutta l' articolazione del cubito, e che dal cubito passava al polso, e dal polso prendeva sempre più maggiore estensione per tutto il dorso della mano, e dal dorso alle dita tutte. Fu poi sì veloce il progresso con cui crebbe la febbre, il dolore, il calore, che in breve si tumefecero braccio, cubito, e mano e dita; talmentechè, oltre ad avere resa questa parte molto gonfia, anche dura ed irrigidita la osservammo (e).

A tali inaspettate apparenze di nuova malattia infiammatoria pensammo ancor qui di passare senza altro indugio all' uso della frequente posca, o fomenta da praticarsi spesse volte per tutta quell' estensione di malattia: ed essendo in seguito sopraggiunto all' Infermo un' impetuoso insulto febrile, fu giudicata prudente cosa dal prefato Medico di procedere alla quinta emulsione di sangue in dose d' once otto, da procurarsi dalla safena del piede sinistro, come fu eseguito; lo che in vero, con tutto che il sangue fosse molto infiammato e scarso di siero, e durissimo al taglio, servì di non mediocre sgravio al nostro Infermo, mentre restò molto la febbre diminuita.

Ma questa infiammazione poi così ardente, nel corso di giorni sei da che ebbe il principio, parve, che desse quasi apparenti segni di degenerare in suppurazione, per facilitare sempre più la quale pensammo di lasciare la posca suddetta, e passare all' altra indicazione curativa dell' empiastro composto di midolla di pane, latte vaccino, e malva passata per staccio, e tutto insieme l' applicammo per varie volte alla parte inferma (f). Ed in vero dall' immediata applicazione di tal genere d' empiastro s' accelerò in breve la suppurazione, che poi finalmente c.

F

ma-

(e) Si per cutim diffunditur rubedo aliquando ad flavedinem vergens, late se dispergens, pressione digitorum remittens calorem, sed statim rediens ablatò digito premente, saepe mutans locum, & priorem saepe repetens cum exigua intumescencia satis facile digitis comprimenda cum mordaci, & acri ardore, vel nulla

pulsatione, plerumque post febrem erumpens, erysipelas vocatur. l. De Gort. Lib. X. Cap. IV. P. 1418. pag. 180. De Erysipellate.

(f) Promovere ipsam suppurationem per propria quaedam medicamenta maturantia convenit. Heist. Cap. III. P. IV. pag. 129. de Suppuratione.

manifestò tale sopra al dorso della mano destra, in cui convenne creare con lancettone un taglio un poco obliquo, ed in tal maniera si dette l' esito alle materie marciose in essa abbondantemente contenute (g).

Dopo l' uscita finalmente delle purulenti materie restòvi un ampio vuoto, il quale andai riempiendo alla meglio di morbide, e sottilissime fila asciutte, e cuoprendo le medesime col detto empiastro; e con un tale metodo di medicatura per alcuni giorni andai avanti con massimo profitto dell' animalato stesso.

Il giorno dopo la fatta apertura sfasciai la parte inferma, e con docciature di pura acqua resi pulita quella profonda piaga, in fondo di cui s' ebbe luogo di bene discernere scoperta in buona parte porzione di alcuni tendini dei muscoli estensori delle dita con biancheggianti porzioni aponeurotiche de' medesimi, i quali al nostro sguardo comparivano gonfi, ed alquanto infiammati. Da questa scuopertura e dalla quantità della suppurazione in un luogo così composto, e tanto difficile, noi avevamo luogo di temere dello storpio; e se ne fece il prognostico (b). Ma nel progresso di varj giorni cominciò a vedersi a poco a poco diminuire non tanto l' infiammazione, e la gonfiezza della parte, quant' ancora il gran vuoto prodotto dal disfacimento della suppurazione, in maniera tale che rimanevano sempre più coperte le già descritte parti dei tendini dei muscoli estensori, e flessori delle dita, e già si potea presagire, che in breve succeduta fosse una lodevole desiderata guarigione. Dunque allorchè credevasi d' avere assolutamente riottenuto il nostro Infermo al sicuro porto di sua perfetta salute, ecco tutto in un tempo riasfacciar si vedde al medesimo nuovo rigore universale di freddo, assai però minore del primo sofferto, ed in conseguenza ecco ricomparsita nuova febbre; manifestandoci il buon Religioso, che ei sentiva un certo ardente calore, accompagnato da grave peso nel braccio sinistro, dove avanti, come si notò di sopra, era stato malamente attaccato dalla grave divisa malattia infiammatoria, e suppuratoria.

Vistai pertanto di nuovo la parte, e la ritrovai molto tumida, e razzata da infiammazione, e dura; quale toccata in diversi punti induceva un dolore; riscontrandoci di più col tatto un

(g) *Omnis materia corrupta quam puratio fuerit, periculum certe est. He-st. Cap. VIII. pag. 231. De Abscessu.*

(b) *Praesertim si gravior sup-*

un calore bruciante, ed oltre al calore, dalla parte esterna massima del braccio un certo romoreggiamento, che essendo equivo-co non dava allora manifesto segno d' esservi adunata nuova purulenta materia, ma pareva piuttosto essere aria falsata nel medesimo (i).

Non ci rincrebbe frattanto d'aspettare per qualche giorno segni più certi dei primi, affine d'assicurarci maggiormente della natura di questa nuova recidiva malattia, applicando per allora alla parte affetta il di sopra accennato empastro per vedere, se mercè di tal metodo più manifesto comparso fosse al tatto ciò che fin qui oscuro, e confuso del tutto rendevasi. In fatti dopo il corso di quattro giorni avemmo luogo di essere a sufficienza sicuri, che in essa parte s' erano in copia fatte, ed adunate altre materie marciose, le quali allora col tatto ondeggianti sentivansi.

Per la qual cosa risolvemmo in fine di fare un taglio rettilineo nell' esterna parte del braccio, nella quale più che altrove manifestavasi un simile ondeggiamento. Tanto eseguito fu, ed in tal maniera fu dato esito ad una gran quantità di materie purulente, simili appunto alle prime già di sopra notate, le quali il braccio affatto, o quasi affatto vuoto rilasciarono di bel nuovo.

Nel periodo di circa giorni sedici, nei quali medicavamo detta parte colle semplici fila, e lavande d'acqua pura, andavamo rimirando ogni giorno più a diminuire e scemare tale suppurazione copiosa, affinchè restasse quasi abolito quel gran spazio vuoto del braccio, creato (come pocanzi dicemmo) dalla sopraggiunta inaspettata suppurazione, e s' ottenesse finalmente in tutto e per tutto pronta la guarigione.

In questa descritta dilazione di tempo il nostro Religioso infermo restò anche libero dalla febbre non solo, ma ebbe la sorte ancora di vedere cicatrizzata la piaga situata tanto nel dorso della mano, quanto quella situata nella piegatura del cubito, ed alla per fine quella ultimamente descritta della parte esterna del braccio medesimo, senza essere sopraggiunte altre morbose mutazioni; e così finalmente dopo un corso di mesi due, e giorni 6. rimase del tutto guarito, senza che le dita della mano restassero

F 2

im-

(i) *Circa materiam ex abscessibus via videtur observatio ex. Hist. loco aductionem, ipsa praesertim necessaria citat.*

impedite, come dubitavasi nel sopra accennato prognostico. Laonde potete liberamente tornare alle solite consuete incombenze dal Regular suo Istituto ordinate.



OTTAVA OSSERVAZIONE

Sopra una puntura nel dito Indice della mano sinistra, seguita nella Persona di Fra Adriano di Santa Maria della Città di Trento, Converso dei Molto Reverendi Padri di S. Paolino Carmelitani Scalzi di Firenze il dì 10. Novembre 1764.

FRA Adriano di Santa Maria della Città di Trento d'anni 50. di temperamento di corpo cachetico, e molto bilioso, essendo andato la mattina del dì 10. suddetto a fare le solite provvisioni di pesce, e presentatosi ad uno di quei banchi sopra cui varie, e diverse forte se ne ritrovavano, e volendo il modesto Religioso prevalersi d'alcuni di quegli, che si chiamano Paraghi mescolati con altro diverso pesce, fu Egli obbligato a farne la scelta, e volendo trarne uno per forza dagli altri molti da una di quelle acutissime punte, o spine, che sulla schiena di questo pesce sogliono essere numerose, restò punto ad un tempo nell'estremità del dito Indice della sinistra mano, in cui provò egli subito gran dolore, con scossa, e tremore di tutto il braccio, e corpo; ed osservò tramandarsi da detta piccolissima ferita un umore sanguigno, che in breve restò.

Il buon Religioso, che non curò un tale accidente, proseguì a scegliere il suo pesce, e non solamente in quel tempo, ma ritornato al Convento attese alle consuete domestiche occupazioni.

Ma dopo il corso di ore tre dalla fatta puntura sentiva in detta parte or più, or meno dolore pungitivo. Intanto passò il giorno del Sabato e la notte, senza sentirsi ulteriore incomodo: la mattina però della Domenica 11. del suddetto mese, essendo io andato in detto Convento per medicare altri di quei Religiosi malati, lo vidi a me comparire, dicendomi ridente le seguenti parole: *Mi punsi ieri mattina questo dito: osservi, ma non mi pare che si sia cosa da farne conto; sento però dentro un piccolissimo incomodo dolore,*

roso, che non mi apporta sotto sopra gran fastidio; non sarà niente.

Visitai per tanto il dito ferito, per dir la verità, appena vi osservai una quasi impercettibile ferita; onde per ordinare al melesimo qualche cosa gli proposi l'immersione della mano tutta nel bagno caldo di semplice acqua pura; cosa che non fu da esso posta in uso.

La mattina del lunedì si presentò parimente e mi disse, che il dolore al dito eragli molto cresciuto, e che ad esso pareva molto gonfio, ed infiammato; perlochè rivisitai la parte malata e scopersi allora con chiarezza maggiore, oltre all'accennata tumefazione, una razzatura altresì infiammatoria, non tanto vicino alla sofferta puntura, quant' ancora per tutta la circonferenza del dito stesso e col'a continovazione razzante per il dorso tutto della sinistra mano, con calore, con rossore, e con durezza tale, che toccandola risvegliava ad esso un eccessivo dolore (a). In tal circostanza gli ordinai la fomenta, o posca, da applicarsi alla tumida ed infiammata parte p.ù spesso che fosse stato possibile.

La sera del Lunedì crebbe a dismisura nell' offesa mano il dolore così acuto, e spasmodico, che cagionò all' Infermo Religioso gran smania, ed agitazione per tutto il di lui corpo: quindi comparve la febbre, s' aumentò l' infiammazione tant' oltre, che s' estese per tutta la circonferenza della mano, dita, polso, e braccio, e comparve tutto questo articolo notabilmente gonfio, e dolente; come s' osserva alla Tavola prima Figura quinta A A.

Alla vista di così orribili fenomeni stimai bene, oltre a farle subito una emissione di sangue dal braccio opposto d' once dieci; come c' avverte il Dotto Gio. De Gorter (b); quale poi fu ritrovato molto acceso, ma copioso di siero, ed anche facile al taglio. L' uso ordinai altresì della posca suddetta, e l' immersione fra giorno parimente della mano, e braccio nel bagno d' acqua di malva da proseguirsi per tutta l' intiera notte del Lunedì; la quale per vero dire, passò con non poco incomodo, mentre si trovò aggravato da maggiore calore, non solamente alla parte tutta,
ma

(a) In inflammationibus semper fieri tumorem, ruborem, calorem, atque dolorem, immo etiam plerumque pulsus, ac duritiem subnasci. Heist. Cap. II pag. 225. P. V. De Phlegm. motum vitalem autum esse inflammationis causam. Io. De Gort. Lib. III. Cap. III. P. 512. De Inflamm. (b) Immo sanguinis missionem, si impetus nimis negat, hoc semper esse faciendum. Io. De Gort. loc. cit.

ta ma eziandio universalmente al di lui corpo; segno era questo caratteristico di risentita febbre, la quale a sì alto segno lo rese agitato, ed inquieto:

La mattina pertanto del martedì visitato l'Infermo lo ritrovai certamente più quieto, e la febbre parimente della scorsa sera quasi in una declinazione da sperarne bene; a riserva soltanto della accesa infiammazione della mano, che mantenevasi nel grado stesso di calore, e di tumefazione del giorno precedente. Con tutto ciò si notava di più, che la circonferenza dell'estremità del dito indice era comparsa sulla superficie esterna un poco nereggiante, e la ferita stessa di maggiore estensione, e gonfiezza. Di qui poi scaturir si vedeva un sottilissimo umore linfatico, e sanguigno, il quale veniva fuori spremuto in sequela di una forte strozzatura cagionata dalla cuticola grossa, e callosa circondante tutta la parte affetta.

Ed invero una tale stretta serratura esisteva non solamente nella prima articolazione dell'indice col metacarpo della mano, ma del dito medio ancora, e successivamente alle altre dita, osservandosi sopra alle medesime nelle loro rispettive articolazioni strozzate grosse rughe cuticulari, le quali dura, tosta, ed irrigidita rendevano quasi affatto non solo la mano, ma eziandio le dita medesime, come chiaramente si vede nella medesima Tavola alla Fig. V. *b b b b*; per salvare le quali da una rischiosa minacciante mortificazione per l'intercetta circolazione del sangue in dette parti, convenne tagliare gentilmente negli spazi di ciascheduno delle dita massime per la parte interna di essi l'ingrossata, e rugosa cuticola, dando in sì fatta maniera libero il corso al fluido, per prevenire, ciò che poteva infallibilmente succedere di sinistro a dextra parte (c).

In faccia di sì fatti accidenti pensai di mutare indicazione curativa, e passare all'uso dell'empiaastro fatto di pane, latte, e malva, applicandolo sopra alla mano inferma; ed intanto stimai bene di fare d'essa malattia un pericoloso prognostico da svelarsi allo stesso malato non solo, come ancora a quei Reverendi Padri premurosi assai della salute del medesimo; e questo sulla perdita del dito indice ferito e della mano, qualora l'ostinata presente infiammazione, e strozzatura non si fosse prontamente frenata; poichè dimostrava segni pur troppo chiari, e caratteristici di prof-

(c) *Causae gangraenae, & Sphaecelae sunt eae, quae quaecunque ratione sanguinis, & spirituum vitalium distri-*

butionem inhibere valent. Ercul. Tom. Primo pag. 177. De Gangraen. & Sphaecel.

prossimo e funesto passaggio a quel grado di malattia, quale coi vocaboli nostri viene appellata gangrena, e sfacelo. (d)

Certamente attesa la da me cangiata indicazione curativa col suddetto empiastro, e coll'altre usate diligenze non profitò molto il malato, quantunque si proseguisse un tal metodo per qualche giorno; dopo di che, sfasciata la parte, e cautamente pulita con docciature d'acqua calda, riscontrai allora, che tutta l'estremità del dito intice; cioè primo, e secondo internodio; era già del tutto mutato di colore dal naturale al fosco, e nero; come si vede alla Figura medesima segnata e e e e. Toccati quindi i sopraccennati internodi perduto aveano affatto il loro naturale calore, e la vera sensazione, essendo passati a quel genere di malattia chiamata sfacelo, vale a dire alla privazione totale di vita di quella parte (e); ed ebbi altresì luogo d'osservare, che tuttavia persisteva una considerabile infiammazione per tutte l'altre dita, come accennai di sopra, nel dorso della mano, nel polso, e nel braccio consecutivo; cosa che davami molto da temere col massimo sospetto di vedere sollecitamente tal malattia infiammatoria degenerare in gangrena, ed anche in sfacelo, non tanto delle dita tutte, ma quanto ancora della mano stessa; nel qual caso sarei stato necessitato a procedere con speditezza a risoluzioni più ardite, cioè alla mutilazione della parte, qualora esso male avesse dato tempo di effettuarla (f).

A fronte di circostanze tali funeste, onde se ne andava trionfando sì orrida malattia, stimai bene, *nec sine aliorum Chirurgo- rum, atque medicorum consilio*; come dice il dotto Eistero; di persuadere il Malato, e quei RR. PP. ancora di sopracchiappare a loro elezione un altro o più Professori di Chirurgia, per dare in tal maniera soddisfazione del mio ingenuo operaro.

Per la qual cosa fu determinato altro Professore di Chirurgia, col quale il giorno di venerdì, decimosesto del suddetto mese, unitamente consultammo in ordine a quella malattia. Visitata allora la morbosa parte stupii veggendo l'esorbitante gonfiezza infiammatoria della mano tutta, ed in particolare osservan-
do

(d) *Solet equidem gangraena nunquam non gravis admodum esse periculosa, quia facile in sphacelum transit, qui sine corruptae partis amputatione curari nequit.* Heist. Cap. XIV §. IV. pag. 250 De gangraen. & sphacel.

(e) *Si color partis afflictæ sensim magis nigrescit, cutis ipsa frigescit, fluctescit, atque sensus partis omnis*

usque adeo perit, sphacelum dignoscimus Heist. loc. cit.

(f) *Itaque inferum hic sed unicum auxilium est, ut cetera pars corporis tuta sit, ne ad partes integras malum serpat, membrum, sive partem, quae mortua est, auferre.* Celsus Lib. V. Cap. 26. §. 304. De cur. gangraen.

do il primo, ed il secondo internodio del dito indice della mano sinistra incominciata già ad essere di colore nero, particolarmente nella circonferenza tutta della parte ferita, dalla quale vedeanfi tramandare sottilissime materie sanguinolenti in abbondante quantità.

Dalla parte posteriore poi del dito stesso verso la palma della mano, vicino appunto al dito pollice, osservammo essere nata una piccola suppurazione cutanea, la quale nella Domenica giorno decimo ottavo del mese suddetto naturalmente s'apri, e da questa apertura scaturirono materie linfatiche, e purulenti in una discreta dose. Ma ciò nonostante si trovò l'Infermo oppresso da febbre maggiore degli antepassati giorni con molta accensione al volto, con calore universale al corpo tutto, con massima arsione, e con altri varj sintomi molto svantaggiosi per la salute dell'Infermo Religioso.

Fatta finalmente col prefato Chirurgo una seria riflessione intorno a tutte le particolarità, e fenomeni, che riunivansi in tutto e per tutto in questa divisa malattia infiammatoria, si convenne nella natura del male, nel prognostico, e nella cura ancora da me fin allora praticata, e da seguirsi anche in avvenire. Un tal sistema, a dir vero, fu proseguito fino al lunedì giorno decimonono del suddetto mese con scarso giovamento dell'Ammalato; conciosiachè vedendosi da noi ostinarsi sempre più una tal malattia, pensammo ambedue di persuadere quei Religiosi affine che si determinassero a sentire un terzo Professore di Chirurgia, e più ancora, quando fosse loro così piaciuto. (g)

Aderirono pertanto alle nostre richieste; e perciò il dì diciannove del suddetto mese all'intervento, e presenza degli Eccellentissimi Sigg. Dottori Michelangelo Targioni, e Antonio Durazzini Medici del Convento, ed a quella insieme del Sig. Ipolito Lomi, e del Sig. Filippo del Riccio nelle loro facoltà ragguardevoli, fu da me esposta ai medesimi dal dì 10. Novembre 1764., fino a quel giorno decimonono del suddetto l'istoria lugubre del caso presente, ed in appresso il prognostico, e cura fin allora da me praticata; per la qual cosa questi stessi Signori il tutto con soddisfazione sincera benignamente approvarono.

Quindi passai a far loro visitare la parte offesa, la quale sfasciata, e diligentemente pulita fu da ciascheduno di essi con som-

(g) *In accidentibus vulnerum multis gravioribus principem fere locum sibi vindicant dolores, siquidem ex ipsis vigilia, debilitas, convulsiones, inflam-*

mationes, gangraenae & denique ipsa mors nasci quam saepissime solet. Heist. Chirurg. Par. I. Lib. I. cap. 110 §. XVII. De vul. dol.

somma attenzione considerata. In effetto restarono ammirati ⁴⁹ in vedere non solo la natura di un male tanto precipitoso, ma le conseguenze inoltre, dalle quali corteggiato in copia veniva, e con ferezza.

Dopo seria ponderazione fatta da essi sopra la nota malattia unitamente tutti convennero, e nell' accennato prognostico, e nella ben giusta maniera curativa, e considerando i prefati Medici, che per giusti riflessi dell' Ammalato non potevasi procedere ad altre emissioni di sangue, stimaron bene di dare un correttivo ai fluidi del medesimo, col metterlo all' uso del siero depurato, da prendersi mattina e sera in dose di libbre una per volta; e tal confacevole prescrizione fu puntualmente eseguita per giorni quaranta.

Terminato alla fine il nostro consulto mi rimase l' incarico di proseguire il solito diviso metodo di medicatura, e di stare bene oculato ad osservare se quella accesa infiammazione andasse proseguendo il suo corso cotanto veloce, come lo era stato, fino alla mattina; e allora facesse subito avvistare tutti i prefati Sigg. Medici, e Cerusici consultati; affinchè nelle divise circostanze si proseguisse l' idea di sopra temuta, e da essi anche proposta, relativamente alla mutilazione del braccio senza altro indugio, a norma del nostro consulto, e colla loro approvazione, e presenza operare (b).

Or qui negar non si può quanto nella notte migliorasse l' Infermo; o ciò fosse stato per l' indefessa cura, e vigilanza dei di lui assistenti, o piuttosto per alto sovrumano soccorso; il fatto fu, che la mattina del dì 20. del suddetto mese per tempo visitai l' Infermo, e lo trovai molto quieto con minor febbre assai dello scorso giorno; indi sfasciata la parte riscontrai chiaramente con somma ammirazione, che la furriferita ardente infiammazione del giorno avanti erasi tre parti per così dire calmata, e per servirmi delle parole del dotto Eistero (*signa mitiora, ac leviora parantur*) la quale se tantosto non si fosse frenata era assolutamente necessario ricorrere alla prefata; e temuta amputazione (*Unde in amputando ipso brachio nobis procedendum erat*) parole del medesimo.

Ma di qui in poi in verità principiaronsi a vedere, e scuoprire chiaramente le funeste conseguenze tutte prodotte da una tale malattia infiammatoria, di cui ho esposta fin' adesso la narrativa.

G

Ecco.

(b) *Interim in quibusdam casibus, tam hominis servare velimus. Heist. amputatio tam ipsa necessaria invenitur esse, quamque vel maxime, si vi.* cap. XXXIV. pag. 308. De amp. man. num.

Ecco finalmente che comparve affatto nera, gangrenata, sfacelata, e fetente assai parte del dito indice, cioè primo, e secondo Internodio; come si vede alla Tavola Prima Figura VI. BB, ed il dito segnato dd: dove notti bene, che nel dorso della mano vedevansi due ampie aperture, una più dilatata dell'altra, di figura quasi sferica, che corrispondeva al di sopra a' due ossi del Metacarpo, che sostenevano i due diti sani, Medio ed Anulare, e l'altra meno ampia dell'istessa figura corrispondeva sopra all'Ossio del Metacarpo, che sosteneva il dito Indice infermo; come si vede nell'istessa Figura segnata B. ee.

Da queste piaghe tramandar vedevasi copiosa, e fetente suppurazione con disfacimento immediato di parti membranacee, e tendinose sparse, ed attaccate in questa parte. Una tale corruzione, e putrefazione persistette così in abbondanza a fluire dal giorno ventesimo primo fino all'ultimo giorno del mese suddetto; ed in questo progresso di tempo furono a sufficienza osservati in parte scuoperti affatto alcuni biancheggianti tendini sul dorso della mano, (e tali si vedono nella stessa Figura segnati fff), e in specie quei tre tendini del muscolo estensore, chiamato comune a tutte a tre le falangi, la di cui origine è posta nel condilo esterno dell'umero, e dalla parte posteriore dell'ulna, che poi divideasi in quattro massimi tendini, i quali hanno il loro passaggio sotto il ligamento del carpo, terminando finalmente nella faccia posteriore curvata di tutte le falangi dei diti (i). Uno di questi, che scorre nel dito Indice, l'ufficio di cui è di estendere il medesimo, (come si vede nell'istessa Figura ff), si staccò naturalmente dal suo nesso, cioè dall'ultimo internodio segnato dd, che era già sfacelato; il rimanente, poi che restò attaccato nel dorso della mano, nel tempo progressivo della cura si putrefecce dentro la piaga medesima segnata ee; gli altri due tendini finalmente, che vanno al dito Medio ed Anulare, come dissi di sopra, pian piano si rivestirono di nuova carne, nè più oltre si videro.

Pertanto da una tale divisata corruzione e disfacimento restò del tutto diviso il dito Indice dal Medio, talmentechè sciolto e disgiunto miravasi fin giù al Carpo della mano a guisa d'una biforcazione, (come si vede nella stessa Figura b b). Anche dalla parte posteriore, cioè nella palma della mano, (come si vede nella Figura VII. cc) s'osservò l'indicata difusione biforcata, che riman-va nel mezzo al dito Indice ed al Medio
fin

fin già al Carpo; come poc' anzi accennai, (e vedesi segnato all' istessa Figura *m m*), dove era una apertura piagata profonda, di figura irregolare (come si vede segnato all' istessa Figura *n n*) con altra piccola quasi al livello della prima; nel fondo di queste compariva una espansione membranacea, che dopo si putrefece, si separò, e dette con tal mezzo luogo alla scopertura in parte del muscolo abduttore del dito Pollice (alla stessa Figura segnata *o o*), e similmente a quella d' altri muscoli sottoposti, come i lumbricali ec., le quali parti muscolari e tendinose presentavansi del tutto sane.

Oltre alle scoperture notate pertanto osservammo di più ancora tutto, o quasi tutto scoperto ed isolato il grosso tendine flessore del dito Indice (segnato *r r r*), e similmente scoperti s' osservarono nel centro della profonda piaga, che esisteva nell' indicata palma della mano, i due tendini che vanno a piegare il dito Medio, ed Anulare, (segnati *r r r*); quali tendini derivano dal muscolo sublime, o perforato che prende il suo principio dal condilo interno dell' umero e del radio, indi dividendosi in quattro grossi tendini vanno ad inserirsi ai quattro diti delle seconde falangi (*l*); questi tre tendini poco fa notati si vedevano scoperti e più di questi scoperto quell' o del dito Indice, che s' osservava sotto il muscolo abduttore del dito Pollice (segnato *o o*), e salendo su su sopra la prima e seconda falange nuda e scoperta vedevansi inserirsi nella falange seconda, che era del tutto nera e sfacelata (come si vede segnato nell' istessa Figura *r r r r*).

L' offeso dito adunque progressivamente s' annerì, e rifeccossi, talmente, che bisognò che io lo tagliassi anche da essa parte, perchè esalava un fetore insoffribile (*m*). Lo che feci per mezzo di una ben robusta cesoia; colla quale portai via la metà del dito Indice sfacelato. Da questa operazione, derivò una piaga; che medicai colla solita semplicità di metodo, come feci in tutte l' altre piaghe, che consisteva nell' applicazione di pure filasseciute coll' uso preventivamente del bagno caldo praticato mattina e sera, colle quali diligenze l' Infermo Religioso andò sempre più profittando, talmente che nel tempo progressivo di

G 2

que-

(*l*) Heist. Comp. Anatom. loco citat.

(*m*) *Debinc factor pessimus ac Cadaverosus nascitur, ipsumque malum saepe nisi pars vitiosa a sana separatur, vel excidatur, sensim ad*

partes proximas procedit. Heist. De Gangraen. & Sphacel. loco citat. *For- sic quodam robusta pars corrupta decerpitur.* Pareus lib. XIV. Capit. 30.

questa cura dette piaghe sempre più si ripurgarono dalle purulenti materie, le quali, a norma che andavano di giorno in giorno diminuendosi, si riempivano altresì mercè l'apposizione di nuova carne, che fabbricavasi in esse; ricuoperto restava anche tutto quello, che scuoperto erasi, e disfatto dalla divisa corruzione, e suppurazione: ma se talvolta questa nuova carne mostravasi in apparenza fungosa, ella certamente digerita veniva alla sola applicazione dell'allume adusto; e con tal sistema interrottamente praticato sopra a dette piaghe si videro finalmente queste colla produzione d'una stabile cicatrice; e per conseguenza il surrisento Fra Adriano nel tempo, e termine di mesi due, e giorni venti rimase perfettamente guarito, con avere egli perduto soltanto la metà del dito indice, senza esserle restato veruno incomodo nella mano stessa, poichè questa era ritornata in detto tempo nel primiero stato di salute.



NONA OSSERVAZIONE

Sopra una malattia accaduta ad un Cavalier Fiorentino, consistente in sei Tumori, e Sini fistolosi penetranti nella cavità, e circonferenza dell' Ano il 17. Gennaio 1765. in Firenze.

UN Cavaliere in età di anni trentaquattro d' abito di corpo pletorico fu incomodato per lo spazio d'anni tre da una malattia fistolosa nell' Ano, la quale fu accompagnata da sei considerabili Tumori sarcomatosi, situati parte dentro, e parte fuori, vicini alla circonferenza dell' Ano. Questi Tumoretti sarcomatosi, a dir vero, ebbero l' incominciamento loro dal flusso Emorroidale, e principalmente da alcune Erpeti, e pustollette, che conseguentemente formarono dei piccoli ascessi, da cui ebbero la loro origine alcuni Sini fistolosi ancora; quali più, e quali meno profondi, e penetranti (a).

I Tu-

(a) *Fistulae in Ano sunt ex vulnere, aut Abscessu, aut ex haemorrhoidibus suppurata* ec. PARCIV De Fist. Ani Cap. XXIII.

I Tumori variamente disposti, e dentro e fuori nella detta parte, si vedono chiaramente coll' orifizio dell' Ano per maggior intelligenza alla Tavola prima Figura VIII. *dd ee*. Devesi osservare oltre a ciò, che nel centro dei prefati Tumori trovavasi un pertugio, o sino fistoloso dentro a cui passava liberamente uno specillo o tente come apparisce nella medesima Figura *FF GG MM II HH*, la quale introdotta accusava, che alcuni penetravano nel retto intestino circa tre dita traverse di spazio, altri a traverso tutta la circonferenza dell' Ano, come si vede alla lettera *GG*; chi per altra parte penetravano quasi un dito traverso, come si vede segnato *bb*, ed altri penetravano sotto appunto il muscolo sfintere dell' Ano circa a due dita traverse; e facendo poi obliquamente attaccava il retto Intestino, penetrando in esso circa due buone dita traverse, come s' osserva segnato *mm*; chi finalmente introdotta per la parte superiore del medesimo orifizio passava nel retto Intestino due dita traverse, come si vede segnato *FF GG*.

Questa varietà di Tumori sarcomatosi, e fistolosi fuori, e dentro alla circonferenza dell' Ano fino ad ora descritti furono da me a sufficienza riconosciuti coll' introduzione d' uno o più specilli, o tente sottilissime come dimostraj alla Figura VIII. e come appunto ce lo insegna il dotto Celso (*b*). Da queste malattie fistolose ogni giorno più tramandar vedevasi con non poco incomodo, e fastidio del nobile Infermo una materia sciolta sottile, sierosa, e sanguinolenta (*c*).

Sofferse per un lungo periodo di tempo, e con massimo coraggio una complicità tale di malattia il nobile Infermo, il quale tanto lungi dal farne dispreggio, che rendeva conto di tutti gli incomodi che soffriva al suo Chirurgo: ma questi, o che non conoscesse il pericolo della malattia, o che volesse di soverchio lusingare il malato, soleva dirgli, che non era cosa da temersi, e che il tempo l'averebbe sanata.

A tali proposizioni appoggiato proseguì l' Infermo Cavalier ad andare avanti per poco tempo; poichè arrivato che ei fu a compire l' anno quinto, da che ad esso incominciò il male descritto.

(b) *Ante omnia autem ut recte Celsus consulto, dimitti specillum. in fistulam convenit, ut quo tendat, & quam alte perveniat, scire possimus.* Celsus apud Ioan. Tagaul. De Fistula Cap. XVIII.

(c) *Ex carne pus levis album, & flavum,*

stetens copiosius ut fertur Cels. loc. cit. Ulcus vetustum profunde penetrans inter partes molles, fundens maiorem copiam puris vel i eboris. quam in tam parva cavitate contineri potuisset, vocatur Fistula. Io. De Gort. Lib. VII. Cap. VIII. pag. 101. De Fistula.

scritto, e trovandosi veramente in circostanze da non poter seguitare in sì fatta guisa, non tanto per il grande incomodo, che ei soffriva, quant' ancora per l'accrecimento di tale indisposizione, si determinò finalmente di farsi di bel nuovo visitare la parte inferma dall'istesso suo Chirurgo, nel quale aveva tutta la sua fiducia. Ma dopo che visitata l'ebbe disse essere il suo consiglio, qualora di tale malattia si volesse presto liberare, necessariamente ricorrere all'uso dei bagni di San Casciano, in vigore de' quali sarebbe senz'altro guarito. Fu veramente da esso Signore accettato il progetto, e tanto piacque, che non fu posto tempo di mezzo per mettersi in ordine, affine di sperimentare la bagnatura proposta, come seguì il dì 19. del mese di Agosto 1764.

Al prefisso termine intanto arrivati, e fatte diciotto bagnature, fu proposto dal suo Chirurgo, che fece condotto avea, un piccolo taglio, con dire che in tal maniera il Sig. Infermo sarebbe più sollecitamente guarito: aderì detto Sig. a quanto gli venne significato, ingiugnendo ad esso Cerusico, che facesse quello che conveniva. All' esposto del nobil Signore fu dunque dal medesimo creato un taglio, dal quale, alla narrazione che me ne fece, uscì in parte sangue ed in parte siero; a talchè, egli restò subito d'operare, soggiungendo tali parole (VS. adesso è guarito).

Dopo aver ciò fatto proseguì egli il resto della bagnatura, mediante la quale per vero dire, in parte frenato venne il corso delle fluide materie; e compita appena che ebbe la bagnatura s'incamminarono ambedue alla volta di Firenze, dove arrivarono il dì 6. del mese di Settembre 1764. La mattina dopo il ritorno del detto Sig. andando esso fuori per suo comodo, s'accorse, che già dall'Ano scendevano nuovamente da capo le solite materie, delle quali allora non fu fatta dal detto Signore gran considerazione, attribuendo ciò all'incomodo sofferto pel viaggio.

Ma non fu certamente così, poichè nei consecutivi giorni un tal flusso, accompagnato da soliti incomodi primieri, si manifestò maggiore, talmentechè tornò in breve a star peggio; ma ciò non ostante tenevasi dal Cavaliere il tutto celato, perchè per la morte del suo Cerusico si trovava Egli combattuto da vergognosa renitenza a manifestare ad altri il suo male.

Finalmente una volta fu poi costretto dalla massima necessità e per gl'incomodi dolorosi, che in tal parte soffriva, di farsi non tanto visitare, quant' ancora di sottomettersi a tutto quello, che per detta malattia fosse convenuto; purchè una volta di essa ne fosse rimasto affatto guarito. A tale effetto, fui

fui avvifato, perchè io facessi una vifita al prefato Signore; la qual cosa segui il dì 14. di Gennajo 1765. Dopo di avere esattamente vifitata la parte, fu da me con altri della Casa veduta, e rifcontrata ful fatto la natura della di sopra defcritta malattia fiftolofa, della quale volle affolutamente il Sig. Cavaliere, che più prefto che fosse ftato poffibile ne intraprendeffi la cura; il fiftema, ed il regolamento della quale fu preventivamente poffo in charezza che fu data al medefimo Signore, nulla temendo di dovere fofterire quei tagli, che indifpenfabilmente convenivano per diftruggere affatto la prefente malattia. Il metodo pertanto praticato nell' intraprefa cura fu quefto: prima d' ogn' altra cosa procuraj la totale demolizione di quei farcomatofi tumori, affine di ridurre tutto quefto male a piaghe aperte, dilatando ancor al poffibile tutti i defcritti fini fiftolofi (d).

Per efeguire una tale faftidiosa operazione, ebbi luogo di potermi fervire liberamente; e particolarmente per la demolizione dei prefati fiftolofi Tumori; delle femplici cefoie curve, e negl' altri fini poi di certi fottiliffimi lunghi, ed acut'iffimi ftrumenti di più forte femifalcati, che fi chiamano comunemente falcette; e tali fi vedono alla Tavola prima Figura VIII. 00; e come appunto a ciò operare, ce lo va infignando l' illuftre non meno che dotto Gio. de Gorter (e).

Tale demolizione, e dilatazione dei prefati Tumori, e fini fiftolofi, fu da me praticata ad una per volta non tanto per minorare l' incomodo al Sig. Infermo quant' ancora per la facilità, che io provava operando così; Ma dopo aver io ciò praticato applicava fopra alla parte tagliata fottiliffimi fluelli di femplici fila afciutte. E a dir vero nel periodo di giorni sette mi riuſci di portar via col taglio tutti quei Tumori farcomatofi, e di ridurre a piaghe aperte non folamente queſti, ma tutti quei fini fiftolofi ancora penetranti nell' Ano, nel fondo della maggior parte dei quali ritrovai una fuperficie affai calloſa, per diftruggere la quale ſpeſſe volte mi convenne porre in uſo la Pietra Infernale, al di cui contatto veniva conſumata in parte, o affatto detta calloſità.

La maſſima diligenza per vero dire di conſumere tutta que-

(d) *Sinus ipſe fiſtularis uſque ad ſues ſi fieri poſſit, dilatari debet. Cebſus apud Io. Tagſul. lib. III. pag. 304. & 305. De Fiſt. Curat.*

(e) *In Intefino recto ſpateat Fi-*

ſtula Ani, per Fiſtulam immittem- dum Inſtrumentum ſecans ſalcetum, quo autem immiſſo perſcindenda eſt. Io. De Gort. lib. VII. Cap. VIII. pagina 169. P. 1317. De Fiſtula.

questa callosa superficie, fu di più lungo tedio di quel che io richiedevano quelle esterne piaghe derivate dalla demolizione dei descritti Tumori. Furono tali piaghe però le prime a serbarsi, durando più lungo tempo quelle, che erano impiantate nella cavità dell' Ano, create dall' apertura, e dilatazione dei fini fistolosi colà addentro penetranti (f).

Dopo un sì lungo corso progressivo di tempo, ottenni finalmente una volta d'osservare un principio di nuova vegetazione di carne, sopra la quale poneva semplice fortissime fila asciutte, seguitando con ciò fino a tanto che non ebbe termine questa cura, la quale accompagnava mattina, e sera coll' uso preventivo di semplice acqua iniettata in detta parte per renderla sempre del tutto pulita, e pulite ancora quelle piaghe, sulla di cui superficie nascendo talvolta qualche strato di fungosa carne, consumava questa col mezzo ora della Pì tra Infernale, ed ora coll' uso del precipitato rosso di Venezia, mediante il quale a suo tempo ottenni delle medesime la cicatrice.

Ma alloraquando mi lusingava d' avere condotto al porto sicuro di guarigione il Signore Infermo, ecco tutto ad un tratto nella sinistra natica sotto appunto dove prima situati erano i primi tre tumoretti sarcomatosi e fistolosi, comparso altro Tumore di diverso genere, vale a dire infiammatorio del diametro d' un uovo di piccione; come si vede nella medesima Figura BB. Questo al certo molto era duro, e dolente, ma in breve progresso suppurò alla sola applicazione dell' empiastro di malva: per la qual sollecitata suppurazione mi determinai di creare quivi un piccolo taglio con lancetta, ed in sì fatta guisa detti esito a quelle materie in esso contenute. Vi rimase bensì in appresso una piaga, dalla quale fu prontamente guarito, anche prima di quelle dell' Ano; poichè di queste veniva contemporaneamente interrotto l' effetto, ora da frequenti biliose deiezioni intestinali, che incomodavano tratto tratto l' Infermo Signore, ora per cagione degli escrementi molto solidi, nell' espulsione dei quali, e nella forzata dilatazione, che in tal funzione soffrono le fibre muscolari componenti il muscolo sfintere dell' Ano ne accadeva talvolta, che riaprivansi alcune delle piaghe già cicatrizzate: del che m' infastidiva assai, non tanto per il ritardo.

(f) *Fistula Ani est ulcus sinuosum in Intestino recto, cuiusdemque vicinis musculis. Dolens* Chirurg. Ra-

tion. Libro III. Capl. III. Par. I. De Ani Fig.

damento della cura, quant' ancora per l' impedimento della ⁵⁷ cicatrizzazione quando appunto si sperava più pronta.

Pur finalmente dopo un periodo di tempo interrotto da tali diverse morbose mutazioni mi condussi a ridurre di nuovo in prossime vedute di guarigione il Signor Cavaliere Infermo, cosa che egli ottenne dopo mesi due, e giorni diciassette, coll' essere rimasto in detto tempo perfettamente guarito senza essere a lui sopraggiunto alcun' altro incomodo di simil descritto carattere ; come tuttora sta godendo perfetta salute.

DECIMA OSSERVAZIONE

Sopra ad una ferita di testa con offesa dell' arteria temporale destra, accaduta nella persona di Tommaso Ducci in Firenze il dì 10. Febbraio 1765.

TORNANDO di sera dal servizio del Sig. Commendatore Rondinelli per andare a casa sua Tommaso Ducci in età di anni 68. di temperamento di corpo igneo e molto bilioso, entrato in sua casa, e salendo la scala di pietra composta di 14. scalini, lunga braccia sedici, appena che esso l' ebbe salita si scordò egli ad un tratto non so di che cosa; onde fu costretto subito a dovere scendere detta scala, ma ad un tempo mise uno dei suoi piedi in falso, e sdrucciolò all' innanzi, e cadde giù precipitando, e percuotendo il capo nel muro, che anteriormente appiè di detta scala trovavasi. Da questa inaspettata caduta riportò subito una ferita lacerata, e contusa, con iscopertura del pericranio, e con offesa ancora dell' arteria temporale destra, del diametro di cinque dita traverse. di figura triangolare.

Fu trasportato alla meglio che fu possibile dai di lui parenti in letto grondante il capo di sangue, ed in questo frattempo, che da dette persone fu confusamente fasciato il capo ferito, fui tosto avvisato per visitarlo.

Arrivato dunque in detta casa visitai subito l' Ammalato; e lo ritrovai in letto col capo fasciato, qual fasciatura osservai oltre all' essere tinta tutta di sangue, vedevasi inoltre da tutte le circonvoluzioni scaturirne in gran copia; e di più cranii abundantemente inzuppati anche due guanciali sopra de' quali posava il capo di esso.

H

A vi.

A vista di tale emorragia, levai subito quella mal fatta fasciatura per riscontrare chiaramente cosa era mai seguito (a), ed osservai esattamente sopra appunto all'osso temporale destro da cinque dita traverse la di sopra descritta ferita. Dentro appunto in uno dei labbri della medesima si vedeva zampillare saltando con impeto il sangue (b), e volendo frattanto colle dita della mia mano fare un punto di forte compressione non fu al certo bastante a fermarlo, onde tentando io per forza riunire la detta ferita per mezzo della cucitura secca, questa ancora venivami impedita dall'urto impellente del sangue tramandato da detta arteria, sicchè non volendo io passare all'allacciatura della medesima affine di non cagionare con l'ago un'altra benchè piccola ferita; mi risolvetti ad un tratto di prendere varj fluelli di fila asciutte, e piumacciuoli situati in atto di riunire, e comprimere fortemente essa ferita; quindi feci tenere da due assistenti colle loro mani compresso questo apparecchio, ed in tal guisa ebbi luogo di fare una valida competente fasciatura retentiva. Ed in vero con tutte queste divotate diligenze di fasciatura, e compressione, scorgevasi non ostante da qualche punto della medesima scaturire qualche piccola porzione di sangue; laonde, affine di assicurare sempre più l'Ammalato dalla minacciante emorragia, ordinai ad uno di quelli assistenti, che colle sue mani tenesse fortemente pigiata questa parte (c); ed oltre a ciò insinuai al medesimo, ed agli altri di lui compagni di non mancare nella notte o l'uno, o l'altro scambievolmente di fare la detta compressione; osservando insieme se la descritta fasciatura compariva adagio adagio all'esterno tinta di sangue; lo che seguendo, ingiunsi loro, che fossero venuti prontamente nella notte stessa ad avvisarmi.

Dopo avere ciò fatto, ed ordinato sentii i polsi dell'Ammalato, che non ostante la copiosa emorragia seguita, erano molto turgidi, ed anche tirati; per il che mi determinai di estrarre dal braccio sinistro sole once cinque di sangue, ritrovato dopo scarso

(a) *Morbis disquievdus promptius solertius est.* Heist. introduct. in Chirurg. cap. XLIII. pag. 54

(b) *Si instrumentum vulnere san- cianit arteriam, ut aperta sit, sanguinem erumpit maximo impetu* lo. De Gort. P. 1229. c. 241. de vul. part.

(c) *Promptum est auxilium statim supra factum vulnus comprimere arteriae truncum fasciis, atque instru-*

mento torquente &c. lo. De Gort. P. 1229. c. 241. de vuln. part. loc. cit.

Quoties vero sanguinis ex vulnere cursus vehementior est, quam ut eiusmodi obsterione facta supprimi nequeat, deligandum promptius solertissime ipsi vulnus est, eiusdemque exploratio tantisper differenda, dum sanguis paucitus conquiescerit Heist. P. I. cap. XII. pag. 47. de vuln. univer. spec.

scarso di siero, ed al taglio molto resistente; finalmente partendomi questa sera lasciai il malato abbastanza quieto.

La mattina veggente per tempo ritornato a vederlo, lo ritrovai veramente coi polsi un poco più solleciti della scorsa sera, ed osservai, che tutto, o quasi tutto il fatto apparecchio non era comparso all'esterno colorito di sangue di più di quello, che fu la sera già scorsa: quindi, interrogato l'Infermo, se per tutto il di lui capo, e nella parte massime ferita sentiva dolore alcuno, mi rispose di sentirvi piccolissimo incomodo doloroso a segno tale, che non ne faceva caso veruno.

In tali circostanze adunque, non parvemi al certo necessario insistere nella compressione; bene è vero che efficacemente esortai il malato a tenere il capo fermissimo, osservando ancora egli un sommo contegno nel cibarsi, e nello stare ben difeso dall'aria cotanto nemica di tali ferite di testa. Detto ciò lasciai anche in questa mattina l'Ammalato in quiete tale da potersene contentare.

La sera in appresso tornai a rivedere l'Infermo, che stava nelle medesime circostanze per anco piacevoli, a riserva soltanto dei polsi più frequenti della scorsa mattina, significandomi di sentire del calore fuori del naturale per la vita, e dell'arsione ancora. Laonde io prescrissi, che gli fosse dato a bere lunga limonata, e che gli assistenti suoi si fossero astenuti dal farlo discorrere; la qual cosa aveva fatta per tutta l'intera giornata: di più in questa stessa sera mi determinai di docciare sopra a tutto l'apparato, e massime per tutta l'estensione della parte ferita una dose competente d'acquavite allungata con pura acqua, rinfrescando con ciò tutta quella parte senza apportare veruno incomodo all'Infermo; anzi dicevami, alloraquando arrivò a penetrare sopra alla ferita di sentirsi del sollievo non poco. Io dunque in questa sera lo lasciai per ancora bastantemente tranquillo per rivederlo la sera consecutiva.

La sera pertanto del dì 17. del suddetto mese tornai a rivedere il mio Infermo, e lo ritrovai assai più quieto della sera antecedente non accusandomi veruno incomodo. A tal nuova gli feci sempre più coraggio a seguitare in quella regola, e contegno da esso fin allora praticato; quindi presi a fare la consueta medicatura sopra essa fasciatura; e con tal sistema, usato mattina e sera e con profitto notabile andai avanti fino al giorno decimoquarto dal principio del male, ed allora fu che mi determinai sfasciarlo la prima volta per vedere cosa era mai seguito in giovamento di lui medesimo.

Ma per far ciò colla diligenza possibile, procurai bel bello, dopo avere sfasciato il di lui capo, d'ammollire tutti quei piu-

macciuoli, e fila tenacemente attaccate alle sottoposte parti, che molto ci volle a forza di repetute docciature di semplice acqua per volerle staccare.

Io stava però in questo tempo cautelato per tema di non torpare a rivedere nuovo sangue, la qual cosa recata avrebbermi costernazione non piccola; ma finalmente una volta dopo d'aver ottenuto il totale staccamento, ritrovai la ferita riunita a riserva di quel punto acuto, che formava la figura del triangolo, dove scuoperli una piccolissima suppurazione; tale bensì ella fu, che brevemente cessò colla sola applicazione di poche fila immerse nella solita acquavite mediocrementemente allungata.

Finalmente dopo un corso di giorni diciassette ritrovata la cicatrice, passai a lavare bene tutta questa parte con vino caldo e quindi con diligenza asciugatala non volli fare altra fasciatura lasciando in libertà la medesima. Laonde nel periodo dei diciassette prefati giorni, lasciai il suddetto Tommaso Ducci perfettamente guarito.



DECIMA PRIMA OSSERVAZIONE

Sopra una recidiva maluttia complicata dell' Occhio destro chiamata Ophthalmia, accaduta nella persona di Lucia Bigazzi il dì 18. del mese d'Ottobre dell'anno 1765, in Firenze.

Lucia Bigazzi giovine coniugata d'età d'anni 39. di abito di corpo pletorico, molto igneo, e bilioso fu sempre in seconda, e nella maggior sua giovinezza fu assuefatta a gravi fatiche dorsali specialmente al travaglio del Telaio di Drappi gravi.

Da questo esercizio continuato contrasse un copioso flusso albo accompagnato da un dolore sensibile, che nulla più, nell'osso sacro, con massimo bruciore e calore nelle parti genitali. Tutti questi effetti a dir vero, (s'io mal'non penso) derivavano dalla diversa qualità della materia fluibile dotata più, o meno di particelle-acrimoniose, e pungenti; le quali erano capaci d'ap-
por-

portare senza alcun dubbio, non solamente tali incomodi dolorosi, ma eziandio altri di conseguenze maggiori (a).

Nell'anno 1762. trovandosi dal pre nominato incomodo assai più travagliata, ed in oltre renduta impotente a proseguire il domestico suo esercizio, pensò ella di consultare il di lei Medico, quale con prudenza somma la consigliò a prendere il medicamento della Salsapariglia, per tentare, s'era possibile, che per la forza di questo tal malattia abolita si fosse.

Ella di tutta voglia acconsentì ad una tale proposta, e ne restò talmente persuasa, che diede subito di piglio a fare preventivamente quella conveniente, e necessaria purga prescritta dallo stesso medico; dopo di che le furono da esso fatti prendere numero 24. sciroppi di Salsapariglia, con averla tenuta ad una esattissima regola di vita (b).

Ma per verità, benchè il medicamento le fosse apprestato col riguardo maggiore, ella non solamente non ne riportò quel profitto, che sperava, ma ne contrasse anzi una Oftalmia nell'Occhio destro così veemente, ma non di lunga durara, che lasciolla di tempo in tempo incomodata. Quindi è che seguitò l'infelice Donna ad essere sempre travagliata dalla di sopra notata malattia, senza il minimo alleggerimento, talmente che andò così sofferente avanti, fino all'Estate dell'anno 1763.; nel qual tempo determinossi spontanea di volere praticare i bagni dell'acqua corrente del fiume Arno, quali fece comodamente, e ne ottenne miglioramento notabile talmente, che ripetere gli volle anche nell'Estate dell'anno veggente 1764., com'ella fece fino al numero 20. bagnature, le quali apportarono ad essa un profitto così grande, che non più oltre querelavasi del suo male.

Andò certamente innanzi in così piacevoli circostanze fino all'anno 1765.; nè qui debbo passar sotto silenzio, che in quel tempo si combinò una strana, ed incoostante stagione quasi tutta costantemente piovosa, ed in conseguenza da non potersi dalla

don-

(a) *Quod effluit modo album, modo pallidum, modo flavum, viride, aut subnigrum, modo acre, & erodens, tetrum, quandoque graveolens decoloratur facies, dolet spina dorſi, proſternitur appetentia, oculi pedesque intumescunt, animi memor gravis, & diu protrahit ſuorem el-*

bum frequenter producit. Teste Sylvio Deleboe apud Allen. in Synop. Art. 1410. Vol Fluor. Ab.

(b) *Purgantia parcius adminiſtranda; ſuariferæ & diuretici ſunt proficua, maxime decoctum & liquet diutius continuata hunc Morbum ſanot. Apud Allen. loc. cit.*

donna indisposta ripetere la consueta bagnatura, come avrebbe desiderato.

Esortata pertanto fu a supplire co' bagni in casa propria d'acqua calda come fece fino al numero di 24. Bagnature, dalle quali riporronne danno notabile, poichè l'uso smoderato dell'acqua troppo calda da essa con massimo piacere praticata, mise gli umori del corpo suo cotanto in moto, che si riaffacciò l'antico flusso, ed i soliti dolorosi incomodi più crudeli e pericolosi.

Per la qual cosa il suo Conforte premuroso della di lei salute, volle che io la visitassi, e nel tempo stesso ne intraprendessi la cura. In fatti esaminata la natura del male pensai a norma della narrazione fattami dalla Malata che miglior compenso non vi fosse che quello di rinnovarle il medicamento della Salsapariglia; quale fu approvato anche dal di lei curante Medico da praticarsi col massimo riguardo, alla qual cosa ella ben volentieri acconsentì (c).

Noi sull'idea però di curarla seriamente, si volle insieme uniti prima d'ogni altra cosa disporre la Malata all'uso del siero depurato da prendersi mattina e sera in dose di libbre una alla volta per alquanti giorni, per indi poi passare ad una discreta emissione di sangue dal braccio; cosa che fu certamente eseguita: dopo di che gli si fece prendere numero 20. sciroppi di Salsapariglia.

Nè spiegar fo a bastanza il profitto, che ne risentì quasi subito dopo avere ella sorbito il quinto sciroppo del medicamento; cosa che dava da sperare sollecita, e pronta guarigione. Ma tosto che ella ebbe già bevuto l'ottavo sciroppo, si osservò tutto in un tempo suscitarsi quella stessa infiammazione dell'occhio destro, che soffersse nel di sopra accennato tempo del 1762.. Osservando essa essere la presente malattia infiammatoria più veemente e impetuosa della prima; così disse ella, cagionandole questa punture oltremodo acute, e spasmodiche, a tal che s'estendevano per tutto il di lei capo e massime nella destra parte dell'occhio, dov'era attaccata da sì ardente infiammazione.

L'oc.

(c) *Fluxus Albus, etiam si non sit virulentus secus ac in viris, tolli non potest nisi remedia lui venere proprijs; cura autem ut recte incipiat, institienda est venae sectio.* Apud Allen in Synop. Art. 1413., 1416. Farræ sent.

L'occhio parimente, oltre a tramandare copiosa umidità, era divenuto altresì molto tumido, ed infiammato; quale ce lo descrive il celebre Lomnio (d). Per la qual cosa fecesi una discreta emissione di sangue dal piede in dose d'onze otto tanto celebrata in simili malattie Oftalmiche (e). Ed in vero dopo tale operazione parve, che questa veemenza infiammatoria accompagnata da una copia di mordaci lacrime, tramandate dall'occhio medesimo, prendesse un corso periodico, e molto più piacevole; talmente che dopo il giorno ottavo dal suo principio diede quasi segni manifesti del suo pronto abolimento (f).

Ma la notte dell'undecimo giorno fu l'infelice Inferma assalita nuovamente da sensibilissime dolorose punture nell'occhio medesimo, e nel capo, che non le permisero trovare riposo alcuno. In fatti visitata, che ebbi la mattina seguente l'Inferma la ritrovai in grande agitazione, cagionata da nuova accensione infiammatoria simile appunto alla già sofferta.

Con tutte queste triste apparenze però tal recidivo corso di male rese poi piacevole; mentre nel giorno 19. diminuì, e cessarono ancora tutti quei sintomi dai quali era stato accompagnato.

Nel giorno ventesimo secondo ecco tutto a un tempo insortita di nuovo per la seconda volta altra crudelissima guerra infiammatoria all'occhio stesso, quale pronosticava un corso assai più lungo dei due antecedenti; poichè maggior fu il dolore sensibile per tutto il globo dell'occhio, corrispondente a tutta la volta del capo dell'Inferma donna; maggiore la perdita dell'umore acquoso, tramandato dal medesimo e dal naso ancora; maggiore finalmente la gonfiezza con altri fenomeni; le quali cose tutte resero l'Inferma inquieta molto, ed agitata, ed anche febricitante con molta arsione, per il che fu costretta bere copiose diluenti bevande di lunga limonata, ed altre di simil genere.

Frattanto in mezzo a questi affalti morbosi diè termine al

(d) *Vibens oculos urget inflammatio cum multo dolore, & tusione, & tumore, & ardore, & rubedine cum tanta puntione, ut oculi tamquam infixa acule aut spina stimulari videantur* Lomnius apud Allen. in Synop. Artic. 1021. De Ocul. Morb. V. Ophthalmia.

(e) *Nullus Morbus, qui natura sua venarum & Arteriarum saepius possidet, quam Ophthalmia.* Apud Allen. Artic. 1026. loc. cit.

(f) *Copiosiores lacrimarum effusiones, ut ut mordaces, Ophthalmiam non diutius duraturam indicant.* Apud Allen. loc. cit.

al medicamento con esito molto felice rispetto alla prima malattia del flusso albo. Ma la recidiva Oftalmia cresceva a passi precipitosi, ogni giorno più, ingombrandosi talmente l'occhio, che l'Inferma già perduta avea la chiara luce e distinta visione degli esterni oggetti, che non se le rappresentavano più nel loro naturale stato, ma confusi torbidi, verdi, e cerulei e con altri mentiti colori; segni erano questi caratteristici, che l'infiammazione era penetrata fino alla retina, e che l'arteria centrale non si scaricava liberamente del suo sangue, e ritrovava qualche ostacolo (g).

Per la qual cosa, erano già trascorsi trentasette giorni di questa veemente malattia infiammatoria, talchè non compariva per anco alcun segno di miglioramento. Ma vero è, che da questo periodo di tempo in poi incominciaronsi a vedere alcuni segni di tregua, che appoco appoco ce ne fecero sperare la deliata pace.

Ed in fatti l'Inferma incominciò a poco a poco a vedere gli oggetti, non altrimenti falsi, e di fallaci colori dipinti; ma bensì della loro propria natura; cosa a dir vero, degna d'osservazione, e non così facilmente accadere in simili divise Oftalmie cotanto pertinaci, e ripetute. Queste certamente d'ordinario portano seco il pericolo della perdita della vista, lochè fu preventivamente pronosticato, tanto ad essa Malata, quanto ancora ai di lei Parenti. La cura per tanto praticata dal principio della divisa malattia fu certamente la più semplice, che sappia dettare l'Arte Chirurgica, commendata in casi simili dal Dottissimo insegnamento dei più valenti Medici (b).

La prima volta adunque che io intrapresi la cura della detta malattia, mi determinai d'usare localmente alla parte malata semplici, e diluenti lavande d'acqua comune aggiuntevi poche gocce di aceto comune; ma continuando il male, oltre averle praticato il salasso dal piede; mi convenne passare

(g) *Nam si signa externae Ophtalmiae adfuit. Vid. rubor, calor, dolorque, & nihil aliud visui se offert. est solum Ophtalmia externa, at si praeter illa & externa signa videantur Ophtalmico oculis suis observari mufcae in aere volitantes, pulvisque quilibet obscurus vagare, aliarumque incerta simulacra, tum erit Ophtalmia*

interna externae coniuncta Pitcairn. in MS. apud Allen Artic. 1027. loc. citat.

(b) *Medici praestantiores uno ore mouent, ne topica in principio Ophtalmiae applicemus; multi enim caeci facti sunt medicamentorum copia.* Apud Allen in Synop. Artic. 1030. loc. citat.

fare all'applicazione di quattro coppe scarificate alle spalle, estraendo da esse once sei sangue molto acceso, e resistente al taglio. L'effetto seguì molto propizio, conciosiachè dopo dieci giorni restò l'Inferma quasi libera, come sopra accennai (i).

Lo stesso metodo di semplici diluzioni osservai colla medesima facilità nella prima ricaduta, quale similmente dopo altrettanti giorni rimase ella nuovamente quasi libera affatto. Ma poichè nella seconda recidiva sopraggiunse il male cotanto vemente con pessimi sintomi, che cagionarono all'Inferma donna la febbre, come notai di sopra, e che minacciavano perfino la perdita della vista, mi risolli allora di usare più valevoli rimedj per frenare un male così precipitoso.

L'applicazione delle sanguisughe dietro all'orecchie con una coppa insieme posta alla nuca, e scarificata con avere estratto in tutto e per tutto once cinque sangue molto tetro, e fibroso, e l'applicazione ancora alla parte malata dell'empiaastro fatto di polpa di miele appie sottilmente steso in panno fino, sopra a cui posi sottilissimo velo bianco, affine di non ingombrare l'occhio, furono bastantemente valevoli, non solo a farle cessare quelle acute punture dolorifere, ma arrivarono altresì ad agire in profitto dell'inferma Donna, che si mise in circostanze di femma quiete, rimanendo con ciò sommamente contenta (l).

Finalmente una volta con pari facilità, e con profitto massimo, ella acquistò nel progressivo tempo la desiata guarigione.



I

DE-

(i) *Ad huius curationem, ut recte fiat, praeter alias appropriatas evacuationes, cucurbitulae cum scarificatione humeris sunt affigendae etc.* Apud Allen. Art. 1035. loc. cit.

(l) *In gravissimis inflammationibus dolorem sedare solet Cataplasma pulp. pom. dulc. Et mul. apud Allen. loc. cit.*

DECIMASECONDA OSSERVAZIONE

Sopra la malattia accaduta nella persona di Maria Lucia Malenotti, consistente nella puntura d'alcuni tendini, e nervi scorrenti nelle dita della mano sinistra, seguita in Firenze il dì 24. Maggio 1766.

LA mattina del dì 24. suddetto la prenominata Lucia d'età d'anni 25, di temperamento di corpo cachettico, una delle donne, che era al servizio de' Sigg. Galeazzi, prendendo ella il gatto di casa per volergli dare, e per averlo con il massimo comodo atto appunto a non poterle scappare dalle mani, se lo pose fra ambe le ginocchia, e tenutolo quivi fortemente compreso, con la di lei sinistra mano teneva strette le due gambe anteriori del medesimo, e con la destra incominciò nel muso a percuoterlo.

Or mentre così lo batteva, ecco ad un tratto il gatto con violenza inaspettata superò la forza della mano, che teneva serrate e ferme dette gambe, s'avventò impetuoso alla mano sinistra della prefata Lucia, e sul dorso della medesima, credè con ardito, ed acuto morso otto piccolissime anguste, ma profonde ferite, come s'osserva chiaramente alla Tav. II. Fig. 1. segnate *iiii*. Fra queste, sei vennero fatte nella parte più carnosa del dorso della mano, e l'altre due più profonde in quel luogo appunto dove sotto agl'integumenti scorrono i tendini dei muscoli flessorj, ed i nervi che gli accompagnano, e vanno alle dita; due de'quali vale a dire uno che si porta al dito medio, e l'altro all'anulare, restarono subito secondo i segni diagnostici infallibilmente offesi.

Ed invero appena che la detta fanciulla sentì scriverli dai due, cred'io, acutissimi denti superiori, ed oltremodo sottilissimi, dei quali la natura ha dotate tali bestie, provò ella istantaneamente indicibil dolore, e tale e tanto egli fu, che subito cadde sopra una sedia svenuta con tremito convulsivo di tutta la macchina. (a)

Riajutasi finalmente dalla sincope, lamentavasi indi di dolore quasi insopportabile nel dorso della sinistra mano, e vie più maggiore sen-

(a) *Ea autem syncope, quae in tantum vulneribus accidit, ex vehementi dolore est creata. Gal. lib. duodecim Therap.*

festivalo, allor quando ella praticar volea il moto di flessione delle dita tutte, ed in specie dei due, medio ed anulare, i quali non poteva assolutamente piegare senza soffrire un gran dolore, che corrispondeva a tutta l'articolazione del pugno della mano stessa.

Per la qual cosa dopo un corso d'un' ora e più, da che ella restò ferita, viddesti tumefare il dorso della mano, e le dita tutte come si vede alla Fig. I. segnate *iii*; ma più tumide al certo divennero le due dita pocanzi accennate, medio ed anulare; come s'osservano segnati *bb*, con insopportabile dolore pungente, qual si era esteso per tutta la tumida mano. Infatti non trovando, nel passeggiare or quà or là spasmante, verun sollievo, nè quiete, fu necessitata mettersi a letto, e quindi farmi prontamente avviare, affine di visitarla.

Arrivato poco dopo, trovai l'Inferma in circostanze molto lamentevoli di gran dolore, che mi disse sentire per tutta la divisa mano, e dita: veduta la quale, oltre averla ritrovata molto tumida, e tumide parimente le dita, scorgevasi anche di più rossa e razzante, con otto minutissime ferite, come già dissi, due più ampie e profonde dell'altre, corrispondenti al dito medio ed anulare, dalle quali tramandar vedevasi un'umore acquoso sanguigno in discreta quantità, dalla qual cosa deducevasi l'offesa delle prenominate parti tendinose, (*b*) e nervose. A tali fenomeni, stimai bene di fare applicare localmente all'offesa parte infiammata la posca composta d'acqua di fiori di zambuco, aggiuntavi porzione discreta di aceto comune, da praticarsi più spesso che fosse stato possibile, (*c*) lasciando ai prodotti naturali quelle minutissime ferite, le quali cuoprii con fila asciutte.

Io frattanto sul dubbio massimo, che il gatto potesse essere rabido, feci alcune ben convenienti ricerche su tal proposito, e fui quindi bastantemente assicurato da tutti della casa non essere tale, poichè alla mia veduta il gatto stesso si cibò, e bevve.

La sera del dì 24. del suddetto mese tornai a visitare l'Inferma, e ritrovatala con polsi molto frequenti, e stirati, e col solito dolore pungitivo alla parte, e con maggior tumefazione, calore, e rigidità delle dita tutte, mi determinai a fare una discreta emissione di sangue dal piede; lo che la scorsa mattina, dopo

I 2

le-

(b) Si ex orificio humor aqueus, vel ichor quidam jugiter distillat, quod quidem praecipuum puncturae tendinis diagnosticum est habendum. Cheteld. apud Allen Cap. XIII. Ann. 1351.

(c) Abunde aliquando satisfaciit spongia, quae ex aqua, in qua sit aceti aliquid, maduerit &c. Gal. lib. 14. Therap. &c. ad Glaucon.

seguito il caso, ella in verun modo non volle che io la facessi: perlocchè estraſſi onçe otto ſangue molto acceſo, e ſcarſo d'umido, ed al taglio anche reſiſtente, e le ingiunſi di proſeguire le poſche nella ſutura notte, le quali fin d'allora diſſimi averle apportato del ſollievo non poco.

La mattina dopo fui nuovamente a viſitare l'Inferma, e la ritrovai nelle medefime vedute della ſcorſa ſera, con febbre però maggiore, e diſſemi, che nel corſo di tutta l'intera notte non aveva potuto prender verun ripoſo, quale per altro venivale interrotto da frequenti punture, e contemporanee ſtirature alle dita, e mano; talmente che di tempo in tempo coſtretta era, non tanto a ſvegliarſi, ma eziandio a ſcuoterſi fortemente. Oſſervata in appreſſo la parte inferma, la ritrovai oltremodo tumida, infiammata, ed irrigidita; concioſiachè al ſemplice tatto le ſi riſvegliava un eccelſivo dolore. (d)

A viſta pertanto di tali inforti, ed arditi fenomeni, ſtimai bene prima d'ogni altra coſa ripetere nuovamente altra emiſſione di ſangue dal braccio oppoſto all' Infermo, dal quale estraſſi onçe otto ſangue, qual fu molto infiammato, e ſcarſo d'umido, ed al taglio ancora aſſai più reſiſtente del primo, ch'estraſſi dal piede.

Dopo ch'ebbi ciò fatto, mutai indicazione curativa col fare immergere nel bagno caldo d'acqua di malva la parte inferma per un corſo di un'ora, e quindi applicai l'impiaſtro coſtituito di midolla di pane, latte vaccino, e malva paſſata per ſtaccio; (e) ed inoltre ai di lei Padroni, molto premuroſi della ſalute dell'Inferma, feci della preſente malattia il prognofico di quello che ſecondo i ſegni apparenti diagnoſtici poteva accadere, e come è ſtato avvertito ſaggiamente ſu tal propoſito da valenti Profeſſori di Chirurgia. (f)

E per dir vero, qualora tale impetuoſa malattia non ſi foſſe ſollecitamente frenata, poteva certamente portarſi a conſequence peggiori con danno notabile dell' Inferma Fanciulla. La ſera pertanto del dì 25. del meſe ſuddetto mi portai a farle la conſueſta viſita, con averla ritrovata aſſai più quieta della ſcorſa mattina,

ma

(d) *Ubi dolores ex nervo, vel tendine quodam loco nascuntur, difficilima plerumque curatio est; siquidem convulsiones, inflammationes semper ferre isid. m. superveniunt.* Heist. § XVIII. pag. 93. de vul. dolor.

(e) *Cataplasma parti affectae calide applicandum, mane, & vespere.*

Sidenam Apud Allen loc. cit.

(f) *Punctura tendinum est periculosior quam sectio; Apud Allen Art. 1350.*

Gravia, & crudelia ex percussis nervis ac tendinibus nasci mala possunt. Heist. loc. cit.

ma il dorso, e dita della mano mantenevanfi certamente tumide ed irrigidite e contratte, significandomi però d' esserle in parte mitigato il dolore. Quindi fattale proseguire la solita immersione della parte nel diviso bagno, e coll' applicazione parimente dell' empiaastro ingiunsi caldamente la regola esatta nel cibarsi, la quiete, e la persistenza di tenere fermo il di lei braccio in quella situazione, in cui lo posi la prima volta, giusta l' insegnamento del dotto Cheselden. (g)

La seguente mattina giorno 26. del suddetto mese tornato a rivedere l' Inferma la ritrovai certamente con pochissima febbre, dicendomi di aver ella nella scorsa notte riposato assai, che il dolore, che allora provava nella mano, e dita, era molto soffribile. Quindi sfasciata la parte, e tolto via l' empiaastro, la posi nel consueto bagno caldo, e lavata e pulita in esso comparve al solito tumida e ltrata; a riserva della sola infiammazione, quale era diminuita talmente, che prometteva pronto il suo termine.

Per lo che mantenni il consueto metodo di medicatura, senza verun altro accrescimento, della malattia presente, fino all' altra mattina 27. del suddetto. nella quale ritrovai l' Inferma molto quieta; ad eccezione delle due dita prenominate, che mantenevanfi ancora tumide, e contratte. Ella però mi disse allora, che fra gli spazi delle prime falangi sentivasi internamente molto frizzare, ma che una tal cosa era assai tollerabile.

La seguente mattina, 28. del corrente, ebbi luogo d' osservare dopo la consueta visita, che le due pocanzi accennate dita a poco a poco principiavano a riumidirsi unitamente coll' altre, e ferarfi altresì naturalmente le ferite; e di più ancora acquistato avevano discreto esercizio di moto di flessione da contentarsene.

Queste apparenze piacevoli al certo m' incoraggiarono viepiù a proseguire la fin allora usata medicatura, sempre però con notabile proibito, per altri due consecutivi giorni; ne' quali nell' atto stesso di fare praticare all' Inferma i consueti moti di flessione anche leggermente, ella sentiva gran dolore; specialmente nel luogo appunto, in cui erano state fatte dai denti del gatto le due più profonde ferite: quale incomodo durolle al certo altri due consecutivi giorni, passati i quali sparì affatto il dolore, si dileguò la tumefazione del dorso della mano, e delle dita parimente, le quali

(g) *In punctura tendinis iuxta extenso tenendum est.* Apud Allen in observationes, & ratiocinia Cheseldeni, brachium in situ acclinato, non Synop. loc. cit.

70
quali arrivarono a praticare bastevole moto di flessione ed estensione; onde allora ne concepì una speranza quasi sicura di perfetta guarigione.

A vista di un tale avanzamento a prò dell' Inferma donna, lasciai l'uso dell'empiaastro, e mi riservai soltanto la continuazione del bagno caldo, ripetuto sera, e mattina.

Ed in vero non so spiegare abbastanza quanto egli contribuì nei consecutivi giorni a favore della medesima; poichè il dorso della mano, e le dita tornarono del tutto nel primiero stato naturale, con le visibili cicatrici delle note ferite, come s'osserva alla Fig. II. segnate *nn*, *oo*; e quindi nel periodo di giorni ventisette rimase ella perfettamente guarita.

R I F L E S S I O N E.

Qui si può osservare, che i sintomi prodotti dalle ferite sudette, non dimostravano già essere rimasto offeso soltanto qualche tendine, ma bensì i nervi; e con tutto che l'Allen, e il Chelfdeno parlino così francamente delle punture del tendine tanto pericolose, è loro perdonabile un tale errore, perchè non consapevoli delle scoperte fatte dal Sig. Haller, e confermate dal celebre Zimmermann, e da altri dottissimi Professori, che sono vissuti con tanta gloria del secol nostro, intorno alle parti sensibili della macchina animale. Quindi è, che sembra doverli congetturare, che nella nostra ammalata tutto ciò che comparve di pericoloso negli accidenti, debba riferirsi a lesion di nervi. Così la lesione del nervo muscolo cutaneo del braccio, seguita alcune volte nell'emissione del sangue, ha fatto supporre la puntura del tendine di un muscolo. Questo errore però è stato modernamente e bastantemente smentito; ed una simile frase al presente non si ascolta che dalla bocca dei Chirurghi digiuni affatto delle cose anatomiche.

DE-

DECIMA TERZA OSSERVAZIONE

Sopra un vello, e voluminoso Tumore nel Ginocchio sinistro accaduto nella Persona del Rev. Sig. Francesco Barfi Cberico della Metropolitana Fiorentina, il dì 15. Maggio 1765. e 66.

LA seguente storia è stata da me aggiunta a tutte l'altre a solo oggetto d'istruzione universale; ma non già, perchè dell'avvenimento da descriversi in appresso, straro, e crudele sia stato il Professore Curante. Anzi debbo protestare sinceramente, che a riserva degli ultimi quattro giorni d'assistenza richiestami, e della sezione Anatomica del Cadavere, tutto qui viene da me riferito per la storia veridica, ed esatta, ricercata da me, ed avuta da Persone degne di tutta la fede.

Il prefato Sig. Abate Francesco Barfi in età d'anni 19. di temperamento di corpo melancolico, ebbe il principio nel mese di Maggio alla sua malattia, con un dolore nel sinistro ginocchio, che gli cagionava incomodo maggiore, alloraquando egli stava in piedi: ciò non ostante andò innanzi senza valutar il male per più della metà del mese di Luglio 1765., senza mai palesarlo ad alcuno.

Una mattina per tanto nell'alzarsi dal letto sentì nell'accennato luogo il dolore molto accresciuto, e tolleratolo per tutto l'intero giorno, non potè alla fine fare a meno, appena tornato che fu in sua casa, di mettersi in letto colla determinazione di conservare un riguardo per alquanti giorni.

In questo progresso di tempo, nel quale riguardavasi, usò alcune diligenze; ma la più significante fra queste, fu l'uso del bagno caldo di pura acqua, nel quale immergeva mattina e sera quasi tutta la gamba sino al ginocchio.

Da questo ne ritrovò tal profitto, che potè tornare fuori ai suoi uffizi, contentandosi di soffrire qualche piccola difficoltà nei moti di quella parte.

Per la qual cosa il dì 10. del mese di Agosto 1765. ritrovandosi in grado di salute da potersene contentare assistette alla Messa cantata; ma nello stare egli genuflesso provò tutto in
un

un tempo una tanto ingrata sensazione, che appena lo lasciò in grado di proseguire l'adempimento del suo ministero.

Dopo d' avere così sofferto per tutto lo spazio del tempo dei divini uffizi, ritornò nuovamente in letto, ed offerò che il suo ginocchio era divenuto molto tumido di quel che stato fosse nei giorni scorsi. Quindi continovandogli il dolore, pensò di chiamare un Professore di Chirurgia, il quale gli prescrisse l'uso replicato delle fomentè di malva. Ma queste, sebbene praticate per molti giorni, non gli arrecavano alcun profitto.

Non trovando egli pertanto per le dette diligenze fin allora indefessamente usate alcun sollievo, si risolse di sentire il parere di un Medico, il quale, dopo avere esaminato seriamente la malattia dal suo principio e progresso, giudicò a proposito una universale Medicatura per correggere un vizio supposto negli umori.

Ma tutto fu inutile: onde il Medico s'appigliò al partito di prescrivere l'applicazione al ginocchio del Cerotto Mercuriato, quando ciò fosse stato approvato da qualche Professore di Chirurgia.

Ma accrescendosi sempre più il male, senza vedere alcun profitto dagli apprestati rimedj, fu stimato espediente di chiamare un altro Professore di Chirurgia.

Venne questi, ed informato della natura della malattia e dei praticati soccorsi, soggiunse l'ordinazione dell'empiaastro di pane, e latte da ripetersi due volte il giorno.

Un tal metodo di medicatura in vero fu posto in uso per il corso di un mese intiero, ma senza il minimo profitto; anzi l'ensanguinazione sempre più s'accresceva.

Laonde passò a prescrivere l'empiaastro delle cinque farine, che potè usarsi per soli tre giorni, dopo i quali convenne sospenderlo immediatamente per motivo d'un dolore insorto nella parte ammalata, così veemente, che rese l'Infermo per più giorni consecutivi malamente travagliato.

In vista di nuovi morboi incomodi fu pensato di ripetere il semplicissimo, e piacevole empiaastro di pane e latte, ch'era stato per l'avanti applicato inutilmente. Ma passati pochi giorni, non ostante questa semplice, e piacevole medicatura innocentissima, crebbe la tumefazione del ginocchio, s'aumentarono gli acerbi dolori; per il che fu subito levato detto empiaastro, come supposto cagione dei medesimi, e contro voglia dell'Infermo fu riapplicato quello delle cinque farine, quale per altro, per cagione dell'acuto dolore nuovamente insortogli dentro il tumido ginocchio dopo due giorni fu costretto nuovamente a levar via.

Nel

Nel tempo stesso che il Chirurgo non mai timido a fronte dell' ostinata indole del male, procurava d'animare l'Infermo, e d'incoraggiarlo, per mostrare di non restare occupato senza far nulla, ritornò all'uso dell'empiaastro di pane e latte, ma senza utilità, anzi con notabile accrescimento di gonfiezza, di dolore, di calore, di tensione, e con accessi di febbre non piccola; cose tutte, che resero l'Infermo in uno stato assai funesto e lagrimevole; onde vedendo, che il carattere del male si faceva peggiore, pensò di rivolgersi ad altra indicazione, coll'applicare alla parte inferma il cerotto di gomma eleme; ma più di due giorni non potè soffrire il paziente questo rimedio esterno, perchè troppo violento fu il dolore che ne nacque.

Non sapendo per tanto il Professore a qual partito appigliarsi, tornò al più volte nominato empiaastro di pane e latte, come all'ancora sagra, e v'aggiunse della malva passata per staccio.

Quindi prudentemente operando consigliò i domestici dell'Infermo a volere procurare il sentimento di più saggi, ed esperti Professori; ed intanto si licenziò dalla cura.

Fu dunque chiamato altro Professore di Chirurgia, il quale non potendo consultare col suo antecessore, perchè già n'aveva abbandonata la cura, stimò bene di prescrivere delle fomentate fatte con lissivio di cenere di fermenti, e di ginefra.

In oltre per l'universale, ordinò (ma ciò coll'approvazione del Medico) una lunga decozione di Salsapariglia, la quale fu in parte eseguita; perchè, attesa una copiosa inaspettata deiezione intestinale insorta all'Infermo, fu costretto, dopo poco tempo a lasciarla; e così convenne fare all'indicate fomentate, che nulla concludevano.

Quindi ne avvenne, che egli procurò di intraprendere altre diligenti maniere di cura; ma ciò non ostante il ginocchio sempre più cresceva di dimensione, si aumentava il dolore, ed il malato sempre più costituivasi in peggiori circostanze.

Sembrandogli per tanto la malattia incurabile, diradò le sue visite, e ricercato, perchè così verso l'Infermo si comportasse, non ebbe difficoltà a rispondere, che egli non poteva fare di più di quello aveva fatto. La qual cosa pose in stato di congetturare, che egli per un tal caso non conoscesse i rimedi più sicuri ed efficaci.

In tali circostanze per tanto fu pensato dai Parenti dell'Ammalato di fare capricciosamente un unzione al ginocchio di vari oli: cosa che praticata fu mattina, e sera inutilmente pel corso

74
so d' un mese, nel qual tempo il ginocchio crebbe fino ad uguagliare la grandezza di un braccio ed un terzo, e più di sola cir conferenza.

Per la qual cosa non sapendo essi cosa fargli di più, attorniti allo spettacolo di tanto volume di Tumore, vollero chiamare un altro Cerusico, come uomo giusta la loro opinione di molta esperienza. Arrivato dunque il Chirurgo ascoltò in breve il racconto della malattia, e senza vederlo fisò di fare un cauterio nella gamba gonfia sotto il ginocchio malato, ed osservatolo indi così gonfio, e deforme, disse non essere bastevole il solo cauterio per lo sgravio di questa parte, ma piuttosto per allora applicare l' empiaastro di pane, latte, e malva, e sugna porcina per richiamare il Tumore ad una lodevole suppurazione. Fu così a norma della prescrizione, operato per quattro, o cinque giorni, e vedendo egli che nulla concludeva persuase i Parenti dell' Ammalato ritornare all' uso della pocanzi accennata unzione ed a proseguire in tutto, e per tutto colla medesima: ma che? Vedendo esso accresciuto di volume il ginocchio, coscia, e gamba con dolore insopportabile, ed agitazione massima dell' Infermo, non seppe cosa tentare di vantaggio a prò del medesimo; onde si licenziò dalla cura.

Intanto da quei della casa dell' infermo vennessi a nuova risoluzione di chiamare altri due Professori di Chirurgia per fare un consulto intorno ad una malattia di tal fatta, come successe. Questi, esaminata diligentemente la parte, dissero ai Parenti dell' Infermo, non esservi altro tentativo, che quello della mutilazione della coscia a cagione dei capi degli ossi, che concorrono a formare l' articolazione del ginocchio, supposti certamente cariati; per la qual cosa non essendovi altro mezzo, che questo; benchè da pensarvi seriamente a porlo in esecuzione, stante lo stato deplorabile in cui si trovava l' Infermo, il quale acconsentiva volentierissimo ad una tale operazione, senza però comprendere lo stato del suo corpo, per il quale era incerto l' esito di potere reggere ad una tanto grande operazione.

In questo intervallo di tempo, non sapendo l' afflitto Padre dell' Infermo a che cosa ricorrere di vantaggio, gli venne proposto un certo uomo, che trovavasi per la Città forestiero, di professione Chirurgo, per quanto egli asseriva; il quale vantava non esservi malattia, che fosse superiore ai foccorsi dell' arte, che ei non guarisse: ma in fatti l' esito non corrispose mai alle di lui jattanze.

Feccesi dunque senza indugio ricerca di lui; e arrivato che fu, esaminò con qualche sorte di impostura la malattia, e come

me colui che tutto diceva di guarire; ne prese subito sùbitamente l'impegno di perfettamente curarlo. Incominciò pertanto la cura nella seguente maniera.

Fece cibare il Febricitante, ed emaciato Infermo con zuppa di brodo di Piccioni, con arrosto, e con altre cose di molta sostanza, prescrivendogli ancora per bevanda vino di perfetta qualità: alla parte del ginocchio infermo prendeva acqua pura calda, e v'aspergeva poche gocce d'altra acqua di bianco colore, e molto spiritosa, che teneva egli appresso di se in una boccettina ben ferrata, la quale mescolata coll'altra acqua pura, mediante un poco di moto diveniva tutta di un colore di latte, e con questa bagnava delle pezze grandi, e così umide le applicava al ginocchio, gamba, e coscia.

Quando avea ciò fatto cuopriva tutta questa parte con panni caldi, facendogli mutare tre volte il giorno, e seguito questo metodo per alcuni giorni; e passati questi in vece di pezzette bagnate nella surriferita acqua, ne faceva immergere altre in acqua bianca più densa, e più piena della prima, e le poneva sopra all'accennate parti, e cuoprendole con i soliti panni caldi; della qual acqua dava talvolta una piccola dose per bevanla all'istesso ammalato.

Dopo avere praticato un tale descritto sistema, poneva l'Infermo in una tinozza a bagno caldo di manierachè il gonfio ginocchio restava fuori dell'acqua tutto scoperto, ed a questo faceva docciature per tre quarti d'ora per volta.

In questo tempo di cura pertanto, sotto al ginocchio, vale a dire nel poplite, si formò una grossa pustola infiammatoria distillante un'umore acquoso, ed in progresso sanguigno e fetente. Questa si dilatò così oltre, che nella sera del dì 10. Maggio 1766., nell'atto di dovere egli tenere la gamba alzata, di repente scoppiò nel luogo appunto della medesima, e sgorgò da essa in misura di tre fiaschi in circa di materia sierosa sanguigna nera, ed al segno maggiore puzzolente: perlochè si rese il ginocchio un poco meno tumido, e più trattabile, ma ciò non ostante proseguiva la solita cura accennata di sopra, e seguito con essa altri pochi giorni, nei quali osservarono tutti di casa gonfiarsi di più il ginocchio, coscia, gamba, e piede, ed il Malato vedevasi andare in maggiore declinazione di forze, e di spirito, pel continuo sgorgo del flusso copioso, che ne usciva così graveolente.

A vista di una tale cosa fissò egli di fare una apertura nel dorso del tumido, e edematoso piede per via, come disse egli, di certe mesture, affinchè uscissero con agevolezza maggiore da quello le materie suddette, mentre in tal guisa sarebbero

75
sgonfiati, il ginocchio, la coscia, e la gamba. Al nome di tali
misure parve ai Parenti dell' Ammalato, che una tale operazio-
ne potesse riuscire crudele, ed in fattigli risposero di non vole-
re permetterlo, trovandosi l' Infermo in circostanze critiche di
sua vita: ad una tale risposta questi sdegnato partì immediata-
mente da loro nè più si vidde, nè di lui s' ebbe ulteriore no-
tizia.

In questa orribile, e funesta situazione, non sapendo i do-
mestici dell' Infermo a qual partito appigliarsi, fu risoluto d' av-
visare anche me, affinchè io facessi una visita, non solo per
contentare l' Infermo, ma anche i Parenti del medesimo, che la
bramavano.

In vero ricusai subito, protestandomi non essere convene-
vole in conto alcuno, perchè sapeva, che v' erano intervenuti
varj e diversi abili Professori di Chirurgia, per i quali professò
tutta la stima, e rispetto, quant' ancora per essermi noto non
darsi più luogo a rimedio veruno, o ad alcuno plausibile ten-
tativo.

Fattemi per tanto nuove istanze, e premurose, per conten-
tare il moribondo Ammalato, m' indussi ad andarvi. Arrivato
appena, mi fu fatta in breve la storia della malattia, dopo la qua-
le passai a visitare il ginocchio infermo, e vedutolo di un volu-
me così grande, che misurato lo ritrovai esteso alla circonferen-
za d'un braccio, e due terzi di buona misura, con massima gon-
fiezza della coscia, gamba, e piede, con più un complesso
di vene molto varicose (come si vede alla Tav. II. Fig. III. se-
gnato A B C D E F.)

Dopo avere fatta coprire la mostruosa apertura con fila asciut-
te, volli essere più minutamente informato di tutta la malattia;
principiando dal giorno, in cui il surriferito Sig. Abate s' am-
malò, e dalla cura praticata dal varj Professori, quale ho sopra
descritta: il Paziente inoltre pregommi col maggiore spirito,
che la carità gli avessi fatta di assisterlo fino all' ultimo giorno
della sua vita; al che veramente risposi, che l' avrei fatto vo-
lentieri. Vi ritornai il giorno dopo, e lo ritrovai con scapi-
to di forze, e col solito copioso distillamento fetente, tram-
andato dalla prefata apertura; cagioni tutte del suo terribile spof-
samento, e languore, che minacciava una morte imminente.
In fatti dopo quattro giorni tutto in un tempo gli sopraggiun-
sero impetuose convulsioni all' esofago, che gli impedirono pren-
dere ulteriore cibo, e bevanda; e di queste finalmente rimase vit-
tima sfortunata, e pose termine al suo vivere il giorno 3. del
me

77
mese di Giugno 1765., dopo una malattia, che coraggiosamente
sofferse per un corso di mesi tredici.

*Sezione del Cadavere, e particolarmente del Ginocchio
fatta da me suddetto.*

Scoperto il Tumore segnato alla Tavola II. Figura III. B B Tagliato, e rovesciati gl' Integumenti, si osservarono questi della grossezza di un fusto di braccio, duri, e scirriti (vedi Tavola seconda Fig. IV. A A.). Così una porzione dei Muscoli della coscia, e della gamba si vidde alterata dall'infiammazione, e dall'ingrossamento (Vedi all' istessa Figura ccc e).

Internamente poi si ritrovò un amplo, e profondo ascesso, che comunicava con altri diversi, e minori; i quali s' internavano in tutta l' articolazione del ginocchio, ed insinuavano dentro alcuni interstizj dei muscoli della coscia, e della gamba fino alla metà della medesima.

Quindi osservammo in particolare in tutta la circonferenza interna dell' articolazione del ginocchio quasi tutti i ligamenti, e tendini di più, e diversi muscoli, che concorrono a tenere insieme unita detta articolazione, disfatti del tutto e putrefatti. Per un tale disfacimento si viddero staccati, e sciolti dalla sua rispettiva e reciproca articolazione i Condili del Femore dai capi della Tibia, e della Fibula alla distanza di un grosso dito traverso; onde sciolta affatto era rimasta la predetta articolazione del ginocchio (come si vede segnato d d).

Per tanto nei Condili del Femore, e nei capi della Tibia e della Fibula si osservarono distrutte le loro proprie cartilagini; alterata, e corrotta la propria loro sostanza con carie, che si estendeva ad una gran parte, principalmente del Femore, (Vedi la stessa Fig. e e e, f f f).

Così ingrossato oltremodo il capo della Tibia, e della Fibula si potè osservare con carie ed erosione notabile (Vedi segnato b b) e quindi la Rotula pendula, e natante nella putredine, e disfacimento del Ginocchio, che aveva un semplice, e tenue avanzo del suo attacco superiore (Vedi la medesima Figura segnata i i i i). Questa però con somma facilità si distaccò da tale unione, e s' osservò nell' anteriore sua parte convessa superficialmente sana, ma nell' interna era del tutto nera, e cariata.

Oltre di ciò si osservarono per il tratto della coscia molte vene varicose (segnate m m m), e senz' altro esame si terminò questa sezione.

DE,

DECIMA QUARTA OSSERVAZIONE

Sopra un Tumore molto voluminoso con alcune particolarità, chiamato Broncocele, nella Persona di Maria Rosa Menicaldi il dì 1. Agosto 1766. in Firenze.

Alla Maria Rosa Menicaldi in età d'anni, 56. d' abito di corpo pletorico nello stato coniugale, nacque inaspettatamente dopo, o poco dopo che ella ebbe dato alla luce un figlio maschio, un piccolissimo Tumore grosso quant' un'uovo di piccione nella parte anteriore del collo. Per questo accidente a dir vero, non apportandole veruno incomodo, motivo non ebbe di farne alcun caso.

Nel progresso però del tempo non potè dispensarsi da una qualche apprensione in rimirarlo così crescente, senza dolore: egli era molle al tatto, flessibile, e rilassato che rendeva la Donna alquanto deformata all' aspetto.

Questo Tumore era impiantato nella parte anteriore del collo (Vedi Tavola II. Figura V. A A.), che dai nostri antichi Scrittori viene comunemente chiamato Broncocele, vale a dire Ernia della Gola, e dai più volgari Bocio o Gozzo è detto: in fatti spiegasi con ciò il luogo della gola, in cui ha la sua vera sede, principalmente sopra alla Trachea, o Aspr' Arteria o Canale polmonale; come dai più accreditati e dotti Scrittori fu saggiamente significato, e da suo pari lo spiegò il celebre Gio. Doleo nel suo eruditissimo Trattato (a).

Un tale mostruoso rilassamento s' osserva spesso volte accadere ancora in molte femmine d' altre parti della nostra Italia

(a) *Bronchoceles sedes proxima sunt Membrana duplex Brouchy, sive Fistula pulmonalis, alias Tracheae, & Arteriae Asperae dihae, uti, & nervi eam comitantes: hi enim in magno conatu valde distenti intumescunt, & dilatantur, aliquando etiam convelluntur, & depofitionem gangliosa-*

mem uasciscuntur; sicque musculos, & cutem colli simul extendunt, & succi illabentes coagulati, & stagnantes basce partes in extumescencia detinent, & conservant. Io. Doleo. Cap. 11. P. 2. De Strumis & Bronchoceles.

lia; ma più frequentemente alle Donne della Carintia, e della Stiria, senza che esse considerazione alcuna facciano di questo divinato Tumore Broncoelico, il quale per essere molto rilassato, e flessibile, a bella posta se lo gettano or da una, ora dall'altra parte del collo con la massima facilità, e senza loro incomodo (b). Quello della nostra Maria Rosa tanto crebbe nel tempo succellivo, che arrivò a formare un corpo di voluminosa grandezza, che occupava nella sua circonferenza quasi tutta la parte anteriore, e laterale del collo, e della gola, la quale non più distingueasi; dimodochè fino dalla parte dell'umero destro vedeaasi esso non solamente riposare gravitante sul medesimo (Vedi la stessa Figura segnata B.B.), ma ancora nella parte anteriore del petto smoderatamente gonfio, e pendulo giù giù si posava (Vedi la Figura medesima c c c), quasi alla circonferenza d'un braccio e un terzo, e più (come si può osservare segnata d d d); lo che rendeva la prenominata Donna, come ognun può agevolmente immaginarsi, deformata del tutto d'aspetto.

Per la qual cosa s'osservava di tempo in tempo accadergli, per cagione della pesante mole del Tumore, molto affanno, con affaticata e corta respirazione, con tosse impetuosa particolarmente nei giorni d'aria molto caliginosa, ed umida; ne quali più che in altro tempo restava travagliata (c).

E per verità tutto quello che si è rappresentato fin qui non rende particolare la malattia, di cui si discorre; quantunque dai segni, o sintomi apparisca degna di qualche considerazione. In fatti alcune osservabili particolarità, che descriverò in appresso, arrecheranno senza dubbio al lettore alto stupore; poichè a tale proposito, il gran nostro Maestro Ippocrate, va così a meraviglia dicendo, *experientia est rerum Magistra* ec. E di ciò sia la verità, andò avanti la sofferente Donna col divinato esorbitante, e mostruoso Tumore per un corso d'alcuni anni ma arrivata finalmente che essa fu all'anno 1762., e cinquantesimo di sua età; eccola tutto in un tempo assalita da una copiosa emorragia di sangue tramandato dalla bocca, che in tale occasione ne perse la dose di libbre cinque, il quale con tosse impetuosa fuori da essa traboccò.

Ta.

(b) *Incolae quaedam, ut Carinthiae, & Styriae, omnes fere a Scrophulis vexantur.* Io. Doleo loc. cit. *non vero acido, nitroso repletus; proinde vitetur nebulosus, ac pluviosus.* Dol. loc. cit.

(c) *Aur ergo sit optimo aethere,*

Tale accidente seguivale dentro allo spazio d'ogni tre ; o quattro mesi, e chi bramasse di quest'effetto risapere la vera cagione , veggia il grande *Ippocrate* nei suoi *Aforismi* (d).

Seguitò per tanto un tale interrotto flusso sanguigno dall' anno 1762., all'anno 1766. del dì 4. Febbraio; nel qual tempo appunto la prefata Donna con preventivo, e triplicato trabocco di nuovo sangue in maggiore copia, solita tramandarsi dalla bocca, fu anche assalita da gagliardo insulto febbrile; per il che fece risolvere il di lei Medico curante a farle estrarre discreta dose di sangue dal piede, come negli tempi indietro avea l'istesso replicate volte usato simili rimedi e diligenze, ad oggetto di liberare l'Inferma da tale ripetuto insulto d'emorragia di sangue. Ma non ostante l'usate premure e cautele, non fu possibile che ella ne rimanesse mai libera del tutto; o se pure l'ottenneva, non compiva certamente il trimestre, che non fosse nuovamente di nuovo assalita dal consueto flusso di sangue, e da febbre, unitamente ad altri consecutivi accidenti in tutto e per tutto al di lei peggioramento cospiranti.

Ed in fatti in tali divise circostanze morbose andò perseverando l'inferma Donna fino al giorno sessantesimo; nel qual tempo divenuta era molto emaciata, e indebolita di forze senza potersi, nè rinvigorire, nè tampoco sostanzialmente nutrirsi; grande sebbene fosse stata la diligenza usata alla medesima ancora nella pluralità dei cibi al di lei palato più confacevoli, nutritivi e gustosi; che per altro non le somministravano molta nutrizione. In fatti divenuto finalmente il di lei corpo affatto o quasi affatto atrofico, ciò non ostante non le cessava di giorno in giorno il solito insulto affannoso, e la corta, e sibilosa respirazione. Ma di più riaffacciavasi di tanto in tanto la consueta, benchè più scarsa perdita di sangue dalla bocca, unita a copiose dejezioni intestinali di fluide materie di varj colori; le quali cose insieme unite ridotto avevano il corpo dell'inferma Donna in stato degno di somma ammirazione. Non men degno di stupore erasi reso ancora in questo tempo il pre nominato Tumore Broncoelico, che col suo accrescimento erasi fatto sulla superficie di esso un massimo notabile sfiancamento, e delle arterie carotidi e delle vene jugulari colle consecutive loro diramazioni, (come si vede segnato nella medesima Figura e e e); per l'esorbitante peso del quale, strappar sentivasi essa Donna, quasi

(d) *Mulier sanguinem vomitio- solutio contingit. H. pp. section. V.*
no rejiciens, menstrua cruentibus Aph. 32.

quasi tutti gl' integumenti, e muscoli del collo, e del capo: Questo corpo voluminoso di Tumore erasi reso curioso per la sua figura somigliante ad un ben grosso sfigurato, e irregolare cocomero nostrale, per il che fu costretta detta Donna a tenere una larga, e robusta fasciatura per sostenerlo (e); ma ciò non ostante passava l'Inferma infelicamente i giorni suoi, ora a sedere, ed ora giacente in letto: uno di questi, ardisco dire, non passava certamente senza soffrire un notabile travaglio affannoso, con impedita respirazione, con fatigata deglutizione; talmentechè erasi ridotta a cibarsi soltanto di cose tutte fluidi, e sottili; e benchè tali fossero nulla dimeno appena sorbite la stimolavano ad un principio di soffocazione con tosse impetuosa, proseguendo in simili divise circostanze morbose fino al mese di Agosto 1755; nel qual tempo appunto crebbero alla malata altri sintomi caratteristici di funeste conseguenze (f).

Ed in vero, dopo il corso delle suddette vicende ecco l'Inferma nuovamente assalita da improvviso insulto febbrile, con preventivo rigore di freddo universale, con dolore molto grave al capo, e con altrettanto dolore pungitivo nel sopraccennato Broncocele, sulla superficie di cui vedesi un principio d'infiammazione flemmonosa, la quale prendeva espansione con massimo dolore, con calore molto urente, con pulsazione, e durezza; per il che fu costretta l'Inferma Donna a passare molti giorni, e notti senza prendere, che scarissimo riposo. (g).

In tali vedute di nuova malattia infiammatoria fu localmente applicata alla parte la posca con frequenza ripetuta, senza il minimo profitto; infatti un tale corso infiammatorio volle ciò nonostante seguitare il suo intrapreso periodo, fino a tanto che non pervenne al punto di degenerare in suppurazione; per facilitare la quale passai all'applicazione dell'empiastro erbaceo varie volte ripetuto con massimo avanzamento alla suppurazione, e nel tempo stesso feci ai di lei Parenti un prognostico molto pericoloso della vita dell'Inferma, mentre riunivasi in essa una febbre molto gagliarda, con corto, e sibiloso respiro, con tosse

L

im-

(e) *Broncoceles*, est aliquando insignis magnitudinis, & deturpat saepe totum collum ab eo instar sacculi, aut pyræ, aut vesicæ inflatæ penitentie & undulati, atque fluctuatio humorum in ea nonnunquam percipitur. In. Dol. loc. cit.

(f) *Hinc Agri organa respira-*

tionis. & deglutitionis saepe ab onere premuntur; ut inde aliquando suffocatio timenda est. Dol. loc. cit.

(g) *Pars inflammata intumescit, cumque calore, sive ardore, dolore, duritie, rubore, pulsilus, atque puris continuis urgetur et.* Hoff. Cap. 11. C. 224. De Phlegmone.

impetuosa, mediante la quale pareva talvolta, che l' inferma rimanesse assolutamente soffogata (b).

Per la qual cosa fece finalmente la di sopra accennata suppurazione, e più che altrove si manifestò nella destra, ed esterna parte dell' indicato Broncocele; non volli però subito determinarmi a fare un taglio, temendo con ciò di non mi trovare nella cavità dell' aspra Arteria, ma volli aspettare, che la natura da per se stessa producesse una qualche apertura, per mezzo della quale potessi allora liberamente osservare dove mai profondava, lo che in breve tempo successe. In fatti s' osservò nell' indicata parte del Broncocele varie aperture al numero di quattro grandi, e piccole (Vedi l' istessa Figura f f f), dalle quali tramandari vedevansi in molta quantità umori in parte purulenti sanguigni, sierosi, ed in parte simili al miele sciolto, i quali seguitarono a gemere in abbondanza per lo spazio di sei in sette giorni, nei quali, stante una copiosa deiezione intestinale inaspettatamente insorta all' Inferma, in parte cessarono.

Nelle descritte aperture introdussi lo specillo, ed osservai, particolarmente in una di quelle ch'era per la parte inferiore del Broncocele, profundarsi dentro alla distanza di buone cinque dita trasverse, e comprimendo essa tenta sentivasi nel fondo toccare un corpo in parte carnoso, ed in parte duro, lo che parimente praticai per la parte superiore del medesimo, ma qui più che altrove comprimendo detta tenta riscontravasi l' istesso, e l' Inferma in tal' atto sentivasi soffogare con alquanto dolore, che non permetteva tentare più oltre (i).

Il sistema Chirurgico praticato nella divisata malattia fu il più semplice, che usare mai potessi; poichè altro non praticava sul-

(b) Broncocele a cuius compressione Asperae Arteriae illatae, saepe suffocatio oboritur. Dol. loc. cit.

Theod. Kerking. obs Anat. 74. qui observavit a Broncocele subito inerescente, & Asperam Arteriam colli vertebrae adprimente manulem quandam suffocatam, quod & de Puella Tulp. lib. primo observ. 46. animadvertit. Platerus a Broncocele interne circa jugulum abscondita suffocationem observavit. Apud Dol. loc. cit.

(i) Broncoceletem Graeci proprio ab interiore parte inventa nemine

appellans, in quo, modo caro habens, modo humor aliquis mellis, adipi, pulsi, aequae similis includitur. Interdum etiam, ut ait Celsus. in eiusmodi tempore pili minutis offibus immixti reperiuntur. Celsus apud Io. Targui. Cap. XIII. Inst. Chirurg. lib. I. pagin. 86.

Reperita est aliquando massa cornea dura pungi magnitudine cum officulis pluribus, ut apparet ex observ. Clariss. de Muralto obs. 134. Ephem. Germ. Decur. tertia; vel ut a Foresto pediculi vivi observatum. Apud Io. Dol. loc. cit.

sulle descritte piaghe , che sottilissime fila asciutte , sopra alle quali faceva posare una larga faldella d'altre fila stesi sopra porzione di unguento rosato , e ciò per mitigare in parte il gran dolore , di cui l' Inferma molto si lamentava ; lo che proseguì fino al di sette del mese di Settembre 1766. , nel periodo del qual tempo , non soggiunse alla medesima veruna altra morbosa mutazione .

La notte però dell'ottavo giorno del suddetto mese ebbi ad un tempo sorpresa la malata da un insulto impetuoso di febbre con inesplicabile affanno , con corta respirazione , con copiosi sudori freddi universali , con massima agitazione , e travaglio di tutto il di lei corpo , consistente in vomito , ed eruttazioni frequenti , con polsi assai stirati , e gonfi , con dolore , e calore molto urente per tutto il Tumore Broncocelelico , e specialmente per tutte le di sopra accennate aperture ; le quali cose indicavano funeste conseguenze (l). Laonde in tali divise circostanze morbose fu subito dal di lei curante Medico risoluto di fare una discreta emissione di sangue dal braccio in dose di once otto , il quale appena estratto si separò in abbondante fioco , e con superficie molto crostosa , e con ciò l' Inferma in questa istessa notte rimase bastantemente quieta (m).

La mattina veggente , fu ritrovata la Malata con minore febbre , lamentandosi molto di dolore nell'inferma parte , e scoperta , ritrovai nella circonferenza delle prenominate aperture una superficie in parte livida , e secca , costituendo quel grado di malattia , che col vocabolo nostro gangrena addimandasi (n) , ed osservai tramandare di nuovo dalle prefate aperture in abbondanza materie sottili marciose , le quali seguirono a gemere per un corso di giorni otto ; ed allora veddesi naturalmente staccarsi dalle parti adiacenti quell'escara , o cuoio gangrenoso , e s' osservarono tutte le indicate aperture ridotte ad una sola molto ampia , e profonda , inuguale , e dolente .

Ancor qui non fu differente da quel di sopra l' intrapreso

L 2

fiste-

(l) In inflammationibus gravioribus praesagium sponsum singultus, & ructus continui sudores frigidi, mentis diffusions delirium, diuturna denique vigilia. Heist. Cap. XIV. C. 520. De Gangrena, & Spha.

(m) Prae omnibus ergo sanguinis, & robustis sanguis largiter

mittendus, eiusque distractio, ubi opus esse judicatur repetenda ec. Heist. loco citat.

(n) Inflammatio vehemens cum adiunctis malis reliquis subito ut plurimum vehementer mutatur, rubor in colorem pallidum lividum liventemque convertitur ec. Heist. loc. loc.

sistema curativo, consistente in una semplice diluente lavanda d'acqua pura calda, e di sottilissime fila asciutte, aspettando il beneficio della natura perchè riempisse di buona carne quella piaga, acciò potesse seguire una stabile cicatrice; che si formò poi dopo un corso di giorni 24.; nei quali la surriferita donna restò perfettamente guarita.

R I F L E S S I O N E.

Molte in vero sono state le maniere, ed i metodi praticati nei trapassati tempi di curare il Broncocele dai più eccellenti Professori, come si può vedere nel *Zod. Gall. Osserv. II.* ed all' *Osserv. 9.* pag. 1295., come pure nelle *Decur. Ephed. Germ. Ann. 3.* *Osserv. 134.* Il Celebre Medico Francese Niccolò Blegny riferisce d' avere osservato un Broncocele, quale casualmente s'aperse, si ripurgò perfettamente senza l' aiuto, nè di medicament, nè di ferri, nè d' altra operazione Chirurgica, ma col solo beneficio della natura e del tempo; dal che certamente rilevasi, e sempre più comprovasi l' avvertenza di non essere tanto solleciti nella maggior parte delle cure Chirurgiche di ricorrere al ferro, come generalmente si pratica anco dai più accreditati Professori, più premurosi della loro gloria, e del loro interesse, che del reale vantaggio dei miseri pazienti.



DE-

DECIMAQUINTA OSSERVAZIONE

Sopra le particolarità, ed accidenti seguiti nel corso di una malattia infiammatoria acuta nella persona della Maria Maddalena Pampaloni fuori della Porta al Prato, nel luogo chiamato comunemente le Carra il dì 6. Giugno 1767.

Maria Maddalena di Pietro Pampaloni d'anni 18., di temperamento di corpo pletorico s' infermò per cagione di febbre, la quale immantinente, o quasi subito si manifestò del carattere delle febbri acute putride; mentre nel secondo parossismo comparvero sull' esterna superficie del corpo dell' Inferma minutissimi, e copiosissimi esantemi, chi di colore rubicondo e rosaceo, chi nero, chi lividastro, i quali furono visibili fino al giorno decimoquinto dal principio del male. (a)

Nel progresso furono praticate in diverso tempo quattro emisioni di sangue, e dai bracci, e dai piedi dell' Inferma, il quale fu sempre ritrovato di ottima qualità, un poco acccso, ma abbondante di umido, ed al taglio anche facilissimo. Le furono prescritte varie bevande solite ordinarfi in simili malattie, le quali molto volentieri forbiva, necessitata dall' a veemente arsione, che ella provava, per cui rimaneale spesso in te la lingua asciutta, arida, ed aspra. (b) Furono usati in diveri tempi varj clisteri semplici emoglienti, mediante le sciolte, e setenti deiezioni del corpo mescolate con varj vermini grossi, e piccoli, contati fino al numero di trenta per volta, che in tutto passarono il numero di settantacinque, e per la tensione timpanitica nata nel basso ventre

pra-

(a) *Pustulae in principio morborum acutorum toto corpore, aut nonnullis partibus apparentes periculosae.* Hipp. in Coac. apud Riverium Inst. Medic. lib. III. Sect. III. Cap. II. pag. 293 De signis morb. salut. & leth.

Pustulae pariter admodum rubentes,

vel praecipue liventes, aut nigricantes exitiosae. Apud Riverium loc. cit.

(b) *Sitis invalescente morbo cum linguae fecitate inextinguibilis &c.* Apud Allen in Synop. Art. 83 pag. 20. V. Febris petechialis.

praticate furono spesse, e replicate fomite, lo che molto contribuirono alla malattia.

Non ostante però l'usate diligenze crebbe la malattia, e fece un corso molto impetuoso, solito ad avvenire nelle epidemiche Infermità, che furono in questo tempo sparso fuori, e dentro della nostra Città di Firenze con perdita notabile di non poche persone. E per dir vero dall'accrecimento dei varj sintomi, dei quali trionfava detta malattia, poco mancò che l'Inferma non restasse più volte preda di morte, come si potrà ravvisare nel proseguimento dell'Osservazione. Per la qual cosa s'osservò poco dopo il periodo di giorni quindici sparire affatto le di sopra accennate petecchie, e dopo altri tre consecutivi giorni, e decimo ottavo dal principio del male, si notarono di più per tutta la superficie del di lei corpo minutissimi corpuscoli scabrosi simili al miglio, quali nel corso di ore ventiquattro viepiù ampli rendevansi sull'esterna superficie cutanea, dei quali tosto si formarono varie pustole molto larghe, e grosse di flavo colore, senza la minima infiammazione, le quali ripiene comparvero di una materia purulenta solida, e concotta: queste s'aprivano di lor natura, e tramandata che avevano fuori dal corpo detta materia marciosa, seccavansi in breve spazio di tempo.

Un tale alternativo corso di purulenta suppurazione, durò altri quattro giorni consecutivi; ma appena compiti, ed entrato il giorno vigesimo secondo dal mal nascente, comparvero in diversi luoghi del corpo infermo vari tumori, o ascessi suppurati, senza il preventivo segno d'infiammazione piccoli, e grandi, senza apportarle il minimo dolore; (c) lamentandosi soltanto di questo nelle congiunture, o articolazioni tutte del di lei corpo. (d)

Questi ascessi frattanto comparvero alcuni nelle braccia, altri nel petto, chi nelle gambe, e cosce; uno però di maggior mole formossi nella parte esterna laterale del naso, con averlo reso del tutto sfigurato, e gonfio. Tutti questi però aprivansi da se stessi, e dopo aver tramandato in appresso abbondevole purulenta materia, brevemente seccavansi; lo che seguì in altri tre giorni consecutivi, e vigesimo quinto dal principio del male.

Alla veduta di tali sgravi pareva che questo corpo dovesse esse-

(c) *Quicumque abscessus post signa concotionis apparent, & secundum vestitudinem partis affectae, & in loco ab illa valde remoto, & declivi, & capaci non valde exquisito sensu donato, & qui citissime ad suppuratio-*

nem perveniunt, salutares &c. Apud Riv. loc. cit.

(d) *Quos fibres longae exercent iis tubercula, vel dolores in articulis sunt. Hipp. Aph. 44. Sect. IV.*

effere oramai a sufficienza sgravato; ma non terminò quel certamente il divisato ripurgamento: e vaglia il vero, comparvero ad un tratto turgide assai le glandule summafillari al tatto ondegianti, per il che feci un taglio, donde scaturì abbondantemente materia marciosa molto solida, e si chiuse in breve la formata apertura (c): s' osservarono inoltre tumide le glandule parotidali, le quali sgonfiarono, dopo avere tramandato dal meato uditório sinistro gran quantità di materia marciosa molto fetente, che durò a fluire pel corso di giorni sette, i quali giunsero al trentesimo secondo dal principio del male, senza apportare all' Inferma incomodo alcuno. (f) Finalmente dal fin quel divisato periodo di tal complicata malattia erasi reso il corpo dell' inferma molto emaciato, e confunto; ma ciò non ostante, la rimanente forza, il giovenile spirito della medesima, ed il robusto temperamento contribuì senza dubbio a farle resistere eziandio agli insulti di conseguenza maggiore.

Ed in vero terminato il giro di giorni trenta sette, da che ella s' infermò, comparvero di lì a non molto nelle parti inguinali due tumori di figura ovale, del color della parte, al diametro di un uovo gallinaceo al tatto ondegianti, per lo che feci un taglio sopra essi, ed uscirono in copia le solite materie marciose: la cura di questi fu talmente spedita, che dopo il periodo di altri otto consecutivi giorni, e quarantacinque dal principio del male naturalmente si chiusero.

Inoltre fu l' Inferma attaccata da più e diverse gangrene fattesi pel decubito nel tempo progressivo della maligna malattia, (g) le quali vedevansi sparfe in varj luoghi del corpo, vale a dire, piccole gangrene di figura irregolare, larghe quanto una moneta di un paolo, di nera e secca superficie: erano appunto quelle situate nelle natiche, e per il dorso; grandi poi, e molto estese erano le altre collocate in ambidue i fianchi; e specialmente quella che formata si era sull' osso sacro; le quali mi portavano sempre più a fare un pronostico pericoloso intorno alla salvezza di quest' Inferma.

Queste gangrene pertanto colla pazienza, col tempo, e colla massima semplicità di metodo curativo s' osservarono adagio adagio

(c) *Febricitantibus laxitudinem habentibus in articulis, & circa maxillas posissimum abscessus fiunt.* Hipp. Aph. 31. Sect. IV.

(f) *Paratides, quas magnitudine moderatas sine dolore integris viribus in aliquo die critico, & antegressis conditionibus signis erumpunt bonas Hipp.*

loc. cit.

(g) *Malignitas aliquando est tanta, ut partes, nunc externas, nunc internas spaciolo, ac gangraena corruptas, absolvere liceat.* Apud Allen in Synop. Art. 74. pag. 18. Rct. mul. senten. V. Febris malignae.

gio staccarsi dalle parti sottoposte sane, per mezzo di tale separazione, dove lasciare una piaga semplicemente profonda, ed oltre alla profondità, ed estensione, la scuopertura totale ancora delle ossa sottoposte; come segul appunto da ambe le parti dei fianchi, dove vedevasi scuoperta una gran parte dei gran tracantieri delle ossa dei femori, e di quelle dell'osso sacro. Queste a dir vero, rimasero più della metà scuoperte, d'onde nel tempo progressivo della cura fui necessitato ad estrarre una buona porzione d'ossa grandi, e piccole, le quali naturalmente staccavansi, di dove osservai ancora coll' aiuto del microscopio nel tempo delle copiose marce, che tramandavansi da esse gangrenose piaghe piccolissimi e minutissimi, e quasi impercettibili insetti, o varj vermicuoli natanti in esse materie marciose. (b)

La cura Chirurgica pertanto da me tenuta sopra alle gangrene fu la più semplice, che usar mai potessi, consistente in varie docciature praticate, e ripetute mattina e sera di semplice acqua, nella quale eravi bollita una porzione sottilmente polverizzata della scorza del Perù esattamente colata; colla quale decozione non so mai dire quanto esse piaghe profittassero, sì per lo spogliamento totale delle parti gangrenate, sì ancora per l'accrescimento di nuova carne, che ogni dì più fabbricavasi nelle medesime; sopra alle quali poneva finissime fila immerse nell' indicata decozione, seguitando fino al totale riempimento delle medesime.

La cura interna poi, quale feci praticare all' Inferma, consisteva nell' avere assegnato alla medesima mattina e sera libbre una di siero depurato, da prendersi per lungo tempo, il quale conferì tanto all' istessa, che lo volle anche seguitare di più dell' ordine prescritto: e siccome ad essa persisteva tuttora un residuo di febbre leggiera diurna, la quale sopraggiungeva con qualche precedente tocco di freddo, credetti espediente ordinarle alcuni boli fatti di china china da prendersi mattina e sera; e questi al certo conferirono all' indisposta femmina, che alla per fine rimase in breve libera dalla febbre.

Ridotte finalmente col progresso del tempo le prefate ulcere a piaghe semplici, di piana superficie, per cicatrizzarle ebbi luogo di servirmi dell' unguento bianco steso in pochissima quantità sopra

(b) Nonnulli asserunt ex observationibus microscopicis in omnibus febribus malignis, & ulceribus gangrenosis, talem adesse putredinem sanguinis, ut exinde copiosissimi generentur vermiculi; qui ubique, scaturientes, &

corpus lancinantes tam varia inducunt symptomata necesse est: sed hi vermes, non nisi putredine praecedente generari possunt. Apud Allen in Synop. luc. cit.

sopra una faldelletta di pure fila, e talvolta ancora praticar mi convenne l'uso della pietra infernale a cagione d'aggiunta di carne superflua, al di cui immediato contatto digerita disparve.

In virtù adunque di tal divisato sistema, usato di tempo in tempo sopra le medesime, mi condussi finalmente una volta a vederle qual prima, e qual dopo tutte stabilmente cicatrizzate; onde nel corso di mesi tre, rimase l'Inferma Ragazza perfettamente guarita.

RIFLESSIONE.

Non può abbastanza spiegarsi quanto sia stato profittevole l'uso della China in questa descritta malattia, ed in altre e tante di simile carattere praticata costantemente con maravigliose guarigioni.

Il primo a tentare l'uso della china china nelle gangrene, e negli sfaceli, fu l'Inglese Rushwoth celebre Chirurgo di Northampton circa a quaranta anni, e poscia ripetuto con vantaggio l'anno seguente dal Amyand, come può vedersi Trans. Philosoph. 2426. pag. 429. 434. Albridgement Tom. VIII. pag. 643. al 652.



DECIMASESTA OSSERVAZIONE

Sopra una frattura farinacea colla scuopertura dell' Ossa rotte in più pezzi una porzione di queste uscivano fuori dalla larga ferita finata nella gamba destra di Carlo di Giuseppe Maiolfi seguita il dì 8. Novembre 1767. in Firenze.

A Di 8. suddetto Carlo di Giuseppe Maiolfi in età d'anni 17. d'abito di corpo pletorico volle salire sopra un muro alto braccia dieci, che situato era nel confine del Fognone chiamato di Ripoli, che in quel tempo esisteva aperto, sull'estremità del quale posava malamente una voluminosa pietra lunga braccia cinque, e larga braccia uno in circa, in parte scomossa dai Manifattori, che muravano in detto luogo affine di cuoprire, come è di presente, il furriferito Fognone.

Questo disgraziato Giovine volendo salire sul mentovato muro, senza fare riflessione alcuna (cosa molto connaturale alla giovanile età, che per lo più di criterio, e di esperienza è priva) abbrancò la detta Pietra, la quale immediatamente dalla sua mala situazione uscita, cadde precipitosamente con il Giovine nel furriferito sottoposto Fognone. Quanto orrore ai circostanti arrecasse una tal caduta, ed il vedere la detta pietra posata sopra la gamba di detto Carlo, il giudizio ne lascio al lettore. La caduta della divisata pietra sulla gamba del Giovine avea fatta una gran ferita, con molta lacerazione, e contusione unita alla frattura farinacea dell'ossa componenti detta gamba con la totale scuopertura delle medesime (vedi Tavola III. Figura I. A A).

Questa ferita era lunga sette dita trasverse, e larga cinque, di figura irregolare, (come si vede all'istessa Figura segnata b b) nella quale vedevansi scoperti tutti i pezzi dell'ossa fratti, una gran porzione delle quali scappavano fuori da quest'istessa ferita (Vedi la Figura medesima c c), con avere prodotto in parte lo strappamento delle parti muscolari, nervose, e tendinose unitamente ai vasi arteriosi, e venosi, per il che s'aperse la strada ad una copiosa emorragia di sangue.

L'in-

L'indicata gran ferita, era situata per la parte quasi anteriore interna della destra gamba sopra appunto al malleolo interno due dita traverse, (come si vede segnato all' istessa Figura D), dove nacque subito all' Infermo la pocanzi accennata emorragia di sangue, ed un indicibile spasmodico dolore unito ad una notabile rigidità, e tumefazione di tutta la gamba, e piede (a).

Fu pertanto soccorso detto Carlo, ed alla meglio che fu possibile diverse Persone, che accorsero al caso lo tirarono su dal profondo Fognone, e lo trasportarono in sua casa poco lungi dal medesimo, e lo posero in letto. In questo tempo fui speditamente avvisato acciò lo visitassi, come feci; Ritrovai sul fatto la divisata malattia fratturacea, quale ho descritta; e veggendola tale, avanzai ai di lui Parenti un pronostico molto pericoloso della vita dell' Infermo, o che al più quand' anche avesse avuta la sorte della guarigione, non poteva non ostante andare esente dallo scorpio (b), e nell' istesso tempo proposi ai medesimi, secondo l' indicazione curativa, la mutilazione della parte, per tentare una strada di mezzo; affini di salvare la vita all' Infermo.

Nè debbesi omettere su tal proposito, che la pluralità dei casi di simile carattere c' hanno fatto chiaramente vedere essere piuttosto sopravvissuti coloro, ai quali è succeduta simile disgrazia per mezzo della pronta amputazione, di quel che sieno guariti quelli, che s' ostinarono di non praticare tentativo di questa sorte, il quale benchè per se stesso sia pieno di pericolo, non lo è però tanto, quanto lo è quello di lasciare in braccio alla natura tali malati, i quali si conducono poi finalmente coll' andare del tempo alla morte (c). Pure non ostante non

M. 2

vol-

(a) Interdum fragmenta emiacina adiacentes partes molles, carnem, membranam, arterias, & venas, nervos premeudo, irritando, lacerando, faciunt dolores, stupores, convulsiones, ariditatem, corruptionem, sphacelam, & multa alia mala ec. lo. De Gott. Lib. II. Cap. III. pag. 47. De Fractura Oss.

(b) Quo fractura plura fecit fragmenta, eo difficilior ec. lo. De Gott. loc. citat.

Quod si forte in plura fragmenta diffusa Os fuit, Inflammationis

signa ut plurimum insequuntur ec. Heist. Chirurg. P. I. lib. II. Cap. I. C. 173. Par. XV. De Oss. Fract. univer. spect.

(c) Si ossum fragmenta, ipsam carnem, atque cutem perumpant, tantum pluraque abest, at in sedibus suis pristinis repoi, propter musculos, nervos, venas, atque Arterias interjacentes queant, ut potius gravissima in la super venientia felicem curationem impediant, ipsumque proinde Membrum amputandum sit. Heist. loc. cit.

vollero in conto alcuno i di lui Parenti acconsentire alle mie proposizioni; pregandomi d' usare ogni diligenza, e qualunque altro mezzo fuori che quello dell' amputazione della gamba. Inerendo adunque al desiderio dei Parenti dell' Infermo, usai ogni diligenza, ed attenzione in lavare con vino caldo detta ferita, e riporre alla meglio, che mi fu possibile tutti quei pezzi d' ossa rotti riattandogli l' uno con l' altro dentro alla ferita medesima, quale medicai con semplicissime fila, e piumaccioni, e la fasciai adoprando quella fasciatura a 18. capi delineata dal celebre Lorenzo Eistero (d); inoltre situai la gamba dentro ad un canale artefatto di panno, col quale assicurai la medesima, e l' Ammalato stesso lasciandolo in tal maniera alquanto quieto, per rivederlo la sera veniente, e medicarlo nella guisa appunto che consumasi in simili malattie fratture e complicate, qual fu certamente questa dell' infelice Carlo (e).

Dopo finalmente una tale operazione stimai bene passare ad una discreta emissione di sangue dal braccio, in dose d' once sei, il quale fu ritrovato d' ottima qualità, e ciò fatto, lasciai il mio malato per rivederlo, come io dissi la sera, nella quale intervenni intorno le ore undici secondo l' Orivolo Oltramontano: in fatti lo ritrovai con febbre molto ardita, con dolore, e stirature quasi insoffribili alla parte infera, con qualche leggiero tocco di convulsione; visitata la gamba, non stimai bene toccarla; ma piuttosto parlare con caldezza al medesimo, persuadendolo ad avere pazienza, e procacciarsi la quiete, e che i di lui assistenti destinati nell' imminente notte, osservassero esattamente all' esterno delle fasce se compariva macchia alcuna di sangue, e seguendo, fossero prontamente solleciti ad avvisarmi.

Nell' inoltrata notte pertanto fu l' Infermo assalito da impetuose convulsioni (f), dal qual tremulo moto convulsivo di tutto il di lui corpo, venne a scuotersi talmente la gamba fratturata, onde le punte degl' ossi rotti ferirono, e lacerarono novamente le patti nervose, e muscolari, vene, arterie, e s' aprì la

(d) Heist, explicatio Tabulae IX. Fig. 4. B.

(e) Si fractura complicatur cum vulnere, valida contusione, vel spualo solito medicamento bis morbis apta adhibenda sunt; sed mutanda est de ligatio: nam omni die innovanda est deligatio, & fasciae applicandae, quae vocantur ligaturam

biblicam seu fasciam multarum capitum, ut pars deligari possit sine partis motu, vel elevatione. lo. De Gurt. loc. cit.

(f) Convulsio in vulnere lethalis est. Hipp. Aph. a. se&. V.

Qua fractura pluribus stipata symptomatibus, eo periculosa est. lo. De Gurt. loc. cit.

la strada ad una copiosa emorragia di sangue, che da se poi naturalmente cessò con avere lasciato l'infelice infermo quasi esangue, impallidito, e talmente languido, che appena erale rimasto polso (g).

Però veruno degli assistenti s'era fin d'allora accorto di tale divisato accidente, e spaventati, in veggendo affaltato l'Infermo dalle dette convulsioni, non si ricordarono altrimenti di quello che l'istessa sera aveagli premurosamente raccomandato.

Per tanto giunta la mattina del dì 9. del suddetto mese andai di buon'ora a visitare il mio malato; Or qui non so spiegare abbastanza, quanto fosse il dispiacere mio, nel vedere il disgraziato giovine impallidito involto, prostrato di forza, con poca voce, e mancante di polso. A vista così orribile, visitai subito la gamba e la ritrovai immersa in una copiosa quantità di sangue, il quale dall'estremità del canale in cui risiedeva la medesima, vedea si tutta via scorrere lentamente come piccolissimo ruscelletto, cosa che mi fece prontamente risolvere allacciare superiormente la coscia (h).

Con ugual prontezza, feci immantinente ristorare l'illanguidito e mancante spirito dell'Infermo, quando con porzione di brodo, e cordiale, sorbito il quale gli si risvegliò tantosto il vomito, il quale però essendo in breve cessato, rimai bene fargli prendere una discreta porzione di vino moscado immersa in esso poca quantità di pastina, dimostrandomi molto piacere in mangiarla, tal mezzo tanto giovò, per fare ritornare bel bello all'Infermo sufficiente vigore, e spirito da potersene contentare.

Cessata finalmente la predetta emorragia di sangue, e ritornato l'Infermo nel primiero vigore, e spirito non lamentavasi dell'ulteriore dolore alla gamba inferma, nè d'altri incomodi fino d'allora sofferti; laonde qualora altri nuovi sopraggiunti non fossero, dissi loro, che prima che passati non fossero cinque, o sei giorni non mi farei certamente determinato sfasciare la gamba. Pertanto andando così felicemente avanti
lq.

(g) *At vero quoties per Ossium diffractorum, festucas. vel cuspides, nervi quidem vexantur, vel compunguntur, dolores, ut plurimum, vehementes convulsiones una cum Febris suboritur, simulque adfit sanguinis profusus, & ipsa mors insequitur.* Heist. loc. cit.

(h) *Si qua gravior sanguinis profusus fracturis adiuncta est, ipsum per compressionem, aequè aliqua instrumenta torquente diligenter cohiberi.* Heist. Chirg. P. I. Lib. II. Cap. II. Tom. XI. C. 186. De Fract. Symptom.

94
Le cose fino al giorno sesto, ed allora mi determinai sfasciare la gamba (l).

Sfasciata questa, e tolto via del tutto il primo apparato a forza di varie, e ripetute docciature di pura acqua, essendo questo risecco, e fortemente attaccato alle sottoposte parti, osservai la gamba del tutto turgida di un colore lividastro lustrante, ed in parte nero. La gran piaga era molto tumida, infiammata, e discretamente dolente, ove vedevansi scoperte del tutto le ossa fratte in più pezzi, con avere essa incominciato il corso della suppurazione (m).

Per la qual cosa il metodo sistematico, che praticai nella divisa malattia complicata, fu la sola applicazione di frequenti, e ripetute fomentate di semplice acqua mescolatavi dentro porzione di aceto fatte sopra a tutta l'estensione dell'infiammata, e tumida gamba, e piede; e fu il mezzo questo, per cui s'abolirono del tutto le pocanzi descritte apparenze morbose, dentro al termine di giorni 25. (n). Non meno diligenza fu da me praticata nel medicare la gran piaga colla veduta delle ossa rotte, sopra alle quali ponevo finissime fila asciutte, qual sistema indefessamente praticato con profitto massimo, fu seguito fino a tanto che ricuoperte non viddi dette ossa da nuova carne con avere lasciato in braccio del tempo, e della natura la consolidazione delle medesime (o).

Nel mezzo a questa cura che giornalmente praticava, fui necessitato estrarre in più volte varie schegge, o pezzetti ossei, che mi si presentavano dal fondo della divisa suppurante piaga (p); la quale si ridusse finalmente nel periodo di giorni 36. dal principio del male così semplice, che promise sollecita cicatrice. In fatti prontamente si cicatrizzò; e dopo un corso di mesi

(l) Nam ubi primam deligationem satis firmam eff., nihilque mali supervenisse, animadvertitur, ea vix ante quintum, vel octavum diem solvitur Heist. loc. cit.

(m) Omnis caro lacera & contusa necesse est putrescere, Hipp. de vuln. t. 2. §

(n) Lenius autem inflammationes eadem prorsus ratione debent, qua digerendas esse contusiones fomentis resolventibus, calido saepius applicat, donec malum omne sublatum fuerit. Heist. loc. cit.

(o) Equid in Chirurgus in curandis Ossium fracturis. satis suum officium fecisse censendus est, si ubi diligenter eadem reponere, fragmentorum enim repositionem ipsa natura perficit, dum callum aliquem fracturae inducit. Heist. De Traet. Sympt. loc. cit.

(p) Interdum frassula ossium dum sub curatione per suppuracionem soluta se ostendunt, quae simul ac deprehenduntur eximenda ec H. ist. C. X. P. 1. C. 214. De Crur. ac Ped. Oss. fract.

mesi due, e giorni 14. il surriferito Carlo Maioli restò perfettamente guarito. ⁹⁵

R I F L E S S I O N E.

Da questa Osservazione si rileva l' importante cautela di non essere così solleciti a porre in uso la mutilazione delle membra del corpo, mentre non lascia di essere essa piena di pericolo; ma indugiare più che sia possibile, perchè il beneficio del tempo, della pazienza, e della massima diligenza in curare simili malattie, ha fatto osservare, che quei malati sono finalmente guariti e vissuti senza la tanto rischiosa operazione della amputazione.

Negli atti di Coppenaghen per l' anno 1674. leggesi una Osservazione di Tommaso Bartolini di una Tibia rigenerata tutta intiera; siccome simili Osservazioni trovansi nei Saggi d' Edimburgo Tom. I. Art. 23., e Tom. V. Art. 41.



DE.

DECIMASETTIMA OSSERVAZIONE

*Sopra un Tumore scirroso molto ampio situato nell' ascella
destra nella persona di Giuseppe Lippi il dì primo
Maggio 1768. in Firenze.*

IL dì primo Maggio 1768. fui chiamato per visitare Giuseppe Lippi d'età di anni 56. di temperamento melancolico, il quale lamentavasi di un incomodo doloroso, che ei provava nell' ascella destra, nella quale dissemi, che per lo spazio d'anni cinque già compiti, sofferse una leggiera infiammazione, che durolle circa giorni otto, abolita che fu, gli restò nella divisata parte assillare un tumoretto duro circoscritto indolente, al diametro di una grossa noceiola nostrale, di figura rotonda, senza apportarle incomodo, nè dolore alcuno; (a) andava però osservando da se stesso col tatto di tempo in tempo, e d'anno in anno un notabile accrescimento del medesimo.

Arrivato adunque che fu al termine del quinto anno, da che nacque al prefato Giuseppe la disopra accennata infiammazione, ed osservando egli esattamente, oltre l'accrescimento del medesimo tumore, sopraggiungergli di più la difficoltà di muovere il braccio destro; per la qual cosa fu costretto a farsi prontamente visitare: riscontraì nella destra ascella un voluminoso tumore duro immobile indolente del colore della parte, di figura quasi sferica di circonferenza intorno a cinque dita trasverse, il quale oltre ad occupare quasi tutto il concavo dell' ascella, portavasi di più quasi in linea trasversale un poco obliqua ad interessare ancora gran porzione della mammella destra; costituendo quel grado di ma-

lat-

(a) *Interdum sine praevia inflammatione scirrbus oritur, praesertim in istiusmodi hominibus, qui crassiori vel glutiniori melancolicum, vul-*

go dicunt sanguine sunt instructi. Heist. Aerg. P. I. L. IV. Cap. XVI. C. 333. de Scirrho.

lattia, che col vocabolo nostro Scirro addimandasi. (b)⁹⁷

Per la qual cosa ansioso egli di sapere la natura, e l'esito d'una tale divisa malattia, volli veramente adempiere al suo desiderio, ponendogli in chiara veduta il carattere della medesima, e quello ancora che per conseguenza di essa sarebbe coll'andare del tempo sopraggiunto, senza dubbio peggiore del presente; mentre l'esperienza di tal genere di malattia scirrofa, c'ha fatto vedere il più delle volte degenerare alla fine in quel grado di male, che col vocabolo chirurgico Carcinoma appellasi, ed in altro comunemente il Cancro; il quale prima della sua perfetta formazione, sarebbe stato accompagnato da dolore pungente tal volta passeggero, e talora costante, con esulcerazione della parte, e con altri consecutivi accidenti, e fenomeni che nati sarebbero nella base del tumore, e nelle vicinanze ancora del medesimo, relativi all'imminente descritto male. (c)

Il regolamento pertanto ricercatomi da dovermi da esso praticare nella scirrofa malattia, fu prima l'incoraggiare il medesimo, animandolo ad usare cose tutte le più semplici, per non apportare alla parte un qualche pregiudizio; e fra queste parvemi proprio significare l'applicazione dell'impiastrò fatto di cicuta, quale ufollo per molto tempo inutilmente: onde fu espediente additargli l'uso d'altro impiastrò fatto di malva passata per staccio da replicarsi almeno due volte il giorno, lo che se avesse egli qualche volta trasalciato, si fosse allora appreso all'uso delle fomentate sufficientemente calde, per vedere se con queste instancabilmente ripetute, potesse egli ottenere in parte lo scioglimento del medesimo cotanto desiderato. (d) Furono invero innumerabili le diligenze praticate da esso sopra alla parte malata, ed altrettante furono quelle interne semplici, e molto profittevoli al di lui corpo, mentre nel lungo corso di tempo fu possibile vedere distrutto il sopra accen-

N

nato

(b) Appellari autem Scirrbus foles istiusmodi tumor corporis durus, qui obique omni fere doloris sensu est, fereque semper ab ipsissato in glandulis sanguine suboritur: licet etiam in aliis partibus, & cumprimis in pinguedine oriri possit. Heist. loc. cit.

Scirrbus est tumor durus, tactui remissus, indolens, immobilis, ut plurimum sensum generatur in partibus mollioribus præter glandulas occupans alias partes in primis carnosas, sive externas quoscunque. Erma-

ler. senten. apud Allen. Synop. Art. 1273. V. Scirru. qualis est tumor.

(c) Quamdiu enim nullus in eodem sensus doloris est; tamdiu minus periculum est. Simulæque vero dolores nascuntur, aut exulceratur, carcinoma, hoc cancer imminet. Heist. de Scir. loc. cit.

(d) Catapl. fina, vel fomenta, & semper quidem calida, non neglectis interea medicamentis internis, quam diligentissime superiungenda sunt. Heist. loc. cit.

nato tumore scirroso, senza apportare molto incomodo all'Infermo, essendosi condotto lentamente per la strada della suppurazione con avergli in questa guisa formato un vasto accesso. (e)

Per la qual cosa la mattina del dì 2. Giugno 1768. mi determinai di creare nella parte più declive del medesimo un taglio un poco obliquo per dare esito alle materie in esso contenute, ed in conseguenza scemare all'Infermo il doloroso, e grave pondo che esso arrecavagli: perciò aprii la strada all'uscita di una materia purulenta non molto concotta, di un colore flavo, e verdastro; la quale raccolta tutta, e poscia pesata arrivò al peso di libbre quattro (f); dalla quale uscita rimasevi un ampio, e profondo vuoto, dentro al quale vedevansi altri tre consecutivi vuoti, uno de' quali insinuavasi dentro la parte laterale interna della destra mammella, penetrando sopra al muscolo gran pettorale, il secondo s'insinuava per la parte superiore dell'ascella quasi in vicinanza del capo dell'umero, e l'altro parimente profondava per la parte più interna della medesima, dove nel fondo vedevansi chiaramente traversare scoperti, ed isolati alcuni vasi asillari, i quali nel progresso del tempo rimasero del tutto coperti, mercè una sollecita vegetazione di carne nata in questa parte.

Dopo lo sgravio, ed uscita delle poc' anzi accennate materie, riempii quel gran vuoto con varj stuelli di fortissime fila asciutte; annessivi varj piumaccioli situati sopra alle medesime (g); e feci una discreta competente fasciatura ritentiva, qual è appunto delineata dal celebre Lorenzo Eistero (h); e dipoi collocai l'Infermo in una piana situazione, lasciandolo in sua libertà, per rivederlo la mattina seguente, che lo ritrovai alquanto quieto, con pochissimo dolore alla parte ed anche con leggerissima febbre.

Passati finalmente giorni tre dalla fatta apertura, mi determinai di sfasciare per la prima volta la parte malata, e levato tutto il primo apparecchio, mi si presentò all'aspetto una ampia e pro-

(e) *Satis autem maturum iam abscessum esse hinc potissimum cognoscitur; si scilicet tumor antea durus quadammodo mollescit atque albescit, si digitus admotus liquorem intus delitescentem percipit* Heist. P. I. lib. IV. Cap. III. P. VIII. C. 280. De Supp. vel Absces.

(f) *Ita vulgaris, & consuetudo fuit curandi ratio; attamen nonnulli recentiores, inter quos & Gouvius Galus in Chirurgia sua pag. 259. conten-*

dunt, aperturam abscessus non differendam esse, donec maturus sit. Apud Eist. loc. cit.

(g) *Satis videtur post aliquam corruptae materiae partem emissam; linamentis corporis plagam implere, & cum splenys, atque fuscis deligare.* Heist. de abscess. loc. cit.

(h) Heist. Sect. II. explicatio Tabulae trigesima septimae C. 205. fig. 25. de Vici. Uteri, & Scapulae.

99
e profonda piaga con copiosissima suppurazione, unita ai di sopracennati vuoti, non molto dolente, nè infiammata; onde medicai la medesima col solito sistema di semplici fila asciutte, servendomi di quando in quando delle semplici lavande di china china, introdotte artificiosamente in quel vuoto piagato con molto profitto del medesimo Infermo.

Seguitò pertanto per il corso di dieci in dodici giorni mattina e sera a fluire dall' accennata piaga, derivata dall'apertura dell' ascesso, una copiosa suppurazione, la quale non apportava al presente alcun danno. Questa però sempre più mancava, e nel prefisso tempo terminò: ma tosto arrivato che fui ad ottenere un tal beneficio, ecco tutto in un tempo l' Infermo sulla sera assalito inaspettatamente da una orripilazione di freddo, che durogli senza dubbio per lo spazio di due ore, e gli si dichiarò una ardita febbre, accompagnata da molto dolore di capo, da calore universale al di lui corpo, con qualche caricatura al petto affannosa; lo che fece restare tutti pieni di somma ammirazione, non sapendo per anco, donde immediatamente ciò derivasse.

In vista di tale mutazione sfasciai subito la parte malata, ed osservai sotto, o poco sotto alla circonferenza dell' esistente piaga nell' ascella un principio d' infiammazione erisipelatosa, la quale razzante spandevasi posteriormente dall' ascella alla scapola, dalla scapola scendeva giù serpeggiante a più della metà del dorso; (m) lo che mi fece subito risolvere di fare all' Infermo una emissione di sangue dal braccio opposto, ed applicare localmente alla parte infiammata le fomite, da replicarsi spesso volte il giorno; come fu con somma diligenza, ed attenzione dai di lui assistenti praticato fino al totale termine della medesima.

Non cessò così presto questo nuovo corso di male erisipelatoso; anzi sempre più s' intervenne talmente, che dal di lui curante Medico fu saviamente pensato, oltre all' uso dei medicamenti interni, di rinnovare ancora all' Infermo altro sangue dal piede; dal che ne riportò molto profitto; e fu ritrovato esso sangue di diatesi infiammatoria.

Nel corso di giorni sette dopo tale emissione di sangue andò sempre diminuendo nelle prefate parti in tal maniera il corso infiammatorio erisipelatoso, che supponevasi il suo total termine. (n)

N 2

Ma

(m) *Erysipelas, seu ignis sacer, quaecunque partem corporis occupat ex improposito corrumpitur aeger.* Apud Allen. in Synop. Act. 1807. C. 277. V. Erysip. 125.

Erysipelas foras effusum, intro-

verti minime bonum, at ab interioribus foras bonum. Hipp. Sect. VI. Aph. 25.

(n) *Sanguis in h'c afflatus pleuriticorum similitis, & quandoque secundus, vel tertia vena sic postulat.* Apud Allen. in Synop. loc. cit.

Ma non fu tale certamente il nostro supposto; poichè con altro inaspettato periodo di nuova risentita febbre, osservammo una tale infiammazione riaccendersi nuovamente, e voltare il suo corso razzante per la parte superiore del dorso alla spalla, dalla spalla poi girare per la parte anteriore della medesima ad occupare seggèggiante più della metà del petto, e dal petto, risalendo nuovamente alla spalla, estendersi finalmente per tutta la circonferenza del braccio, fino alla piegatura del cubito, (s) nella quale dopo reciproco corso di nuove razzature infiammatorie sempre dolorose, e di varie, e copiose pustollette miliari, che convertivansi dipoi in tante minutissime vescichette ripiene d'umore acquoso, che da se stesse naturalmente seccavanti. Finalmente una volta dopo un periodo di tempo di giorni venti tal malattia pose quivi il suo termine, (p)

Ma però in mezzo a questi nuovi affalti infiammatorj non restò mai nel divisato tempo danneggiata la primitiva piaga dell'ascella, nè tampoco danneggiati restarono i tre consecutivi vuoti penetranti nella medesima, come sopra accennai: anzi l'una, e gli altri sempre profittavano talmente, che mediante la diurna, e costante vegetazione di nuova carne restarono del tutto aboliti; comp abolita, e ripiena ancora restò l'eterna piaga, la quale poi prontamente si cicatrizzò: onde nel corso di giorni quarantasei restò il prefato Giuseppe Lippi perfettamente guarito.



OS-

(s) *Sensim malum hoc latius serpsit, & de loco in locum progreditur, & febrem habet conjunctam.* Apud Allen. in Synop. loc. cit.

(p) *Pars affecta paulisper intumescit cum dolore, & rubore, ac in-*

genti aestu & densa, minimarum pustularum ordine distinguitur; quae, cum magis inflammatione, in vesiculas subinde facessunt. &c. Apud Allen. loc. cit.

DECIMAOTTAVA OSSERVAZIONE

Sopra una malattia di Testicoli Scirroff, uno dei quali partecipava del Canceroso, accaduta nella persona di Giuseppe Squilloni, il dì 4. Aprile 1769. in Firenze.

A Dì 4. del suddetto mese Giuseppe Squilloni in età d'anni 45., di temperamento melancolico, fece un viaggio col suo Padrone: ma, come che doveva stare a sedere dietro al Caleffe del medesimo, spesso per la cattiva strada gli accadeva di provare orribili sbalzi, e crolli.

Uno di tali sbalzi fu talmente più degl'altri violento, che dal posto ove sedeva l'alzò improvvisamente; ma per la gravità del corpo costretto nuovamente a cadere di dove era stato sbalzato, s'infranse inaspettatamente i Testicoli; restando per quanto egli s'accorse più schiacciato, e compresso il destro; nel quale sentì immediatamente un grandissimo dolore; talmentechè subito fece fermare il caleffe, e allora poco ne mancò, che egli non cadesse in terra svenuto: ma fattosi coraggio, ed animato parimente dal suo Padrone, parevale che bel bello tale dolore andasse terminando per rendersi capace di proseguire l'intrapreso viaggio.

Ma fu vana una tale speranza, poichè le ripetute scosse del caleffe, faceangli risvegliare di tanto in tanto il solito dolore, mediante il quale era necessitato, e costretto dire al conduttore del caleffe che lo fermasse, ed in tal guisa facendo quietavasi per quel momento il dolore; con l'ajuto dei quali riposi poté proseguire il suo viaggio, ed arrivare nel luogo ove avevano già stabilito fermarsi.

Arrivati che furono al loro termine, non sentendo egli alla parte molto incomodo, non volle usare diligenza alcuna, nè cercò di farsi visitare; e con questa trascuratezza seguì per tutti quei giorni che si trattenne in quel paese.

Per la qual cosa continuò per del tempo molto a sentirsi nella divisa parte testicolare qualche tocco passeggiaro di dolore pungente da esso per anco non curato: ma la continovazio-

ne

ne, e l'accrescimento del medesimo nel progresso del tempo fece sì, che non potè fare di meno di non palestarlo, osservando egli; oltre al dolore, la mole ancora del testicolo fuori affatto del naturale, e lo scroto in particolare dalla destra parte, dentro alla quale risedeva l'offeso testicolo divenuto molto gonfio duro, ed infiammato (a). Allora fu che si fece prontamente visitare da un Cerusico, dal quale furono praticate varie cose, mediante le quali si manifestò alla fine nella parte laterale esterna destra dello scroto alquanta suppurazione, alla quale dal prefato Chirurgo fu dato esito per mezzo di un taglio, da cui uscirono materie molto sciolte, di un colore in parte flavo, ed in parte verdastro, anche in molta quantità (b).

Mercè un tale sgravio di materie per tanto rimase flumidissimo in gran parte lo scroto; ma non diminuì però di mole l'ingrossato testicolo, quantunque durasse molto tempo a fluire dalla prefata apertura dello scroto suddetto una materia sottile quasi sierosa, e sanguinolenta accompagnata da sensibile, ed acuto dolore, che l'Ammalato soffriva di tempo in tempo dentro alla sostanza testicolare; il quale in vece di scemare di mole, sempre più gonfio, duro, dolente rendea (c). Per tal peggiorimento l'Ammalato fu costretto per compenso a tenere la cuffia detta sospensoria dello scroto, delineata dal celebre Lorenzo Eistaro, per alleggerirsi quel peso, che lo rendeva assai incomodato (d).

Per la qual cosa furono praticate da esso Chirurgo in diverso tempo varie diligenze nel medicarlo lusingandolo sempre d'una facile guarigione; quale per altro vedendo molto lontana, dopo di essersi alquanto inquietato, alla fine si determinò col permesso del suo amorevolissimo Padrone di portarsi da me per farsi visitare; lo che feci con somma diligenza, ed attenzione, avendo-

me-

(a) Enim Inflammatio ista provenit ex graviore quadam violentia externa, idest lapsu, collisione, aut contusione, qualibus ij praesertim obnoxii sunt, qui vel festinant nimiti, vel imprudenter in equum ascendunt. Heist. Chirg. P. I. Lib. IV. Cap. V. C. 118 De Test. Infl.

(b) Istud mali genus non usque adeo leve reputandum est; namque, quam saepissime evenire solet, aut Abscessus, aut Sphecclus superveniat, vel in

Scirrhum, atque Cancrum tumor transcat, qui quoque mortem ut plurimum post se trahit. Heist. loc. cit.

(c) Inflammatio Testium plerumque in Scirrhum transit, & quandoque in Cancrum abiit, praesertim si punctiones acutae sentiantur. Apud Allen. in Synop. Art. 1232. C. 290. V. Inflammatio Testium.

(d) Hist. Chirg. explicatio Tabulae Trigesimae Odavus Fig. 13. C. 1148.

melo, ancora con biglietto il suo medesimo Padrone caldamente raccomandato.

Io però, prima d'ogni altra cosa raccolsi tutte le antecedenti notizie della sua malattia, che fino ad ora ho descritto, e dopo passai a visitare la parte malata, e ritrovai nello scroto una piccolissima piaga sinuosa, con callosità situata nella parte laterale esterna destra del medesimo, dalla quale vedea si tramandare una sottilissima, e fluida materia di flavo colore sanguinolenta, e fetente; ed introducendo la tenta, o specillo in detta apertura osservai che s'internava fino su al testicolo, apportando in tale atto all'Infermo gran dolore.

Oltre a questo, ritrovai chiaramente, quasi tutto il Testicolo divenuto di una mole fuori del naturale durissimo, ed al tatto anche dolente, l'altro suo compagno era del tutto sano.

Dopo avere ciò fatto, essendo stato immediatamente ricercato dall'Infermo della natura della presente malattia, e della cura insieme, che sarebbe convenuta alla medesima, risposi che questa sua malattia in quella parte era del genere delle scirroze, partecipante del canceroso; onde non pareva, che s'ammettesse altro più sicuro tentativo, di quello della estirpazione del Testicolo, e non facendo questo sarebbe tale malattia infallibilmente cresciuta con massimo notabile detrimento della sua Persona (e).

Rimase egli ampiamente soddisfatto delle mie espressioni, riconoscendo benissimo, che con proseguire in tal maniera pareagli impossibile ottenere la totale guarigione, la quale desiderava al segno maggiore. Laonde si determinò volentieri di mettersi con prontezza sotto la propostagli operazione e cura, e a tale effetto, per commissione ancora dell'istesso suo Padrone, volse che io subito ne intraprendessi la cura, e facessi quello, che conveniva. Io pertanto mi determinai di farla nella maniera seguente.

Preparato tutto ciò che mi poteva bisognare per detta operazione, e situato in letto l'Ammalato supino, lo feci tenere d'alcuni assistenti; uno dei quali mi servì per tenere sollevati con due dita della sua mano gli integumenti dello scroto superiori appunto al corpo del Testicolo malato; sopra del quale feci un

ta-

(e) *Si nihil omnia medicamenta ad Scirrbum digerendum proficiunt, si vires hominis patiuntur. baud aliterum est, ne, ut fieri plerumque solet, in Cancerum Scirrbus transiens, opportune ipsum excidere.* Heist. Chirur. P. I. Lib. IV. Cap. XVI. Par. XI. cap. 139. De Scir.

cola, e semplice piaga, che in breve tempo si cicatrizzò, e nel corso di giorni 46. restò l' Infermo perfettamente guarito.

Appena compì l'anno dopo la guarigione della fin qui descritta malattia, principiò bel bello a sentirsi incomodato dall'altra sinistra parte dello scroto, in cui rimasto eravi l'altro Testicolo sano; ed osservò egli ancora che in questo luogo principiò egli il dolore, che arrecava ad esso molto incomodo, unitamente all'accrescimento di mole del Testicolome desimo divenuto quasi uguale al primo, che aveva sofferto l' Anno scorso; e ciò nonostante tollerò per qualche tempo con coraggio un tale incomodo senza mai palesarlo al suo Padrone; Ma vedendo poi, che il procrastinare di più potevagli arrecare molto nocumento, col timore che non si dovesse formare una malattia uguale alla prima dell'anno passato, si determinò finalmente di palesare al suo Padrone quanto di presente accadeagli: Fu subito ordinato dal medesimo che egli da me si portasse per essere visitato; e bisognando ne intraprendessi la cura. Visitatolo adunque ritrovai il rimasto Testicolo sinistro fuori della mole naturale, duro, ingrossato, dolente, quasi uguale al primo già nell'anno scorso estirpato, minacciando una malattia in brevissimo tempo simile, o quasi simile alla passata. Laonde gli proposi la demolizione, giacchè le diligenze fino allora da esso praticate, come mi disse, erano state tutte inutili, e senza alcun profitto. Per la qual cosa lo ritrovai ben disposto a soggiacere volentierissimo per la seconda volta ad una simile operazione, alla quale prontamente e pieno di coraggio si sottopose; la qual cosa certamente esegui con successo ugualmente felice, e ritrovai tutto il Testicolo unitamente alle sue proprie membrane durissimo, e nel centro una suppurazione di materia molto densa ed alquanto fetente.

Il regolamento pertanto praticato in questa occasione fu l'istessissimo di quello ampiamente descritto di sopra, tanto per rapporto all'operazione, quant'ancora alla cura, la quale essendo stata molto felice fece sì, che nel corso di giorni 43. il prefato Giuseppe restasse perfettamente risanato.

R I F L E S S I O N E.

Ognuno ben sa, che la maravigliosa composizione di questi corpi glandulari nel sesso virile è dotata dalla natura di parti oltremodo delicate e sensibilissime; dal che risulta, che qualunque esterna violenta impressione fatta sopra di esse è certamente valevole a produrvi sinistri morbofi avvenimenti, come
 O si può

acutissimo per tutto il giro del capo, talmentechè non ritrovava in veruna parte quiete alcuna.

A vista pertanto di tali fenomeni, che riunivansi in tutto, e per tutto in questa malattia infiammatoria, avanzai a fare ai Parenti dell' Infermo il prognostico del pericolo della vita del medesimo, e frattanto stimai bene estrarre dal braccio once 10. di sangue, quale fu ritrovato molto infiammato, duro, e scarso di siero, con superficie densa, e crostosa (b); dopo di che feci applicare alla parte malata una fomenta calda, la quale fu indefessamente dai di lui assistenti praticata, benchè senza il minimo profitto dell' Ammalato: anzi dopo tre giorni di ripetute fomenta crebbe talmente l' infiammazione, il dolore, e la febbre, che mi determinai di passare ad altra emissione di sangue dal piede in dose d'once otto, il quale osservato fu uguale appunto al primo, che fu estratto (c), e mi determinò di fare applicare sulla parte malata l'empiaastro fatto di malva, ed altea passata per staccio, aggiuntavi una porzione d'unguento rosato, per mitigare quell' acuto dolore pungente, di cui l' ammalato con ragione lagnavasi.

Per la qual cosa dopo tre giorni di replicato impiaastro, che mutava sera e mattina, si mitigò il dolore, e s' osservò comparire sull' esterna superficie dell' indicato Tumore infiammatorio molte aperture ed orifizi, dai quali vedevasi incominciare a scaturire una materia sottile viscida, quasi simile al miele, e degeneratinge, in quel grado di male, che col vocabolo nostro Favus e comunemente Vespaio è chiamato, (d) e dai Greci Medici Cerion, per la similitudine a quell' Opera ingegnossima dell' Api lavorata, e con bell' ordine in più celle divisa, che chiamasi Alveario, dove esse sogliono deporvi il miele; e parimente alla somiglianza dell' altra industriosa stanza delle Vespe in diverse,

O 2

c più

(b) Si quid interea sanguinis per venam aliquam detrahatur, id dum frigescit, albicansi quadam, ac tenaci cute, sine crusta, qualis fere porcorum cutis recentior apparet, sensim obducitur. Heist. Cap. V. De Phlegmone.

(c) Inflammationes graviores ab internis causis natae, utilissimum est sanguinem pro ipsius hominis viribus, atque habitu larga copia detrabere. Heist. loc. cit.

(d) Si vera in cutis parte illa foraminula sunt majora ex similitudine vocatur Favus, Cerion, & Meliceria; liquor tunc effluens, est infusus Viscis, vel Mellis. Io. de Gort. Chirurg. repurg. Lib. IX. Cap. 11. num. 1378. De Herp. V. Favus.

(e) (Aetius) Favus dicitur Ulcus multis foraminibus pervium, ex quo Melli similis humor excernitur.

e più cellette spartita, onde da ciò desunto ne venne il nome di Vespaio, o Favo comunque voglia chiamarsi.

Queste piccole aperture per tanto sempre più dilatavansi col tramandar copiosa materia flava molto solida, la quale per mezzo di varie pigiature scaturiva fuori dagli indicati orifizi tortuosi, che con bell'ordine di lavoro suppuratorio traforato avevano tutta la gola sinistra a guisa di un vaglietto, e penetravano tutti, o quasi tutti nella cavità della bocca di dove tramandarsi sentivasi una molto ingrata, e fetente esalazione; poichè questa aprire non potevasi per cagione della gran gonfiezza infiammatoria, ed il malato era costretto per cibarsi a prendere cose fluide, e sottili introdotte nella medesima per mezzo di un artefatto lambiccio, e quantunque sottili fossero, con massima difficoltà di glutir poteva.

Dopo il periodo di tempo di giorni quattro, nei quali fu sempre seguitata l'istessa indicazione curativa dell'empiaastro erbaceo, osservai bel bello scemare all'Infermo la febbre unitamente agl'altri sintomi, ed a sfumarsi il volto, e sopra tutto la parte sinistra di esso; inoltre di tutte quelle aperture ed orifizi se ne formò una sola piaga ampia, e profonda al diametro di una moneta di paoli cinque, dalla quale vedevasi chiaramente la cavità della bocca, e porzione delle mascelle, e particolarmente della superiore, osservandosi colà dentro della tumefazione infiammatoria.

Progressivamente al corso d'altri sei giorni medicai la divisa piaga, principalmente con diluenti lavande di pura acqua, e con semplici fila, sopra alle quali posava il solito empiaastro, osservando che tal mezzo era bastante per fare diminuire quella turgescenza del volto dell'Infermo, e per conseguenza cominciare leggermente ad aprire, e serrare la bocca, e prendere ancora qualche cosa più solida per sua maggior nutrizione, la qual cosa non avea potuto per l'addietro praticare, se non che in scarsa dose, e con massima difficoltà nella deglutizione.

Un tale miglioramento per tanto ogni giorno più avanzavasi a norma della diminuzione della tumida parte, e quanto che andava scemando la suppurazione copiosa tramandata dall'indicata piaga, la bocca in questo mentre, o per dir meglio la mascella inferiore riacquistò tutti i perduti moti; onde l'Infermo potè a suo piacere masticare ciò che voleva.

Non posso poi bastantemente esprimere quant'acquisto ci facesse in tutto, e per tutto nel progresso d'altri giorni sei, nei quali

quali mi determinai levare detto empiaistro, ed applicare all'inferma parte sole fila asciutte, al contatto delle quali vedeasi sempre più riempirsi di nuova carne la profonda piaga, ed in conseguenza rimanere del tutto cuoperte anche le divise mascelle, con avere lasciato sull'esterna superficie della sinistra gota una semplice piaga, facile ad una sollecita cicatrice; quale in breve tempo naturalmente si fabbricò, e nel tempo e termine di giorni 34. l'Ammalato rimase finalmente guarito, senza essergli rimasto nella faccia veruna mostruosità.

VENTESIMA OSSERVAZIONE

*Sopra due Ferite particolari nel braccio destro nella
Persona di Maria Caterina di Michele Pagni,
seguite il dì 20. Maggio 1771. in Firenze..*

A DL 20. suddetto chiamato per visitare prontamente Maria Caterina di Michele Pagni Fanciulla in età d'anni 28., d'abito di corpo pletorico, la ritrovai svenuta in un letto, che fortemente tremante lagnavasi, ed al segno maggiore dibattevasi per il letto ora da una, ed ora dall'altra parte del medesimo rivolgendosi.

Da me per tanto interrogati i di lei domestici della cagione, onde mai essa così furiosamente lamentavasi, e mentre ella in se stessa tornava, mi additarono nell'atto medesimo la parte del braccio ferito; il quale avendo visitato diligentemente in esso ritrovai due ferite prodotte da una Cesoia da Sarti lunga (vedi Tavola III. Figura II. A A), la quale fu scagliata da una Persona, colla quale detta Maria altercando, in atto di difendersi dal colpo, alzò il braccio destro, ed in tale contrattempo restò ella colpita e ferita dalla punta delle predette Cesoie, che gli produssero l'accennate due ferite cruente, nelle quali rimasevi dentro detta Cesoia, con avere traforato da una parte all'altra tutta la sostanza muscolare del braccio stesso (Vedi la Figura medesima c c).

Questa infelice Donna, benchè per un atto così crudele, e barbaro attonita, e quasi fuori di se stessa si ritrovasse, tuttavia si fece

coraggio, e tutto in un tempo prese colla mano sinistra le Cefoie già fitte nel braccio, e coraggiosamente se le tirò fuori da esso.

Una di queste ferite per vero dire, era situata sotto appunto alla piegatura del Cubito in linea quasi retta al diametro di tre dita trasverse per la parte inferiore (come è notato nella citata Figura B B); L'altra ferita parimente era situata nella parte superiore del braccio di minore estensione di figura longitudinale, diametralmente lunga tre dita trasverse (Vedi la Figura medesima D D).

Appena che ella ebbe ricevuto il colpo, gran dolore oltre modo acuto, e spasmodico disse ella aver sentito, non tanto nelle divise ferite, quant' ancora per tutta l'estensione del braccio, per il che gli sopravvennero impetuose convulsioni (a). Oltre a questo le dita quasi tutte della mano destra rimasero del tutto irrigidite, e contratte, e prive affatto dei loro moti; ma più d'ogn' altro fossil una massima rigidità, e contrazione il dito Indice, Medio, Anulare, e Minimo, dimodochè detta Ragazza non poteva in questi luoghi soffrire il minimo, e lieve ratto, nè volgere eziandio in veruna parte il braccio e mano senza un suscitamento di insopportabile dolore.

A vista per tanto di così orribili accidenti, stimai bene di fare ai Parenti dell' Inferma un prognostico pericoloso dello storpio quasi sicuro delle dita della mano; qualora essa di tal malattia ne fosse guarita; ma della perdita ancora di vita; facendo loro vedere in chiaro in quanto allo storpio, che per sì fatta recisione di parti muscolari, tendinose, e nervose scorrenti, per tutta l'estensione del braccio ferito, e corrispondenti alle dita della mano, non poteva scansarlo (b).

Dopo d'aver adempito a tutto quello, che riguardava il pro-

(a) *Spasmus ex vulnere lethali, idest valde periculosus. Hipp. Aph. 1. Sect. V.*

Ubi dolores ex nervo vel tendine quodam laeso nascuntur, difficillima plerumque curatio est, siquidem convulsiones & inflammationes semper fere iisdem superveniunt Heist. De vul. dolor. Cap. XVII. pag. 83.

(b) *Iudicatur itidem membra ad usum a natura instituta fere ine-*

pta. & perpetuo impotestas, quando nervi, & tendines, & ligamenta quae Graeci vocant Syndesmos peritus sunt absissa, suamque propriam actionem perdunt. Apud Io. Tagaul. Depla seu Cru. vul.

Si quis tendo forte lesus aut praecisus est, tum pars illa ad quam is pertinet mobilitatem suam amittit. Heist. Chir. Tom. I. pag. 69. §. XI. De vul. univ. spact. loc. cit.

prognostico di una tale divisa malattia, passai subito a medicare le di sopra accennate ferite, e dopo d'averle con somma diligenza lavate con vino bastantemente caldo, feci la riunione delle parti disunte per mezzo della fasciatura unitiva (c). Dopo avere messi alcuni stelletti schiacciati di fila, e di piumaccioli bagnati nello spirito di vino assai allungato con semplice acqua, ed inoltre collocai il braccio infermo in una situazione molto comoda con varj guanciali; e dopo avere fatta una discreta emissione di sangue dal braccio opposto in dose di once 8. lasciai la malata in sua libertà alquanto quieta per rivederla la mattina vegnente, insinuandogli la quiete, e la dieta tanto necessaria, e le spesse bevande.

La mattina per tanto tornai a far visita alla mia Inferma, e la ritrovai alquanto quieta con i polsi però più frequenti del giorno trascorso, significandomi che ella aveva passata una notte travagliata molto dalle convulsioni, e dal dolore, che di tempo in tempo si risvegliava per tutto il braccio infermo; lo che sul fare del giorno si calmò unitamente alle convulsioni, e restò in tal maniera molto contenta, e quieta.

Non parvemi in questa mattina di dovere fare altro di più, se non che bagnare la parte col solito spirito di vino, proseguendo tal metodo curativo senza mai sfasciarla per il corso di giorni sei; in fatti, compito il giorno sesto da che ella restò ferita, sfasciai la parte malata, e tolto via tutto l'apparato fatto nella prima medicatura, ritrovai le sopradette due ferite perfettamente riunite; il braccio però era restato molto tumido, ed irrigidito senza comparire sull'esterna superficie segno alcuno di infiammazione, nè di dolore; non risvegliandosi questo, se detta Maria non faceva qualche benchè leggero moto del medesimo.

Le dita tutte, o quasi tutte della mano corrispondenti al braccio tumido restarono prive dei loro naturali moti, ma colla lunga diligenza fatta praticare dalla malata nel fare tenere difesa la parte dall'ambiente dell'aria molto fredda, e coll'uso ancora delle frequenti, e ripetute immersioni del braccio, e mano nel bagno caldo di varie erbe emollienti composto, adagio adagio si abolì la gonfiezza del braccio e s'offerò bel bello ricqui-

(c) *Coeurum solutionis continu- communiter fieri solet in vulneribus et-
 patis multae sunt, & triplex futura* Apud Io. Tagaul. loci. cit.

acquistare i perduti moti delle dita, particolarmente quegli del dito Pollice, Indice, e Medio, e restarono soltanto incurvati l' Anulare, ed il Minimo; i quali nel progresso d' altro tempo bastantemente si sciolsero, onde la prefata Ragazza nel tempo, e termine di mesi tre restò perfettamente guarita.

R I F L E S S I O N E.

Inutil' cosa pare il riflettere sopra alla natura della descritta malattia, mentre alla riflessione dell' Osservazione Decima seconda sia stato in quella bastantemente notato tutto quello, che servir mai può per istruzione universale sopra all' offesa dei nervi, e tendini dei muscoli: ma è però da considerarsi soltanto esser grande, e prodigiosa la potenza del bagno erbaceo; potendosi da questo ripetere assolutamente la cagione di rimuovere la contrazione delle dita, e disporle col beneficio del tempo alle consuete funzioni.



VENTESIMA PRIMA OSSERVAZ.

Sopra una vasta, ed estesa Gangrena, che interessava tutta la Gamba sinistra colla scopertura dell' Osso della Tibia, accaduta nella Persona di Antonio Serni, il dì 22. Aprile 1773. in Firenze.

A Dì 21. del suddetto mese Antonio Serni d' abito, di corpo pletorico in età d' anni 60., s' ammalò d' infiammazione erisipelatosa, e flemmonosa nella gamba sinistra, la quale serpeggiava, e circondava non tanto la parte esterna di essa, ma l' interna ancora con massima gonfiezza.

Questa razzatura infiammatoria avea il suo principio sotto appunto al ginocchio alla distanza di tre dita trasverse, e già già razzante serpeggiando, dilatavasi fino ai malleoli della gamba, con averla del tutto resa smoderatamente tumida, dura e per ogni intorno dolentissima, con pulsazione, con veemente

calore, e rossore talmentechè l'Infermo in veruna maniera tollerar non potea un tatto con delicatezza fatto sopra all'inferma gamba (a).

A questi divisati sintomi, dei quali trionfar vedeasi questa malattia infiammatoria s'unì quello di una possente febbre unitamente ad uno eccessivo dolore di capo, ed universale calore per tutto il corpo dell'Ammalato.

In veggendo adunque tali morbosì accidenti, rimai benè passare ad una discreta emissione di sangue dal braccio in dose d'onze dieci, la quale mi convenne ripetere altre due volte nei giorni consecutivi nell'istessa dose, la qualità di cui fu ritrovata sempre di diatesi infiammatoria.

Per la qual cosa non ostante le usate diligenze, e cautele non fu così facile frenare l'ardente infiammazione ancorchè praticato avessi l'uso continuato delle replicate fomentate, applicate localmente alla gamba inferma per molti giorni; nel corso dei quali sempre più ostinavasi il male in maniera, che dopo un periodo di giorni quattordici comparvero dei segni sopra alla divisata gamba indicanti funeste conseguenze (b).

In fatti si diede subito principio ad osservare tale malattia degenerata in varie pustole, e vesciche, alcune di colore fosco, altre livido, o pavonazzo, e finalmente tutto in un tempo diventare nere, crostose, e dure, indolenti, ed in breve formarfi quel grado di male, che col nostro chirurgico significato Gangrena addimandasi (c).

Or qui non so bastantemente descrivere quale strage apportasse alla divisata gamba il corso infiammatorio, ed in quale stato mai pericoloso di vita si ridusse l'infermo: mentre in brevissimo tempo s'annerì tutta, quasi o tutta la gamba, e s'osservò di più, che l'estremità, cioè piede, e dita erano divenute fredde con

p

un

(a) *Phlegmon, sive exterior Inflammatio dicitur, quum quid in externo corpore magis, quam naturaliter oportebat intumescit, cumque calore, sive ardore, dolore, duritie, rubore pulsibus, atque puncturis continuit urgetur.* Heist. P. I. Lib. IV. Cap. II. Tom. VI. De Phlegm.

(b) *Quo maiora in inflammationibus sunt symptomata, eo graviora sunt mole accidentia.* Heist. loco cit.

(c) *Quadruplices sunt inflammationis exitus: inflammatio resolvitur, atque digeritur in Abscessum ad suppurationem; inflammatio degenerat, vel in Gangraenam, aut Symplicium inflammatio convertitur; vel denique Tumor aliquis durissimus, quem Scirrhum Medici vocant, subnascentur.* Heist. De Phlegmone loco cit.

un senso molto oscuro; cosa che se temere assai, che in questo luogo non si dovesse formare una malattia di simile carattere.

Ma attese le cautele e diligenze praticate in detta parte di cose tutte fomentacee, e spiritose, accadde, che appoco appoco vi comparve al piede, ed alle dita il primiero naturale calore, e s'allontanò tutto quello, che poteva nascere con gravissimo danno dell' Ammalato; la gamba però sempre più s'annerì e si mortificò, e finalmente si fece una malattia gangrenosa di non piccola conseguenza (d).

A vista per tanto di sì orribile caso il malato refesi del tutto agitato, ed oltre modo angustiato, con posente febbre, la quale non facilmente cedè prima che passati non furono giorni venti, nei quali l'Infermo praticato avea indefessamente larghe, e copiose bevande limonacee, e nitrose.

Questa febbre così ardita, che corse il periodo dei prefati giorni, s'offerò dopo andare ogni giorno più a diminuirsi, rendendosi leggiera, e periodica: per lo che feci praticare all'Infermo il decotto di China China da prendersi la sera due ore avanti che prendesse la sua cena, e la mattina il siero depurato in dose di libbre 1.: il quale sistema curativo internamente praticato, fu certamente la cagione immediata, onde si abolì del tutto la febbre.

L'altra indicazione curativa esternamente usata sopra alla malattia gangrenosa, fu certamente la diurna applicazione dell'empiaastro di pane latte, e malva, e fomite (e), affine di tenere la parte gangrenata in una continova umettazione, e per conseguenza per promuovere più facilmente lo staccamento di quel cuoio gangrenoso.

In fatti un principio di tale separazione, non veddesi certamente prima che passati non furono altri giorni dodici, ed allora s'offerò per tutto il contorno della vasta, ed estesa gangrena staccarsi bel bello dalle parti vicine sane quella parte morta, e corrotta, la quale conveniva talora alzarla con diligenza somma colle pinzette, e torla via in parte colle cesioie, ed

il

(d) Gangrena autem Morbus est consistens in mortificatione solidorum cedentium corporum, ut plurimum productus ex magna vehementi inflammatione. Paol. Egin. Lib. 4. Cap. 19. De Gangr.

(e) Ad duriciem escharae calidis liquoribus emollientibus fovenda, & toti parti affectae assidue applicanda Cataplasmata calida &c. Apud Allen. in Synopsi. Art. 1390. loc. cit. V. Signa Gangr.

il rimanente lasciarla nel tempo progressivo della cura alla futura suppurazione (f).

Per la qual cosa doppo il corso d' altri giorni dodici, si vide finalmente staccata del tutto la gangrenata parte della gamba, dal quale spogliamento ne venne in seguito una vasta ed estesa piaga cavernosa unita alla scuopertura totale di una gran parte dell' osso della Tibia, per lunghezza da otto buone dita traverse in circa, il quale aveva mutato il suo colore naturale in nero, fosco, e giallo, con avere sofferto anche esso un qualche notevole principio di malattia cariosa (g).

A vista per tanto di tale morbooso stato del miserabile infermo, stimai bene rinnovare indicazione curativa col levare l' impiastro antedetto, e m' appigliai all' uso delle docciature d' acqua bollitavi dentro una porzione di China China sottilmente polverizzata, da ripetersi mattina, e sera con profitto massimo, e nei contorni della gran piaga posi finissime fila immerse parimente nell' istessa decozione, ed altre poi poneva sulla superficie dell' osso scuoperto separate dalle prime, immerse queste in una discreta porzione di spirito di vino, e talvolta nell' acqua detta della Regina (h).

E per vero dire mercè un tale sistema curativo in progresso di tempo s' osservò staccarsi naturalmente varie lamine ossee, alcune delle quali fui necessitato estrarle fuori dalla gran piaga con le pinzette con somma facilità.

Spogliato finalmente in tutto, e per tutto da quei corpi estranei l' Osso Tibiale, e ritiratafi altresì la suppurazione della piaga, s' osservò nascere sulla superficie del medesimo alcuni strati fibrosi di carne, i quali adagio adagio crescendo, rivestivano quel nudo osso scuoperto, e la piaga parimente, che contornava il medesimo parimente riempivasi con sollecitudine di nuova carne; onde nel periodo d' altri giorni 40. il suddetto osso rimase a perfezione cuoperto coll' esservi soltanto restata una piaga di piccola circonferenza, che indicava sollecita guarigione, la quale finalmente ottenne il suzziferito Antonio Serni nel tempo, e termine di mesi tre, e giorni 12.

P. 2.

VEN.

(f) *Deinde quidquid aridum est, usque ad sanum corpus concidere et.* Aur. C. Cel. lib. 5. Cap. 26. Curat. Gangr.

(g) *Ubi Os aliquand ex quacunque causa flavum colorem inducit, vel plane nigrescit, caries incipit.* Heist. P. I. Lib. V. Cap. VIII. P. V. De

Os. Carie.

(h) *Prima eadem minutissima curandi ratio in carie praesertim leviuscula fieri debet per medicamenta siles spirituosae, ut sunt spiritus vini, vel aquae Reginae Hungariae, quibus salis saepe leviores Caries sanantur.* Heist. De Os. Car. loc. cit.

VENTESIMA SECONDA OSSERVAZ.

*Sopra una ferita di testa molto considerabile accaduta
nella persona di Maria Francesca Roti il dì 26.
Giugno 1775. in Firenze.*

IL dì 26. suddetto fui prontamente chiamato per soccorrere Maria Francesca Roti fanciulla in età di anni 79. di temperamento melancolico, che era impetuosamente caduta da una scala di pietra composta di 18. scalini; da questa precipitosa caduta ne riportò subito una estesa ferita di testa lacerata molto, e contusa, unita alla scuopertura del pericranio, e di porzione dell'osso frontale, perchè si arrovesciarono tutti gl'integumenti, i quali pendenti posavano inferiormente sopra alla fronte, e sopra ambi gli occhi della malata, (vedi la Tav. III. Fig. III. a a) per cui ne avvenne copiosa emorragia di sangue. (a)

La ferita era di figura longitudinale lunga otto dita traverse e larga sei (vedi la Fig. medesima a a b b); principiando dalla parte laterale destra della testa, e traversando lungo l'osso frontale andava a terminare dall'altra parte sinistra, (come si vedeva alla medesima Fig. a a.)

M' accinsi subito a lavare con somma diligenza il di lei capo già calvo imbrattato di sangue, ed i lordati integumenti, che ciondolavano, come pocanzi accennai sulla fronte, con vino bastantemente caldo; indi passando a osservare, se le ossa del cranio avevano sofferta una qualche offesa, niuna ne ritrovai; dopo finalmente che ebbi ciò esplorato, ritirai alla meglio che mi fu possibile a livello, degli integumenti superiormente feriti, quelli che sopra alla fronte ed occhi arrovesciati pendevano e congiunsi tanto gli uni, quanto gli altri ad un mutuo contatto, e feci in tal guisa la riunione delle parti disunte, componenti la descritta ferita. (b)

Per

(a) *Vulnus, ut recentiores definiunt Chirurgi, solutio est continuitatis recens circumata, sine pure, seu putrefactione in particulis mollioribus extrinsecus incidens &c.* lo. Tagaul. de pla. seu cur. vul. loc. cit.

(b) *Solutio continuorum corporis partium sane praeceptum curationis scopum in eo potissimum consistit, ut partes disjunctae uniantur, ac probe glutinentur* Heist. de vul. cur. loc. cit.

Per mantenere adunque ad un contatto immediato ambedue labbri dell' indicata ferita, presi alcuni pezzetti di cerotto glutinoso, descritto alla prima Osservazione; in vigore de' quali situati in una conveniente distanza l' uno dall' altro; come vedesi alla medesima Tav. Fig. IV. *a a e e*; feci quella specie di cucitura secca, come ce la dimostra il celebre Lorenzo Eistero nel Tom. I. Tav. IV. Fig. III. e IV. pag. 109. (c)

Riunita finalmente per mezzo della divisata secca cucitura la ferita, (come si vede alla stessa Fig. segnata *b b b b*), v' applicai sopra varj stelletti piani di finissime fila immerse in acqua vite allungata con acqua comune, con validi piumaccioli di panno fine, indi feci una discreta fasciatura ritentiva delineata dal medesimo Lorenzo Eistero. nella Tav. XXXVII. Fig. IX., e collocai inoltre il capo dell' Inferma Donna in una comoda situazione, insinuandole con premura, che tenesse fermo il capo ferito, e che si procurasse onninamente la quiete. (d)

Dopo avere soddisfatto a tutto quello che richiedeva la prima indicazione curativa; passai a sentire i polsi dell' Inferma, e ritrovatili molto turgidi, nonostante la copiosa emorragia di sangue perso dalla ferita, stimai bene procedere ad una discreta emissione di sangue dal braccio in dose di once sette; il quale poi ritrovai molto acceso, e resistente al taglio con molto siero (e), ed ingiunsi caldamente ai parenti dell' Ammalata; che procurassero onninamente di tenere l' Inferma ad una esattissima dieta molto necessaria in simili ferite di testa, che sono sempre pericolose, e lontana, e ben difesa dall' aria, così nemica alle medesime. (f)

La mattina seguente tornai a fare visita all' Inferma, la quale lamentavasi del dolore, che andava sentendo per tutto il suo capo, ed in particolare nelle braccia, e gambe, dicendomi, che nella ferita non sentiva incomodo alcuno; e sentendo i polsi, gli ritrovai discretamente agitati da non farne caso alcuno.

In questo stato di cose mi determinai soltanto di doc-

cia-

(c) *In non admodum profundis vulneribus, ut in facie, capite, ad evitandas cicatrices, & dolores, adhibenda futura secca per emplastrum tenacia, quae extenduntur supra linteum firmum, vel aliosum; ut inde fiant emplastrorum variae figurae, & parum calefacta applicentur, & manu opprimantur, ad firmiorem cohaesione[m] &c.* Io. de Gott. Chirurg. re-purg. Lib. VII. Cap. I. §. 1214. de vul. de sut.

(d) *Optimum etiam medicamentum quies est Hipp. de ulcer. Tom. II. e III.*

(e) *Adversus inflammationem autem mitti quoque sanguinem ex brachio debet.* Aur. Cor. Cel. Lib. 5. cap. 26. Curatio adv. vuln. inflamm.

(f) *Hic ita primo die ordinatis, isque si grave vulnus est, abstinere quantum vires patiuntur ante inflammationem cibo debes.* Aur. Cor. Cel. Lib. V. Cap. XXVI. loc. cit.

ciare sopra alla fasciatura sotto a cui posava la nota ferita una discreta quantità d'acquavite; lo che praticai mattina, e sera pel corso di giorni dodici, senza che l'Inferma Donna sentisse il minimo incomodo doloroso, talmente che passò ella detto tempo molto quieta, ed oltremodo contenta, senza sfasciarla. Adunque in veggendo un profitto massimo nato fin allora alla medesima inferma mi determinai sfasciare il capo, e tolsi via tutto il primo apparecchio, quale era talmente rifeccato sopra alla fronte, che per staccarlo, mi convenne usare più volte ripetute docciature di pura acqua calda, per mezzo delle quali poi finalmente sfaccossi, ed osservai unitamente con quegli della casa la divisata gran ferita del tutto a perfezione riunita, senza avere ritrovata la minima suppurazione; onde stimai bene lavare coll' istessa acquavite la fatta cicatrice, e lasciare in libertà la furriferita donna perfettamente guarita, nel tempo e termine di giorni dodici.

RIFLESSIONE.

Altro in aggiunta alla furriferita Istoria non pare doverli sciamamente riflettere tanto sull' azione del medicamento spiritoso, quanto sull' emissione del sangue, mentre tutto questo fu notato alla prima Osservazione: ma è bensì da notarsi in questo luogo quanto sia profittevole lasciare stare dette ferite senza sfasciarle, più che sia possibile; ed in particolare allora quando non apportano ai malati il minimo, o lieve incomodo.

Il celebre Waldschmidio in quel suo Libretto Aureo Instit. Medic. Ration. condanna fortemente, e giustamente quei Cerusici, i quali scuoprono di giorno in giorno le ferite, volendo essi con ciò dimostrare un atto d'attenzione, o diligenza; ma così operando tolgono la strada alla coalescenza, ed unione delle parti ferite, ed in tal guisa rendono eterne le cure.

VENTESIMA TERZA OSSERVAZ.

Sopra una Frattura in tre pezzi della Rotula del sinistro Ginocchio, seguita nella Persona del Molto Reverendo Sig. Luigi Galeazzi, il dì 28. Agosto 1776. in Firenze.

LA sera del dì 28. del suddetto mese il prenominato Sig. Luigi Galeazzi in età d'anni 36., d'abito di corpo pletorico, nel tempo, che tornava alla sua casa, sdrucciolo sopra ad una buccia di cocomero, nè potendo egli con tutta la forza, che adopò in tal'atto, sorreggersi in piedi, fu costretto a cadere subito in terra precipitosamente in ginocchioni, per la quale caduta percosse fortemente il sinistro ginocchio, e sentì tutto in un tempo un grandissimo dolore, nè più si potè alzare da terra.

Per la qual cosa, mettendo egli una delle sue mani sopra al percosso ginocchio, sentì subito, e da se stesso riscontrò una divisione, o cavità, dicendo seco stesso: *mi sono rotto il ginocchio*; onde per tal ben fondato sospetto, stimò bene seguitare a stare a sedere in terra colla gamba stesa, ed in tal tempo chiedendo soccorso subito appressato gli venne da più, e diverse Persone.

Queste trovarono subito una sedia di comodo, e collocato lo in essa, con somma attenzione, e diligenza, lo portarono alla sua casa d'abitazione. Soffrì certamente il Sig. Infermo molto incomodo e dolore nell'atto di un tale trasporto; poichè dovea in detta sedia tenere un poco curvata l'articolazione del ginocchio, cosa che in simili fratture si deve onninamente scangiar; perchè tal flessione può essere la cagione di funeste conseguenze (a).

Essendo stato finalmente condotto in sua casa, ed alla meglio

(a) *Vitandae sunt magnopere periculosissimae, mortem inde notavit, huius fracturae flexiones genu, quia* Petit. lib. de Morb. Oss. pag. 133.

una discreta emissione di sangue dal braccio in dose d'once dieci, il quale fu ritrovato molto acceso, scarso d'umido, ed al taglio resistente assai. Fu tutto compiuto colla maggiore sollecitudine, e facilità, onde lasciai in questa sera in una massima quiete il Sig. Infermo; ma non tralasciai però di fare ad esso, ed ai di lui Sigg. Parenti il prognostico della malattia, dicendogli, che questa portava seco il più delle volte lo storpio dell' articolazione del ginocchio, convalidando ciò con l'osservazione di più, e diversi Scrittori di Chirurgia, e particolarmente coll'autorità del celebre Lorenzo Eisterio (d).

La mattina veggente tornai a far visita al Sig. Infermo, ritrovandolo molto quieto, i polsi però erano alquanto solleciti; e visitata la parte, osservai, nella gamba, e piede nata una leggiera infiammazione unita ad una turgescenza; per il che stimai bene applicare per alcuni giorni la posca: infatti mercè di tal metodo viddeasi, dopo il corso di giorni cinque, del tutto abolita.

In vista di così piacevole stato, raccomandai con caldezza al Sig. Infermo, che ei procurasse di tenere la parte ferma, ed usare una massima dieta, al segno maggiore necessaria in simili malattie fratturacee.

Or qui non so abbastanza spiegare con qual quiete mai, e tranquillità d'animo passasse il Sig. Infermo i consecutivi giorni fino al num. di 60. senza mai essere sopravvenuto il minimo incomodo doloroso all'infermo ginocchio, nel qual divisato tempo, e termine sfasciai la parte, e ritrovai la Rotula a perfezione riunita, talmentechè col tatto riscontravasi sicuramente tal riunione così ben formata dalla natura, che tutti rimasero oltremodo soddisfatti.

Per la qual cosa stimai proprio rifasciare detta parte per sicurezza maggiore, e tenerla così fasciata per altri sei giorni: terminati questi, la sfasciai nuovamente; e ritrovai l'articolazione del ginocchio molto difficultosa a fletterli. Per la qual cosa per facilitarla mi determinai praticare sopra al predetto ginocchio tre, e quattro volte il giorno frequenti, e ripetute docciature d'acqua di malva bastantemente calda fatte di colpo; nel qual atto riscaldavasi la parte, ed allora con massima diligenza procurava di far forza colle mie mani sull'articolazione del ginocchio per ottenere bel bello la flessione del medesimo.

Q

Gran-

(d) *Rigida, vel minus expedita, eundem genua reddantur.* Hoff.
et diffictius admodum mobilia eo. P. II. pag. 174. loc. cit.

Grande fu in vero, il beneficio, che arrecò un tal mezzo a facilitare la flessione del ginocchio, ed in fatti nel tempo, e termine di mesi tre, e giorni sei il prefato Signore restò perfettamente guarito, ed esercitò tutti liberi i moti rispettivi a detta articolazione particolarmente quello di flessione necessario assai al Ministero Ecclesiastico.

R I F L E S S I O N E .

In aggiunta alla surriferita Osservazione, cademi in acconcio di far vedere, e di riflettere sopra ad una frattura della Rotula, allora quando è rotta, e divisa in tre pezzi, e nel tempo stesso osservare il pezzo superiore di quest' Ossa portato dalla forza dei muscoli nella parte superiore del ginocchio a più, o meno distanza, e gli altri due pezzi rotti rimanere fermi nella sua cavità naturale.

A tale Osservazione mi ha fatto strada la comodità d' avere conservata presso di me la memoria d' una frattura della Rotula rotta in tre pezzi, uguale appunto alla surriferita. Ho voluto per istruzione universale dimostrarla segnata in Tav., che segue nella Persona di un Cavaliere Fiorentino in età d'anni 69.

Seguita una tal frattura della Rotula del ginocchio di questo disgraziato Cavaliere dopo il corso di giorni 22. da che fu fatta la riposizione dell' ossa con quelle regole, cautele, e diligenze insegnateci dall' Arte Chirurgica, fu egli inaspettatamente assalito d' apopleptico accidente, per cui dovette subire soccombere alla morte.

Per così fatto accidente pertanto, mi determinai unito con altro mio Collega, il quale dubitò sul principio della frattura in tre pezzi, di fare la fezione del cadavere, ed in particolare del ginocchio, per rintracciare soltanto l' esistenza della malattia fratturacea in tre pezzi come fu da me giudicata.

Sezione del Ginocchio.

Aperto il Ginocchio, separati diligentemente gl' integumenti, e muscoli, osservammo prima la Rotula nella sua cavità naturale rotta, e divisa in tre pezzi, i quali erano insieme riuniti, e s' osservò di più avere essi incominciato, benchè fresco che fosse, a formare quel glutine, il quale si vede nella Rotula estratta fuori dalla sua cavità col segno manifesto dell' incog-

cominciata riunione della frattura (Vedi nella Tavola II. ¹²³Figura VI. e e d d .)

Prima però d' estrarre fuori la Rotula dalla sua cavità, volli per forza delle mie mani fletter il ginocchio del defunto Signore (come si vede alla medesima Tavola . II. Figura VII. e), e s' osservò tosto, e nell' atto stesso staccarsi tutti a tre i prefati pezzi, e dividerli fra loro ed uno di questi portarsi subito sopra al ginocchio in quella distanza appunto, che fu da me ritrovato poco dopo la caduta che fece detto Signore (vedi la medesima Figura B), nella quale si vedono parimente gli altri due pezzi rotti, e fermi nella sua cavità, segnati (A).

Per mezzo adunque di questa Figura, che ho qui dimostrata, mi è parso d' avere posto in chiara veduta la natura di una malattia fratturacea non molto frequente, ma bensì importantissima, ed interessante la Chirurgia.



VENTESIMA QUARTA OSSERVAZ.

Sopra due Ferite complicate prodotte dallo sparo di un Fucile nel dorso e pianta del piede destro, seguita nella Persona di Giuseppe Davanzelli il dì 2. Dicembre 1777. in Firenze.

A Di 2. suddetto chiamato per visitare prontamente Giuseppe Davanzelli in età d' anni 56., di temperamento sanguigno, lo ritrovai in letto, che agitavasi or quà or là spasimante dal dolore, che additommi soffrire per tutto il piede destro esclamando ad alta voce: *Mi tagli il piede, perchè non posso andare avanti così con questo spasmodico dolore.*

Ricercai la cagione di un tale sconvolgimento, e mi disse- ro i suoi di casa, che esso alle ore due pomeridiane era andato nell' Orto per volere tirare agli Uccelli, che in folla andavano a posarsi sopra ad alcuni frutti dell' Orto medesimo, e che s' era armato prima dello schioppo, quale era caricato a pallini non piccoli; ma siccome detto giorno era piovoso convenegli

difendere dall'acqua piovana il cane dell' Archibuso, e per conseguenza se lo messe sotto il destro braccio, colla bocca inclinata sopra al dorso del piede destro alla distanza di circa a quattro dita traversare lo teneva quivi fermo, ed aspettava il tempo per mettersi in mira, e per fare il colpo. Ma che accadde al disgraziato Giuseppe? Tutto in un tempo senza che ci se l'aspettasse prese da se fuoco il fucile, andò a scaricarsi la botta quasi sul bel mezzo del dorso del piede destro, rompendo la fibbia, bruciando, e traforando scarpa, calza, sotto calza dal di sopra al di sotto del piede. Dopo tal racconto lo visitai, e fattagli levare con somma diligenza l'abbruciata calza, e sottocalza, riscontrai il piede stesso dal di sopra al di sotto ferito, come se fosse stato trapanato, (Vedi la Tavola III. Figura VI. B A).

Queste due ferite comunicavano una coll'altra, ed erano lacerate, e cruento di figura sferica unite alla frattura in più pezzi dell'osà del piede, con perdita di sostanza. Quella ferita situata sopra al dorso del piede, era larga quanto lo è la moneta di testone, e l'altra situata nel mezzo appunto alla pianta del medesimo, era larga poco più della prima, accompagnate bensì con spasmodico dolore (a).

Medicai queste con lavarle prima con vino sufficientemente caldo, e coll'applicazione di semplice sfilà immerse nel medesimo con piumaccioni, e pezze, situate sopra e sotto al diviso piede, e sostenute da valida fasciatura ritentiva, dipoi situai stabilmente in una comoda positura la gamba, e piede dell'Infermo.

Dopo avere fatto questo, situai bene estrarre dal braccio once otto sangue, il quale fu poi ritrovato molto acceso, abbondante di siero, e non molto resistente al taglio; ed in oltre ordinai, che applicato gli fosse per tutta l'estensione della dolente, e tumida gamba una larga spugna immersa nella decozione di semplice malva, e fiori di camomilla sufficientemente calda; e tale fomenta spesso ripetuta, tanto bastò per fargli mitigare in parte quell'eccessivo dolore, che di malavoglia tollerava in essa, e particolarmente quello del piede infermo (b).

Adempito finalmente a tutto quello che richiedeva l'ordine della

(a) In accidentibus vulnerum malis gravioribus, principem fore locum sibi vindicant dolores &c., convulsiones, inflammationes, gangrena, & denique ipsa mors enasci quam aspidissime solet. Heist. Chir. P. XV. P. II. pag. 42. De Vuln. dolor.

(b) Serviant hic in primis in vulneribus, si enati sunt dolores, decocta: sunt ex Malva, Altea, Flor. Camomilla; cum ipsi decoctis expressa spongia identidem madefieri debet donec nihil doloribus reliquum sit. Heist. loc. cit.

della prima medicatura, stimai bene fare ai Parenti dell'Ammalato il prognostico della malattia, quale dissi loro, essere pericoloso sopra la vita del medesimo; e che quand' anche per sorte ottenuta ne avesse la guarigione, averebbe corso rischio dello storpio della parte (c); e per conseguenza poi in veduta tutti quei pericolosi accidenti, che avvenir sogliono in simili casi morbose, i quali poi finalmente sogliono condurre in braccio alla morte i miseri Infermi: per lo che volendo tentare la sorte d' allontanargli, non ritrovavasi altro mezzo che quello di ricorrere all' amputazione della gamba; alla qual cosa mi fu risposto, che facessi tutto quello, che era necessario per la salute dell' Infermo.

Sospesi però l' esecuzione di tale operazione, dicendo meco stesso, *avrò tempo di farla*, e frattanto lasciai il mio malato in detto giorno bastantemente quieto, dicendogli con caldezza, che si procacciasse la quiete dell' animo, praticasse larghe bevande, e fosse esatto all' osservanza della dieta importante all' in simili malattie.

La sera veggente ritornai più volte a visitare il malato: la prima volta lo ritrovai colla febbre, significandomi, che il dolore al piede era soffribile; visitata la parte osservai la gamba mantenerli tumida, e tale la ritrovai nell' istessa sera allora quando ci ritornai altre due volte a visitarlo, in tanto osservava le mutazioni che accadevano in discapito dell' Infermo, per determinarmi di procedere alla mutilazione della gamba, in caso che presentate si fossero (d).

La mattina dopo tornai a fare visita al mio Infermo lo ritrovai sempre più quieto, avendo egli passata la notte con riposo; la febbre era molto discrerata perlochè lusingai, che la continuazione dello stato presente avrebbe fatta concepire una qualche speranza, dopo un lunghissimo tempo, di guarigione.

In fatti in tali divise circostanze di quiete passò l' Infermo i primi otto giorni senza mai doverlo sfciare; terminati questi principiò bel bello a sentire nel piede ferito qualche doloretto passeggerio soffribile; per il che mi determinai in detto tempo levare prima l' indicata semente, essendo allora del tutto umidita.

(c) *Vulnera, quae per sclopeta insinuantur corporibus, gravioribus obnoxia soleat esse malis; maxime ijs casibus, ubi vel Ossâ, vel articuli, vel alia id genus membra corporis nobilitari, glandibus plumbeis, aut ferreis diffringuntur.* Heist. Chi-

rurg. P. I. Lib. I. Cap. 111. De vulner. loc. cit.

(d) *Interim in quibusdam casibus, amputatio tam ipsa necessaria invenitur quamque vel maxime, si vitam hominis servare velimus.* Heist. Cap. XXXIV. pag. 368. De Ampur.

ta la gamba, e sfasciarlo; per fare questo mi convenne usare frequenti, e ripetute docciature d'acqua pura calda, acciò s'ammollassero quelle fasce, pezze, e fila, ch' erano tenacemente attaccate. e risecche alle parti sottoposte.

Ma tosto che levate furono comparve, in veduta principalmente sul dorso del piede una suppurante piaga, che tramandava in copia una materia forile di più colori, e molto fetente, dall'altra parte posteriore del piede, vale a dire nella pianta, si scuoprì altra piaga cavernosa che comprendeva, e comunicavasi coll'altra superiore, formando un canale rotondo cilindrico lungo, il quale passava liberamente dal di sopra al di sotto un uguale materia suppuratoria: in questo luogo appunto, e nell'imboccarura dell'indicata piaga ritrovai la carica dell'archibuso, che consisteva nello stoppaccio, in una quantità di pallini, uniti a varj pezzetti d'ossa il tutto abbruciato, i quali furono veduti ancora da quelle Persone, che si trovarono presenti alla prima sfasciatura (e) (come si vede nell'istessa Tavola alla Figura VII. e e e Figura VIII. d d.)

Dopo avere ciò fatto lavai con somma diligenza dette piaghe, nel fondo delle quali osservai chiaramente esservi altri pezzetti d'ossa con porzione d'altri pallini, che nel tempo progressivo della cura estrassi fuori in più, e diversi tempi (f).

La cura pertanto praticata in questa malattia fu l'uso continuato di ripetute iniezioni di bollitura di China China introdotta nell'una, e nell'altra piaga per mezzo di un schizzetto, le quali scaturivano fuori a fonte dal di sopra; e al di sotto delle medesime; inoltre poneva sopra di esse semplici fila immerse parimente nell'indicata decozione tal mezzo curativo lungamente praticato apportò, a dir vero, all'Inferno un'inesplicabile beneficio.

Non è però da ometterli la diurna suppurazione che tramandarono dette cavernose piaghe nel tempo progressivo della cura unita a varj pezzetti d'ossa tendini, e ligamenti putrefatti, e molto fetenti; talmentechè per un sì fatto disfacimento suppuratorio quelle parti concorrenti alla formazione del piede erano onninamente sciolte, e disunte.

Non

(e) *Ad primam observationem, hoc est, et non alienarum. & glandium in prima extractione quod obtinet. illud opera semper danda Chirurgis est &c. Heist. loc. cit.*

(f) *Siquid in vulneribus per*

fractum illatis infixum haberi. glutinari vulnus ante nec solet, nec debet, quam res infra se perit ut nec ex eodem fuerint extractae &c. Halli P. I. Lib. I. Cap. III. pag. 80. loc. cit.

Non meno degne d'osservazione furono parimente l'infiammazioni resipolari flemmonose, che in più, e diversi tempi s'affacciarono ad abbattere la parte affetta, ed a rendere altresì l'infermo in stato pericoloso della vita: questo attacco infiammatorio s'osservò sempre orribile ripartitamente per sei volte; ma poi finalmente dopo lungo tempo si diede luogo alla tregua, per aspettare un giorno pacificata la gamba, ed il piede, e condursi a vedere una volta la desiata guarigione.

Per la qual cosa, terminate l'infiammazioni, allontanate le suppurazioni, e consolidate le parti offese del piede infermo, vi rimasero in esso due semplici piaghe incavate, le quali mercè la diurna vegetazione di nuova carne facilmente si riempirono; laonde serrata restò la comunicazione fra ambe le piaghe, ed in tal' maniera si dette luogo alla sicuriissima speranza di vedere colla maggiore sollecitudine una produzione di una stabile cicatrice, e di porre una volta il termine a questa guerreggiata malattia.

La prima delle piaghe ad ottenere il beneficio della cicatrice fu quella situata nella pianta del piede, e dopo poco l'altra situata nel dorso del medesimo: finalmente il pre nominato Giuseppe Davanzelli rimase perfettamente guarito nel tempo, e termine di mesi sette,

R I F L E S S I O N E.

Ancora quest'ultima surriferita Osservazione ci muove a riflettere sempre più a non concorrere subito all'operazione dell'amputazione, quantunque tali malattie si presentino subito d'aspetto orribile, e pericoloso della vita degl'Infermi; mentre si vede chiaramente, che il beneficio del tempo, ed il robusto temperamento d'alcuni malati fa sì che resistono sicuramente a qualunque assalto morbofo, come resistè nel caso nostro il surriferito Giuseppe Davanzelli senza la rischiosa operazione dell'amputazione ec.

I L F I N E.

IN-

I N D I C E

DELLE MALATTIE.



P

Refazione pag. 5.

- I. OSSERV. *Ferita di Testa con Rifeff.* pag. 9.
- II. OSSERV. *Ernia Incarcerata con Rifeffs.* pag. 13.
- III. OSSERV. *Idrope Ascite saccata* pag. 19.
- IV. OSSERV. *Ferita di Testa con Rifeffs.* pag. 22.
- V. OSSERV. *Ascesso di una Mammella con Rifeffs.* pag. 26.
- VI. OSSERV. *Malattia complicata Infiammatoria* pag. 30.
- VII. OSSERV. *Malattia complicata Flegmonosa* pag. 37.
- VIII. OSSERV. *Puntura di un Dito Indice della mano.* pag. 44.
- IX. OSSERV. *Malattia nell' Ano.* pag. 52.
- X. OSSERV. *Ferita di Testa con offesa dell' Arteria Temporale.* pag. 57.
- XI. OSSERV. *Malattia d' Occhi recidiva.* pag. 60.
- XII. OSSERV. *Punture nel dorso d' una mano, con Rifeffsione.* pag. 66.
- XIII. OSSERV. *Tumore d' un ginocchio.* pag. 71.
- XIV. OSSERV. *Broncocele suppurato, con Rifeffs.* pag. 78.
- XV. OSSERV. *Malattia Infiammatoria acuta, e sue conseguenze, con Rifeffs.* pag. 85.
- XVI. OSSERV. *Frattura farinacea con ferita d' una gamba, con Rifeffs.* pag. 90.
- XVII. OSSERV. *Tumore Scirrofo nell' Ascella.* pag. 96.

XVIII.

- XVIII. OSSERV. *Malattia di Testicoli, con Ristefs.* pag. 101.
XIX. OSSERV. *Vespaio nel viso.* pag. 106.
XX. OSSERV. *Due Ferite in un braccio, con Ristefsione.* pag. 109.
XXI. OSSERV. *Gangrena in una gamba.* pag. 112.
XXII. OSSERV. *Ferita di Testa, con Ristefs.* pag. 116.
XXIII. OSSERV. *Frattura della Rotula, con Ristefs.* pag. 119.
XXIV. OSSERV. *Due Ferite complicate nel dorso e nella pianta del piede, con Ristefs.* pag. 123.



R

SPIE.



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I.

FIGURA I.

- A A* Testa con ferita cogli integumenti rovesciati scuoperto il muscolo temporale, ed il pericranio.
B B Integumenti feriti, che cuoprono l'orecchia destra.
C C Sopracciglio destro, principio, ed estensione della ferita.
D D Occipite, e termine della ferita.

I I.

- m m* Testa con la cucitura secca, e pezzetti di cerotto.
u u Vestigio, o cicatrice della ferita.

I I I.

- A A* Corpo ascitico laccato.
B B Trocar introdotto nella cavità dell'addome.
q q Acqua che scaturisce fuori a fonte.

I V.

- S S S c c c* Peritoneo aperto con 33. cavità, o borsefette.

V.

- A A* Braccio, e mano tumida.
b b Dorso della mano, cuticola, diti ingrossati, e tumidi.
c c Dito indice ferito, e gangrenato.

VI.

V I.

- B B* Braccio, e polso della mano tumido.
d d Dito indice col primo, e secondo internodio sfacelato.
e e Due aperture piagate nel dorso della mano.
f f Alcuni tendini de' muscoli delle dita scuoperti.
b b Divisione del dito indice dal medio fino al capo della mano.

V I I.

- c c* Braccio, polso, e palma della mano tumida.
r r r r Dito indice sfacelato, e corrotto, scuoperto un grosso tendine scorrente sopra le nude ossa delle falangi.
n n n Due aperture piagate nella palma della mano.
r r r r Due tendini di muscoli scuoperti.
o o Il muscolo abduttore del dito pollice scuoperto.
m m Difusione fra il dito indice, ed il medio fino alla palma della mano.

V I I I.

- A A* Le natiche.
B B Tumore nella natica sinistra.
c c L' orifizio dell' ano.
d d e e Tumoretti sarcomatosi, e fistolosi.
F G h i m Specilli, o tente introdotte nei tumori, e fini fistolosi.

I X.

- o o* Tre instrumenti Chirurgici.



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II.

FIGURA I.

- iiii* **M** Mano tumida col segno dell' otto piccole
ferite sul dorso della medesima.
b b b b Diti della mano, medio, ed anulare tumidi.

I I.

- n n o o* La mano col vestigio delle cicatrici dell' otto ferite.

I I I.

- A A* La colcia gonfia.
B B Tumore nel ginocchio sinistro.
D D Circonferenza del tumore.
c c c c Diramazioni di vene varicose.
E E F F Gamba, e piede tumido.

I V.

- A A* Ginocchio aperto.
c c c c Integumenti arrovesciati d' ambe le parti.
d d Articolazione del ginocchio staccata, e sciolta,
e e e e Il capo inferiore dell' osso del femore.
f f La parte interna incavata del medesimo.
b b b Il capo della tibia, e fibula.
i i i i La rotula del ginocchio arrovesciata, e staccata.
m m Diramazioni di vene varicose.

V.

- A A* Broncocele.
B B Parte del medesimo, che posa sull' umero destro.
Par-

- c c* Parte inferiore pendente sul petto , che cuopre le mammelle.
d d d Circonferenza del Broncocele.
e e e Vene jugulari sfiancate.
f f f f Le quattro aperture piagate.
g g Le mammelle .

V I.

- D D* La rotula del ginocchio estraſſata fuori dalla ſua cavità .
e e e e Veſtigio della riunione della frattura .

V I I.

- c c* Ginocchio aperto , dove ſi vede la rotula rotta in tre pezzi.
A I due pezzi inferiori rotti , e fermi nella ſua cavità naturale .
B L' altro pezzo rotto portato nella parte ſuperiore del ginocchio .



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA III.

F I G U R A I.

- A A* **G** Amba fratturata con ferita , e ſcuoperto l' oſſo della tibia , e fibula .
b b b b Lunghezza , e larghezza della ferita .
D Malleolo interno , dove principia la ferita .
c c c Pezzi dell' oſſa fratti .

I I.

- A A* Ceſoie introdotte nel braccio deſtro .
 lun-

- b b* Lunghezza della ferita per la parte interna del braccio.
c c Lunghezza dell'altra ferita per la parte esterna.
D D La punta delle cefoie pallata da una parte all'altra del braccio.

I I I.

- a a* Testa con ferita con gl'integumenti rovesciati sopra alla fronte, ed occhi.
b b Pericranio, ed osso coronale scuoperto.

I V.

- a a c c* Testa con la cucitura secca, e pezzetti di cerotto.
b b b Lunghezza della ferita, col vestigio, o cicatrice della medesima.

V.

- a a a* Vespajo, e circonferenza del medesimo.
b b b Orifizj varj, od aperture.
c c c Volto, naso, bocca, e labbra tumide.

V I.

- B* Ferita rotonda nel dorso del piede destro.
A Ferita rotonda nella pianta del medesimo.

V I I.

- c c* Varj pezzetti d'ossa.


V I I I.

- d d* Pallini, e stoppaccio.

E R R O R I


CORREZIONI.

Pagina	14 verso	51	<i>dici satis</i>	<i>dici satis</i>
	15	18	<i>perpendicularment</i>	<i>perpendicularment</i>
	—	19	<i>beaucuop</i>	<i>beaucoup</i>
	25	1	<i>da incomodo , ne</i> <i>da verun dolore</i>	<i>ed incomodo</i>
	30	33	<i>functionum</i>	<i>functionum</i>
	38	28	<i>afflienti</i>	<i>afflienti</i>
	51	41	<i>Cadaverofus</i>	<i>Cadaverofus</i>
	61	40	<i>Memor</i>	<i>Meror</i>
	80	16	<i>nuovamente di</i> <i>nuovo</i>	<i>di anovo</i>
	96	33	<i>Aerg.</i>	<i>Chirurg.</i>
	113	29	<i>quasi o tutta</i>	<i>o quasi tutta</i>
	120	19	<i>distanza</i>	<i>alla distanza di</i>
	124	40	<i>Heist. Chirg p. XV.</i>	<i>Heist. Chirg. p. I. cap. II. parag. XV.</i>
			<i>p. 11. pag. 82.</i>	<i>pag. 82.</i>
	125	37	<i>inslinguntur</i>	<i>inslinguntur</i>



5.3.386


Tab. Prima



Tav. II



Tab. III



5.3.386

Z

005663261

